

第331回
地震防災対策強化地域判定会

記者会見資料



平成25年11月19日

気象庁

この資料は、独立行政法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、気象庁、独立行政法人産業技術総合研究所、国土地理院、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所、横浜市及び独立行政法人海洋研究開発機構のデータを基に作成しています。

以下の資料は暫定であり、後日の調査で変更されることがあります。

目次

定例資料

1. 地震活動概況 P. 1-6
2. 注目すべき地震・地殻活動 P. 7
3. 活動指数 P. 8-12
4. 静穏化・活発化領域の抽出 P. 13-14
5. 領域別地震活動 P. 15-26
6. ひずみ計による地殻変動観測 P. 27-53
7. GNSS による面的地殻変動監視 P. 54-61

平成 25 年 10 月～11 月 13 日の主な地震活動

○ 想定震源域およびその周辺； $M \geq 3.0$ または震度 1 以上を観測した地震

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	最大 震度	発震機構
10/6	23:24	静岡県中部	26	2.9	1	西北西－東南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型

※ 深部低周波地震（微動）活動

9 月 29 日～10 月 6 日にかけて愛知県を震央とする深部低周波地震（微動）活動を観測した。

○ 南関東； $M \geq 4.0$
(平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震の余震域で発生した地震については $M \geq 5.0$ のみ記述)


月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	参考		最大 震度	発震機構
					Mj	Mw		
11/3	14:25	茨城県南部	63	5.1	5.1	5.0	4	東西方向に圧力軸を持つ逆断層型
11/10	7:37	茨城県南部	64	5.5	5.5	5.6	5弱	東西方向に圧力軸を持つ逆断層型

○ その他の地域； $M \geq 6.0$

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	参考		最大 震度	発震機構
					Mj	Mw		
10/26	2:10	福島県沖	—	7.1	7.1	7.1	4	東西方向に張力軸を持つ正断層型(CMT)
10/31	21:02	台湾付近	15	6.5	6.5	6.2	1	北西－南東方向に圧力軸を持つ型(CMT)

Mj は従来から用いられている気象庁マグニチュード。Mw はモーメントマグニチュード。


東海地方とその周辺の広域地震活動 2013年10月1日～11月13日



図中の吹き出しは、陸域M4.5以上・海域M5.0以上とその他の主な地震

気象庁作成

東海・南関東地域の地震活動 2013年10月（1日～31日）




精度良く震源決定された地震のみを表示している。

愛知県（破線の領域a内）を震央とする深部低周波地震を9月29日から10月6日にかけて観測した。

奈良県から三重県南部（破線の領域b内）を震央とする深部低周波地震を10月26日から30日にかけて観測した。

気象庁作成

東海・南関東地域の地震活動 2013年11月 (1日～13日)




精度良く震源決定された地震のみを表示している。

気象庁作成


東海・南関東地域の発震機構解 (1)

Period: 2013/10/01 00:00—2013/11/13 24:00



※東海地域のM2.4以上の地震及び南関東地域のM3.5以上の地震の発震機構を表示している。

東海・南関東地域の発震機構解（２）




※東海地域のM2.4以上の地震及び南関東地域のM3.5以上の地震の発震機構を表示している。
各震源球の上部には震源要素、下部には発震機構の断層パラメータが併記されている。
断層パラメータが併記されていないものは、発震機構解の精度がやや劣るものである。


(下半球投影)
[気象庁作成]

深部低周波地震活動 (2000 年 1 月 1 日 ~ 2013 年 11 月 13 日)

深部低周波地震は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。




上図矩形内の時空間分布図 (A-H 投影)



スタッキング波形による短期的ゆっくりすべりの監視

今期間、短期的ゆっくりすべりにともなうと推測される変化が、No.73のスタッキング波形で観測された。




スタッキング波形は、上図の各監視ポイントについて、宮岡・横田(2012)の手法により、気象庁、静岡県、独立行政法人産業技術総合研究所のひずみ計データを基に作成している。

(参考文献)

宮岡一樹・横田崇(2012): 地殻変動検出のためのスタッキング手法の開発, 地震, 2, 65, 205-218.

スタッキング波形

表示期間: 2013/10/01:00:00 - 2013/11/15:00:00



※ 赤線は、スタッキング波形データが欠測であることを示す。

気象庁作成

東海地域の地震活動指数 (クラスタを除いた地震回数による)

2013年11月13日 現在

	① 静岡県中西部		② 愛知県		③ 浜名湖周辺			④ 駿河湾	
	地殻内	フィリ ピン海 プレート	地殻内	フィリ ピン海 プレート	フィリピン海プレート内 全域	西側	東側	全域	余震 除去
短期活動指数	4	3	4	4	0	2	1	6	4
短期地震回数 (平均)	4 (5.29)	4 (7.00)	11 (13.16)	12 (14.15)	0 (6.16)	0 (2.46)	0 (3.70)	9 (6.06)	4 (3.97)
中期活動指数	4	5	1	2	0	1	0	7	4
中期地震回数 (平均)	17 (15.87)	23 (21.00)	28 (39.48)	35 (42.44)	1 (12.32)	1 (4.93)	0 (7.39)	18 (12.12)	7 (7.93)

* Mしきい値： 静岡県中西部、愛知県、浜名湖周辺：M $\geq$ 1.1、駿河湾：M $\geq$ 1.4

* クラスタ除去：震央距離が Δr 以内、発生時間差が Δt 以内の地震をグループ化し、最大地震で代表させる。

静岡県中西部、愛知県、浜名湖周辺： $\Delta r=3\text{km}$ 、 $\Delta t=7\text{日}$

駿河湾： $\Delta r=10\text{km}$ 、 $\Delta t=10\text{日}$

* 対象期間： 静岡県中西部、愛知県：短期30日間、中期90日間

浜名湖周辺、駿河湾：短期90日間、中期180日間

* 基準期間： おおむね長期的スロースリップ（ゆっくり滑り）発生前の地震活動を基準とする。

静岡県中西部、愛知県：1997年－2001年（5年間）、

浜名湖周辺：1998年－2000年（3年間）、駿河湾：1991年－2000年（10年間）


[各領域の説明] ①静岡県中西部：プレート間が強く「くっついている」と考えられている領域（固着域）。

②愛知県：フィリピン海プレートが沈み込んでいく先の領域。

③浜名湖周辺：固着域の縁。長期的スロースリップ（ゆっくり滑り）が発生する場所であり、同期して地震活動が変化すると考えられている領域。

④駿河湾：フィリピン海プレートが沈み込み始める領域。

余震除去：2009年8月11日の駿河湾の地震（M6.5）と2011年8月1日の駿河湾の地震（M6.2）の余震域の活動を除いて活動指数を求めた場合。




* Hirose et al. (2008) によるプレート境界の等深線を破線で示す

地震回数の指数化		
指数	確率 (%)	地震数
8	1	多い
7	4	やや多い
6	10	
5	15	
4	40	ほぼ平常
3	15	
2	10	
1	4	やや少ない
0	1	少ない

地震活動指数の推移（中期活動指数）


① 静岡県中西部（対象期間：90日）

1997/ 1/ 1~2013/11/13 M ≥ 1.1




② 愛知県（対象期間：90日）

1997/ 1/ 1~2013/11/13 M ≥ 1.1




③ 浜名湖周辺（対象期間：180日）

1995/ 1/ 1~2013/11/13 M ≥ 1.1




④ 駿河湾（対象期間：180日）

1990/ 1/ 1~2013/11/13 M ≥ 1.4




2009年8月11日の駿河湾の地震（M6.5）と2011年8月1日の駿河湾の地震（M6.2）の余震域の活動を除去した場合




■：基準期間 〃：地震活動指数（0－8）

地震活動指数の推移

① 静岡県中西部



地殻内はほぼ平常(4)。フィリピン海プレート内もほぼ平常(3から5)。





地殻内はほぼ平常(4から3)。
フィリピン海プレート内もほぼ平常(5)。

／：地震活動指数(0-8)
■：地震回数(クラスタを除く)

地震活動指数の推移

② 愛知県




／：地震活動指数(0-8)
■：地震回数(クラスタを除く)

地震活動指数の推移

③ 浜名湖周辺（フィリピン海プレート内）


(90日) 1995/ 1/ 1~2013/11/13 $M \geq 1.1$ (180日)



フィリピン海プレート内の地震活動は低い(0)。

④ 駿河湾

(90日) 1990/ 1/ 1~2013/11/13 $M \geq 1.4$ (180日)



地震活動はやや高い(6から7)。

ただし、2009年8月11日 駿河湾の地震 ($M6.5$) と、2011年8月1日 駿河湾の地震 ($M6.2$) の余震活動の影響が残っている。

／：地震活動指数 (0-8)
■：地震回数 (クラスタを除く)

静穏化・活発化領域の検出（東海地方、地殻内）

抽出した地震

東海地方、地殻内で発生した

M 1.1 以上の地震

○：全期間の地震

○：解析対象期間内に発生した地震

クラスタ除去（デクラスタ）

震央距離 3.0 km 以内、発生時刻 7.0 日以内
の地震をグループ化し、最大地震で代表させる

図の注釈

静穏化

●：半径 15.0 km 以内でレベル 0

●：半径 20.0 km 以内でレベル 0

活発化

●：半径 15.0 km 以内でレベル 8

●：半径 20.0 km 以内でレベル 8


タイムバー

全体：検出領域中心として解析に用いたデータの期間


■：基準期間

□：解析対象期間


[1] 2013/02/17--2013/05/17



[2] 2013/05/18--2013/08/15




[3] 2013/08/16--2013/11/13




気象庁作成


静穏化・活発化領域の検出（東海地方、プレート内）




[1] 2013/02/17--2013/05/17



[2] 2013/05/18--2013/08/15




[3] 2013/08/16--2013/11/13



気象庁作成

2013/ 8/16~2013/11/13 $M \geq 0.0$ $0 \leq \text{深さ (km)} \leq 60$




*吹き出しはM $\geq$ 3.0

静岡県中西部（地殻内）

1997/ 1/ 1~2013/11/13 M $\geq$ 1.1

クラスタ除去




最近60日以内の地震を濃く表示

クラスタ除去後の地震回数積算図（右下図）を見ると、2000年半ばまでは傾きが急でやや活発、その後2005年半ばまでは傾きが緩やかでやや低調、2005年半ば以降はやや活発、という傾向が見られる。この地震活動変化は、概ね長期的スロースリップの進行（右下図網掛け領域）・停滞の時期に対応している。2007年後半以降はさらに活発な傾向が続いてきたが、2013年に入ってからやや低調に推移している。

気象庁作成


クラスタ除去



静岡県中西部（フィリピン海プレート内）

1997/1/1~2013/11/13 M $\geq$ 1.1

クラスタ除去




2009年末から2011年始めまで、地震活動指数はやや高い状態を示しており、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からも同様の傾向が見られていた。これは、2009年8月11日に発生した駿河湾の地震(M6.5)の余震活動が適切にデクラスタされていないためである。現在の地震活動指数はほぼ平常程度で推移しており、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)にも顕著な変化は見られない。

気象庁作成

愛知県（地殻内）

1997/ 1/ 1~2013/11/13 M ≥ 1.1

クラスタ除去




地震活動指数はやや少ない状態を示しており、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からも2013年の活動はやや低調に見える。

愛知県（フィリピン海プレート内）

1997/ 1/ 1~2013/11/13 M ≥ 1.1

クラスタ除去




* 吹き出しは最近60日以内、M ≥ 3.0

地震活動指数はやや少ない状態を示しているが、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)には特段の変化は見られない。

浜名湖周辺（フィリピン海プレート内）

1995/ 1/ 1~2013/11/13 M $\geq$ 1.1 *クラスタ除去したデータ



〔東側〕地震回数積算図（右下図）を見ると、地震活動は2000年以降やや低調。


〔西側〕地震回数積算図（左下図）を見ると、2006年以降やや低調。

駿河湾

1990/1/1~2013/11/13 M ≥ 1.4

震央分布図

N=4301





震央分布図



N=2101

クラスタ
除去
→



depth
(km)
M
0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
1.4




時空間分布図(南北方向)



M-T図



地震回数積算図





2010年頃地震活動指数はやや高い状態を示しており、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からも同様の傾向が見られる。これは、2009年8月の駿河湾の地震(M6.5)と、2011年8月の駿河湾の地震(M6.2)余震活動が適切にデクラスタされていないためである。現在の地震活動指数もやや高い状態で推移している。

プレート境界とその周辺の地震活動(最近の活動状況)

(Hirose et al. (2008)によるフィリピン海プレート上面深さの±3kmの地震を抽出)



プレート境界とその周辺の地震の震央分布 (最近約1ヶ月半、Mすべて)

2013年10月1日～2013年11月13日



プレート境界とその周辺の地震の震央分布 (2002年10月以降、 $M \geq 0.5$)

2002年10月1日～2013年11月13日




2002年10月以降 ($M \geq 0.5$) で見ると、東海地域のプレート境界とその周辺の地震活動は、2007年中頃あたりからやや活発に見える。なお、2009年8月11日以降は、駿河湾の地震 ($M6.5$) の余震活動の一部を抽出している。M3を超える地震については、その震央を矢印で示しているが、これらの地震の発震機構解は想定東海地震のものとは類似の型ではない。

気象庁作成

想定東海地震の発震機構解と類似の型の地震

1987 年 9 月 1 日～2013 年 11 月 13 日




吹き出しの傍に書かれた値は、Hirose et al. (2008) によるプレート境界からの鉛直方向の距離。+はプレート境界より浅く、-は深いことを示す。

想定東海地震の発震機構解と類似の型の地震を抽出した。抽出条件は、P 軸の傾斜角が 45 度以下、かつ P 軸の方位角が 65 度以上 145 度以下、かつ T 軸の傾斜角が 45 度以上、かつ N 軸の傾斜角が 30 度以下とした。

プレート境界で発生したと疑われる地震の他、明らかに地殻内またはフィリピン海プレート内で発生したと推定される地震も含まれている。また、2009 年までに発生した地震については、Nakamura et al. (2008) の 3 次元速度構造で震源とメカニズム解を再精査し、いくつかの地震は候補から削除されている。点線楕円で囲まれた地震は、2011 年 8 月 1 日に発生した M6.2 の地震の余震で、フィリピン海プレート内の地震である。

なお、吹き出し図中、震源球右下隣りに S の表示があるものは、発震機構解に十分な精度がない。



上記イベントの、想定震源域内における M-T 図。

気象庁作成


10月～11月 伊豆東部※の活動

※ 「伊豆東部の地震活動の見通しに関する情報」で対象としている領域

2013年10月以降、特に目立った地震活動はなかった。

10月中旬～11月中旬にかけて、伊豆東部の体積ひずみ計（東伊豆奈良本）及び傾斜計（伊東猪山、伊東、岡、徳永）では、雨による変化以外に目立った変化は観測されていない。

震央分布図（1997年10月1日～2013年11月13日、
M $\geq$ 0.5、深さ0～20km）
2013年10月以降の地震を濃く表示。



東伊豆地域の体積ひずみ計・傾斜計の記録
(2013年10月15日11時～2013年11月15日11時)

体積ひずみ・傾斜（気圧・潮汐補正;時間値）伊豆東部
2013/10/15 11:00 - 2013/11/15 11:00

EXP. NEup 2.0E-07 strain
2.0E-06 radian
50 count/1hour
30 ms/1hour

東伊豆奈良本L.P.
-1.582170E-08/DAY

伊東猪山傾NS

伊東猪山傾EW

防)伊東傾NS

防)伊東傾EW

防)岡傾NS


防)岡傾EW

防)徳永傾NS


防)徳永傾EW

鎌田地震回数



網代雨



左図内の地震の時空間分布図（南北投影）
(2012年11月1日～2013年11月13日)



左図内の地震のM-T図及び回数積算図




防)は独立行政法人防災科学技術研究所の観測点である。

ひずみ計による観測結果 (2013年5月1日～2013年11月14日)

短期的ゆっくりすべりに起因すると見られる次の地殻変動がひずみ計で観測された。


- SSE1 : 2013年5月15日から20日にかけて観測された。(第325回地震防災対策強化地域判定会資料参照)
- SSE2 : 2013年6月11日から12日にかけて観測された。(第326回地震防災対策強化地域判定会資料参照)
- SSE3 : 2013年6月28日から7月3日にかけて観測された。(第327回地震防災対策強化地域判定会資料参照)
- SSE4 : 2013年8月3日から12日にかけて観測された。(第328回地震防災対策強化地域判定会資料参照)
- SSE5 : 2013年9月29日から10月6日にかけて観測された。(第330回地震防災対策強化地域判定会資料参照)

ひずみ計の配置図



気象庁作成


ひずみ変化 時間値 (東海地域)



※ C: 地震に伴うステップ状の変化, L: 局所的な変化, S: 例年見られる変化, M: 調整, T: 障害

気象庁作成

ひずみ変化 時間値（東海地域（西部））



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅（ノイズレベル）を示す。

※記号Vは体積ひずみを、Sは多成分ひずみ計で観測した線ひずみより計算した面積ひずみを示す。

※田原福江は、地下水の汲み上げに伴うひずみ変化を補正している。

SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2013.05.15-05.20
SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2013.06.11-06.12
SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2013.06.28-07.03
SSE4 : 短期的ゆっくりすべり 2013.08.03-08.12
SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2013.09.29-10.06


C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

表示観測点の名称

田原福江	たはらふくえ
田原高松	たはらたかまつ
蒲郡清田	がまごおりせいだ
新城浅谷	しんしろあさや
浜松三ヶ日	はまつみっかび
売木岩倉	うるぎいわくら
浜松佐久間	はまつさくま
浜松宮口	はまつみやぐち
浜松横川	はまつよこかわ
浜松春野	はまつはの
掛川富部	かけがわとんべ

気象庁作成

ひずみ変化 時間値（東海地域（東部））



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。

※記号Vは体積ひずみを、Sは多成分ひずみ計で観測した線ひずみより計算した面積ひずみを示す。

SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2013.05.15-05.20


C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

表示観測点の名称

掛川高天神	かけがわとかてんじん
島田川根	しまだかわね
川根本町東藤川	かわねほんちょう
	ひがしふじかわ
御前崎大山	おまえざきおおやま
御前崎佐倉	おまえざきさくら
藤枝蔵田	ふじえだくらた
牧之原坂部	まきのはらさかべ
藤枝花倉	ふじえだはなくら
静岡落合	しずおかおちあい
静岡漆山	しずおかうるしやま
静岡但沼	しずおかただぬま

気象庁作成

ひずみ変化 時間値（伊豆地域）



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。


・特記事項なし。

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

表示観測点の名称

富士鶴無ヶ淵	ふじうないがふち
湯河原鍛冶屋	ゆがわらかじや
熱海下多賀	あたみしもたが
東伊豆奈良本	ひがしいずならもと
伊豆小下田	いずこしもだ
南伊豆入間	みなみいずるま
大島津倍付	おおしまつばいつき

ひずみ変化 時間値（南関東地域）



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。


・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

表示観測点の名称

秦野菩提	はだのぼだい
日野程久保	ひのほどくぼ
横浜川和	よこはまかわわ
三浦三崎	みうらみさき
横須賀馬堀	よこすかまぼり
館山中里	たてやまなかざと
富津望井	ふつつもちい
鴨川八色	かもがわやいろ
長柄刑部	ながらおさかべ
大多喜宇筒原	おおたきうとうばら
勝浦墨名	かつうらとな
匝瑳飯高	そうさいいだか
銚子明神	ちょうしみょうじん

気象庁作成




※面積ひずみは、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除外して計算している。


気象庁作成

ひずみ変化 日平均値 (伊豆・南関東)


↑30000 nstrain
100 hPa
100 mm



掛川富部（かけがわとんべ） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。




SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2013.09.29-10.06

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

掛川富部ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1、2、3の
各方向成分から1999年7月1日を基点として算出

Exp.
↑ 6000 nstrain (1)
↑ 20000 nstrain (2)




*各成分の括弧付き数字はスケールの番号に対応
※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うステップを除去して計算している。


← 伸び
→ 縮み
1.0e-06 strain

気象庁作成

浜松春野（はまつはるの） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2013.05.15-05.20
SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2013.09.29-10.06

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

浜松春野ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ2、3、4の
各方向成分から2003年1月1日を基点として算出

Exp.
↑ 20000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うステップを除去して計算している。


⇐ 伸び
⇐ 縮み
2.0e-06 strain

気象庁作成

浜松佐久間（はまつさくま）ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に 1 日間で変動し得る最大の变化の幅(ノイズレベル)を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2013.05.15-05.20
SSE4 : 短期的ゆっくりすべり 2013.08.03-08.12
SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2013.09.29-10.06

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

浜松佐久間ひずみ変化（日値）

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ 1、2、3 の各方向成分から2000年1月1日を基点として算出


Exp.
↑ 10000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うステップを除去して計算している。

気象庁作成

川根本町東藤川（かねほんちょうひがしふじかわ） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2013.05.15-05.20

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

川根本町東藤川ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみおよび面積ひずみはひずみ1、2、3の
各方向成分から2000年1月1日を基点として算出


Exp.
↑ 3000 nstrain




*最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うコサイスマミックなステップを除去して計算している。

気象庁作成

浜松宮口（はまつみやぐち） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に 1 日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。




SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2013.09.29-10.06

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

浜松宮口ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ 1、2、3 の各方向成分から2002年7月1日を基点として算出

Exp.
↑ 10000 nstrain (1)
20000 nstrain (2)




*各成分の括弧付き数字はスケールの番号に対応

※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うステップを除去して計算している。


↔ 伸び
← 縮み
1.0e-06 strain

気象庁作成

静岡落合（しずおかおちあい） ひずみ変化 時間値




※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。



・特記事項なし。


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

藤枝蔵田（ふじえだくらた） ひずみ変化 時間値




※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。

・特記事項なし。




- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

掛川高天神（かけがわたかてんじん） ひずみ変化 時間値




※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。

・特記事項なし。



- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

売木岩倉（うるぎいわくら） ひずみ変化 時間値




※観測点名の右側のスケールは、平常時に 1 日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。


SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2013.09.29-10.06

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

新城浅谷（しんしろあさや） ひずみ変化 時間値




※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2013.05.15-05.20
SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2013.06.11-06.12
SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2013.06.28-07.03
SSE4 : 短期的ゆっくりすべり 2013.08.03-08.12
SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2013.09.29-10.06

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

田原高松（たはらたかまつ） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に 1 日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。



SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2013.06.11-06.12
SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2013.06.28-07.03
SSE4 : 短期的ゆっくりすべり 2013.08.03-08.12


C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

多成分ひずみ計データ


ひずみ1・2・3成分(浜松春野は、2・3・4成分)から90日前を基準として算出

2012.05.01~2013.11.14


基準日:2012/02/01 比較日:2012/05/01




基準日:2012/05/03 比較日:2012/08/01




基準日:2012/08/03 比較日:2012/11/01



基準日:2012/11/03 比較日:2013/02/01




基準日:2013/02/02 比較日:2013/05/01




基準日:2013/05/03 比較日:2013/08/01



基準日:2013/08/03 比較日:2013/11/01



基準日:2013/08/13 比較日:2013/11/14




多成分ひずみ計データ 新設点

ひずみ1・2・3成分から90日前を基準として算出

2012.05.01~2013.11.14


基準日:2012/02/01 比較日:2012/05/01




基準日:2012/05/03 比較日:2012/08/01




基準日:2012/08/03 比較日:2012/11/01



基準日:2012/11/03 比較日:2013/02/01




基準日:2013/02/02 比較日:2013/05/01



基準日:2013/05/03 比較日:2013/08/01



基準日:2013/08/03 比較日:2013/11/01



基準日:2013/08/13 比較日:2013/11/14



東海地域の短期的ゆっくりすべりの監視

2013. 10. 01~2013. 11. 14

今期間、気象庁が監視している東海地方の掛川富部、浜松春野、浜松佐久間、浜松宮口、売木岩倉及び新城浅谷で短期的ゆっくりすべりに伴うひずみ計の変化が観測された。



東海周辺ひずみ変化 1

< 2013/10/ 1 0: 0 -- 2013/11/15 0: 0 >

気圧、潮汐、降水（体積ひずみ）、磁気（多成分ひずみ）、地下水（田原福江）補正データ

1.0E-07 strain
60 mm/Hour
10 count/Hour

田原福江
蒲郡清田
掛川富部
1 ~ 4
浜松春野
2 ~ 4
浜松佐久間
1 ~ 4
川根本町東藤川
1 ~ 4
浜松宮口
1 ~ 4
低周波地震回数
川根本町東藤川雨



- 体積ひずみ観測点
- ◇ 多成分ひずみ観測点

※浜松春野・川根本町東藤川は静岡県整備


東海周辺ひずみ変化 2

< 2013/10/ 1 0: 0 -- 2013/11/15 0: 0 >

気圧、潮汐、磁気補正データ


2.0E-07 strain
30 mm/1hour
10 count/Hour

静岡落合
5 ~ 8
掛川高天神
5 ~ 8
売木岩倉
5 ~ 8
新城浅谷
5 ~ 8
田原高松
5 ~ 8
低周波地震回数
田原高松雨



気象庁作成

GNSS6時間値による面的監視




対象範囲(内側の矩形内)と使用観測点(●印)。+印の観測点はデータ不安定などにより今回の解析に使用していない。

東海地域におけるGNSS6時間値(国土地理院)を用いて、最近1日間、1週間と過去とを比較した。夏季に解析値のばらつきが見られるほかは特に目立った変位は見られない。

※GNSS(Global Navigation Satellite System)とは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称。

気象庁・気象研究所作成


最近1日間とその前1週間との比較



対象期間：2013/11/13 00:00 – 2013/11/14 00:00(1day)

基準期間：2013/11/06 00:00 – 2013/11/13 00:00(1week)

最近1週間とその前1ヶ月間との比較







対象期間：2013/11/07 00:00 – 2013/11/14 00:00(1week)

基準期間：2013/10/08 00:00 – 2013/11/07 00:00(1month)

最近1年間(2012年11月1日00:00～2013年11月14日00:00)の 面的監視による対象範囲内の最大値の経過

(前ページまでのカラーマッピングはこれらのグラフの右端の状況。)



夏季に解析値のばらつきが見られる。

点線はノイズレベルであり、異常検知のしきい値。しきい値は、2006年1月～2007年12月の2年間分のデータを元に、1年に1回出現する最大値・最小値を把握できる値を求め設定。

* 1)の上下成分の1日/1週間は振幅を1/3倍、* 2)の発散ひずみ成分の1日/1週間は振幅を1/2倍にしてある。

GNSS 日値による面的監視（南海トラフ沿い）

今期間の解析結果には、特に目立った変位は見られない。

南海トラフ沿いの地域について紀伊水道を境に東西二つに分け、GNSS 日値 F3 解（国土地理院）を用いて、①最近 1 ヶ月間とその前の 3 ヶ月間の座標変化（各期間の中央値の差から 2 ヶ月間の変位）、②最近 1 ヶ月間と 1 年前の 1 ヶ月間との座標変化（1 年間の変位）、③各対象範囲内の最大値の経過、およびそれぞれ水平成分から計算したひずみを面的監視手法で見た。GNSS 座標値は観測点ごとに定常変位と見なされる期間の直線トレンドを除去しており、年周変化は補正していない。また、主な地震に伴うオフセットを差し引いている。東側の領域（東海～紀伊半島）は、2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震に伴う余効変動を差し引いている。

※GNSS (Global Navigation Satellite System) とは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称。

気象庁・気象研究所作成

① 最近 2 ヶ月間の変位とひずみ

(余効除去)

南北













東西

上下

面積ひずみ

回転

最大せん断



対象期間 : 2013/09/26-2013/10/26(1month)

基準期間 : 2013/06/28-2013/09/26 (3month)

特に目立った変化は見られない。

気象庁・気象研究所作成

②最近1年間の変位とひずみ

(余効除去)

南北



東西

上下

面積ひずみ



回転

最大せん断



ノイズレベル

ノイズレベル



ノイズレベル

ノイズレベル

対象期間：2013/09/26-2013/10/26(1month)

基準期間：2012/09/25-2012/10/26(1month)

特に目立った変化は見られない。

気象庁・気象研究所作成



③ 面的監視による対象範囲内の最大値の経過 (1997年1月～2013年9月)

(監視期間：2か月)



(四国)

(東海～紀伊半島；余効除去)

変位





ひずみ





(監視期間：1年)

変位



ひずみ



豊後水道の長期的ゆっくりすべりによる影響がこれまでに3度みられるが、このほかでは特に目立った変化は見られない。