

第336回
地震防災対策強化地域判定会

記者会見資料



平成26年4月21日

気象庁

この資料は、独立行政法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、気象庁、独立行政法人産業技術総合研究所、国土地理院、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所、横浜市及び独立行政法人海洋研究開発機構のデータを基に作成しています。

以下の資料は暫定であり、後日の調査で変更されることがあります。

目次

定例資料

1. 地震活動概況 P. 1-7
2. 注目すべき地震・地殻活動 P. 8-11
3. 活動指数 P. 12-16
4. 静穏化・活発化領域の抽出 P. 17-18
5. 領域別地震活動 P. 19-30
6. ひずみ計による地殻変動観測 P. 31-63
7. GNSS による面的地殻変動監視 P. 64-70

平成 26 年 3 月～ 4 月 16 日の主な地震活動

○ 想定震源域およびその周辺； $M \geq 3.0$ または震度 1 以上を観測した地震

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	最大 震度	発震機構
3/18	21:24	静岡県西部	35	3.2	1	東西方向に張力軸を持つ横ずれ断層型

※ 深部低周波地震（微動）活動

3 月 20 日から 22 日にかけて、長野県南部を震央とする深部低周波地震（微動）活動を観測した。
4 月 9 日から 16 日にかけて愛知県を震央とする深部低周波地震（微動）活動を観測した。

○ 南関東； $M \geq 4.0$

（平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の余震域で発生した地震については $M \geq 5.0$ のみ記載）


月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	参考		最大 震度	発震機構
					Mj	Mw		
3/12	5:04	千葉県北西部	66	4.4	4.4	4.6	3	東西方向に圧力軸を持つ逆断層型

○ その他の地域； $M \geq 6.0$

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	参考		最大 震度	発震機構
					Mj	Mw		
3/3	5:11	沖縄本島北西沖	116	6.4	6.4	6.5	4	フィリピン海プレートの沈み込む方向に圧力軸を持つ型(CMT)
3/14	2:56	伊予灘	78	6.2	6.2	6.3	5強	東北東－西南西方向に張力軸を持つ型
3/19	21:19	台湾付近	21	6.0	6.0	5.7	2	南北方向に圧力軸を持つ型

Mj は従来から用いられている気象庁マグニチュード。Mw はモーメントマグニチュード。


東海地方とその周辺の広域地震活動 2014年3月1日～2014年4月16日



図中の吹き出しは、陸域M4.5以上・海域M5.0以上とその他の主な地震

気象庁作成


東海・南関東地域の地震活動 2014年3月 (1日~31日)



精度良く震源決定された地震のみを表示している。
長野県南部（破線の領域a）を震央とする深部低周波地震を3月20日から22日にかけて観測した。

気象庁作成

東海・南関東地域の地震活動 2014年4月（1日～16日）




精度良く震源決定された地震のみを表示している。
愛知県（破線の領域a）を震央とする深部低周波地震を4月9日から16日にかけて観測した。


気象庁作成

東海・南関東地域の発震機構解 (1)

Period:2014/03/01 00:00—2014/04/16 24:00




東海・南関東地域の発震機構解 (2)




(下半球投影)
[気象庁作成]

深部低周波地震活動（2000年1月1日～2014年4月16日）

深部低周波地震は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。




上図矩形内の時空間分布図（A - H投影）



時空間分布図中、網掛けした期間は現在と比較して十分な検知能力がなかったことを示す。

スタッキング波形による短期的ゆっくりすべりの監視

短期的ゆっくりすべりにともなうと推測される伸び方向の変化が、3月21日～22日頃にかけてNo.31で、また、4月08日から16日頃にかけてNo.73等で観測された。



スタッキング波形は、上図の各監視ポイントについて、宮岡・横田(2012)の手法により、気象庁、静岡県、独立行政法人産業技術総合研究所のひずみ計データを基に作成している。


(参考文献)

宮岡一樹・横田崇(2012): 地殻変動検出のためのスタッキング手法の開発, 地震, 2, 65, 205-218.

スタッキング波形

表示期間: 2014/03/01:00:00 - 2014/04/18:00:00

3.0e-07
20 mm/day
5回



※ 赤線は、スタッキング波形データが欠測であることを示す。


気象庁作成

3月20日～3月22日 長野県南部の深部低周波地震活動

深部低周波地震の震央分布図

(2008年1月1日～2014年3月23日、Mすべて、
深さ0～60km)


2012年12月までの震央を+、2013年1月以降を○、
2014年3月20日以降を○で表示




2014年3月20日から22日にかけて、長野県南部を震央とする深部低周波地震活動を観測した。

2013年以降の活動を見ると、今回の活動領域では、2013年5月と2014年1月に深部低周波地震を観測している。

領域 a 内の M-T 図及び回数積算図




領域 a 内の時空間分布図 (A-B 投影)



ひずみ変化と推定されるゆっくりすべり領域


東海周辺ひずみ変化
2014/03/05 00:00 - 2014/04/01 00:00

EXP. 5.E-8 strain
60 mm/1hour
10 count/hour



浜松春野、川根本町東藤川は静岡県のひずみ計である。

ひずみ変化から推定されるすべり領域



すべり候補領域は、中村・竹中(2004)¹⁾によるグリッドサーチの手法※により求めた。プレート境界と断層面の形状はHirose et al.(2008)²⁾による。

※ すべり候補領域の位置とその規模(Mw)を、すべりがプレート境界面上でプレートの沈み込み方向と反対に発生したと仮定し、考え得る全ての解を前提として得られる理論値と観測値を比較し、合致するものを抽出する手法

1) 中村浩二・竹中潤, 東海地方のプレート間すべり推定ツールの開発, 験震時報, 68, 25-35, 2004
2) Hirose F., J. Nakajima, A. Hasegawa, Three-dimensional seismic velocity structure and configuration of the Philippine Sea slab in southwestern Japan estimated by double-difference tomography, J. Geophys. Res., 113, B09315, doi:10.1029/2007JB005274, 2008

4月9日以降の愛知県の深部低周波地震活動


この資料は速報値を用いており、後日の調査で変更される可能性がある。

深部低周波地震の震央分布図

(2009年1月1日～2014年4月16日、Mすべて、
深さ0～60km)


2014年2月から3月までの深部低周波地震を濃い+で表示

2014年4月1日以降の深部低周波地震を○で表示




2014年4月9日から16日にかけて、愛知県を震央とする深部低周波地震活動を観測した。

領域 a 内の地震活動経過図及び回数積算図



領域 a 内の時空間分布図 (A - B 投影)




ひずみ変化と推定されるゆっくりすべり領域

東海周辺ひずみ変化


2014/03/21 00:00 -- 2014/04/21 00:00

EXP. 5.E-8 strain
60 mm/Hour
10 count/Hour

浜松佐久間




新城浅谷



浜松佐久間雨


低周波地震回数



すべり推定期間

ひずみ変化から推定されるすべり領域

4月07日00時 ~ 17日00時
Mw5.3 ~ 5.5



- すべり推定に使用したひずみ観測点
- 上記以外のひずみ観測点
- 深部低周波地震震央 (04/07.00h ~ 04/16.24h)

すべり候補領域は、中村・竹中(2004)¹⁾によるグリッドサーチの手法により求めた。プレート境界と断層面の形状はHirose et al.(2008)²⁾による。

すべり候補領域の位置とその規模(Mw)を、すべりがプレート境界面上でプレートの沈み込み方向と反対に発生したと仮定し、考え得る全ての解を前提として得られる理論値と観測値を比較し、合致するものを抽出する手法

1) 中村浩二・竹中潤, 東海地方のプレート間すべり推定ツールの開発, 駿震時報, 68, 25-35, 2004
2) Hirose F., J. Nakajima, A. Hasegawa, Three-dimensional seismic velocity structure and configuration of the Philippine Sea slab in southwestern Japan estimated by double-difference tomography, J. Geophys. Res., 113, B09315, doi:10.1029/2007JB005274, 2008

東海地域の地震活動指数 (クラスタを除いた地震回数による)

2014年4月16日 現在

	① 静岡県中西部		② 愛知県		③ 浜名湖周辺			④ 駿河湾	
	地殻内	フィリ ピン海 プレート	地殻内	フィリ ピン海 プレート	フィリピン海プレート内 全域	西側	東側	全域	余震 除去
短期活動指数	2	4	4	6	2	2	4	5	4
短期地震回数 (平均)	2 (5.29)	6 (7.00)	11 (13.16)	19 (14.15)	3 (6.16)	0 (2.46)	3 (3.70)	7 (6.06)	4 (3.97)
中期活動指数	6	4	2	4	0	0	2	6	4
中期地震回数 (平均)	21 (15.87)	19 (21.00)	31 (39.48)	44 (42.44)	4 (12.32)	0 (4.93)	4 (7.39)	17 (12.12)	6 (7.93)

* Mしきい値： 静岡県中西部、愛知県、浜名湖周辺：M $\geq$ 1.1、駿河湾：M $\geq$ 1.4

* クラスタ除去：震央距離が Δr 以内、発生時間差が Δt 以内の地震をグループ化し、最大地震で代表させる。

静岡県中西部、愛知県、浜名湖周辺： $\Delta r=3\text{km}$ 、 $\Delta t=7\text{日}$

駿河湾： $\Delta r=10\text{km}$ 、 $\Delta t=10\text{日}$

* 対象期間： 静岡県中西部、愛知県：短期30日間、中期90日間

浜名湖周辺、駿河湾：短期90日間、中期180日間

* 基準期間： おおむね長期的スロースリップ（ゆっくり滑り）発生前の地震活動を基準とする。

静岡県中西部、愛知県：1997年－2001年（5年間）、

浜名湖周辺：1998年－2000年（3年間）、駿河湾：1991年－2000年（10年間）


〔各領域の説明〕 ① 静岡県中西部：プレート間が強く「くっついている」と考えられている領域（固着域）。

② 愛知県：フィリピン海プレートが沈み込んでいく先の領域。

③ 浜名湖周辺：固着域の縁。長期的スロースリップ（ゆっくり滑り）が発生する場所であり、同期して地震活動が変化すると考えられている領域。

④ 駿河湾：フィリピン海プレートが沈み込み始める領域。

余震除去：2009年8月11日の駿河湾の地震（M6.5）と2011年8月1日の駿河湾の地震（M6.2）の余震域の活動を除いて活動指数を求めた場合。




* Hirose et al. (2008) によるプレート境界の等深線を破線で示す

地震回数の指数化		
指数	確率 (%)	地震数
8	1	多い
7	4	やや多い
6	10	
5	15	
4	40	ほぼ平常
3	15	
2	10	やや少ない
1	4	
0	1	少ない

地震活動指数の推移（中期活動指数）


① 静岡県中西部（対象期間：90日）

1997/ 1/ 1~2014/ 4/16 M ≥ 1.1




② 愛知県（対象期間：90日）

1997/ 1/ 1~2014/ 4/16 M ≥ 1.1



③ 浜名湖周辺（対象期間：180日）


1995/ 1/ 1~2014/ 4/16 M ≥ 1.1



少ない
(継続中)

④ 駿河湾（対象期間：180日）


1990/ 1/ 1~2014/ 4/16 M ≥ 1.4



2009年8月11日の駿河湾の地震(M6.5)と2011年8月1日の駿河湾の地震(M6.2)の余震域の活動を除去した場合


④ 駿河湾（対象期間：180日）

1990/ 1/ 1~2014/ 4/16 M ≥ 1.4




地震活動指数の推移

① 静岡県中西部




地殻内はやや高い(2から6)。フィリピン海プレート内はほぼ平常(4)。




地殻内はやや高い(6から4)。
フィリピン海プレート内はほぼ平常(5から4)。

／ : 地震活動指数 (0-8)
■ : 地震回数 (クラスタを除く)

地震活動指数の推移 ② 愛知県



地殻内はやや低い(4から2)。アイリピン海プレート内はほぼ平常(6から4)




地殻内はほぼ平常(3から4)、
アイリピン海プレート内は低い(3から1)。

— : 地震活動指数 (0-8)
■ : 地震回数 (クラスタを除く)

地震活動指数の推移

③ 浜名湖周辺（フィリピン海プレート内）


(90日) 1995/ 1/ 1~2014/ 4/16 M ≥ 1.1 (180日)



フィリピン海プレート内の地震活動は低い(2から0)。

④ 駿河湾

(90日) 1990/ 1/ 1~2014/ 4/16 M ≥ 1.4 (180日)



地震活動はやや高い(5から6)。

ただし、2009年8月11日 駿河湾の地震 (M6.5) と、2011年8月1日 駿河湾の地震 (M6.2) の余震活動の影響が残っている。

／ : 地震活動指数 (0-8)
■ : 地震回数 (クラスタを除く)

静穏化・活発化領域の検出（東海地方、地殻内）

抽出した地震

東海地方、地殻内で発生した
M 1.1 以上の地震

- : 全期間の地震
- : 解析対象期間内に発生した地震

クラスタ除去（デクラスタ）

震央距離 3.0 km 以内、発生時刻 7.0 日以内
の地震をグループ化し、最大地震で代表させる

図の注釈

静穏化

- : 半径 15.0 km 以内でレベル 0
- : 半径 20.0 km 以内でレベル 0

活発化


- : 半径 15.0 km 以内でレベル 8
- : 半径 20.0 km 以内でレベル 8

タイムバー


全体：検出領域中心として解析に用いたデータの期間

- : 基準期間
- : 解析対象期間


[1] 2013/07/21–2013/10/18




[2] 2013/10/19–2014/01/16




[3] 2014/01/17–2014/04/16




静穏化・活発化領域の検出（東海地方、プレート内）




[1] 2013/07/21--2013/10/18



[2] 2013/10/19--2014/01/16



[3] 2014/01/17--2014/04/16











静岡県中西部（最近90日）

2014/1/17~2014/4/16 M $\geq$ 0.0 0 $\leq$ 深さ(km) $\leq$ 60

地殻内

フアイビン海プレート内






*吹き出しはM $\geq$ 3.0



静岡県中西部（地殻内）

1997/1/1~2014/4/16 M ≥ 1.1



クラスタ除去



時空間分布図 (A B 方向)



M-I 図



地震回数積算図

最近60日以内の地震を濃く表示


クラスタ除去後の地震回数積算図（右下図）を見ると、2000年半ばまでは傾きが急でやや活発、その後2005年半ばまでは傾きが緩やかでやや低調、2005年半ば以降はやや活発、という傾向が見られる。この地震活動変化は、概ね長期的スロースリップの進行（右下図網掛け領域）・停滞の時期に対応している。2007年後半以降はさらに活発な傾向が続いてきたが、2013年に入ってから傾きが緩やかになってきている。

気象庁作成

静岡県中西部（地殻内）

1997/1/1~2014/4/16 M ≥ 2.0

クラスタ除去




クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)を見ると、2007年頃から傾きが急でやや活発な状態を示していたが、2013年に入ってからそれ以前の状態に戻っている。

静岡県中西部（フィリピン海プレート内）

1997/1/1~2014/4/16 M $\geq$ 1.1

クラスタ除去




2009年末から2011年始めまで、地震活動指数はやや高い状態を示しており、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からも同様の傾向が見られていた。これは、2009年8月11日に発生した駿河湾の地震(M6.5)の余震活動が適切にデクラスタされていないためである。現在の地震活動指数はほぼ平常程度で推移しており、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)にも顕著な変化は見られない。

気象庁作成


愛知県（地殻内） 1997/1/1~2014/4/16 M ≥ 1.1

クラスタ除去



地震活動指数はほぼ平常であるが、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からは2013年以降の活動はやや低調に見える。


1997/ 1/ 1~2014/ 4/ 16 $M \geq 2.0$



愛知県（フィリピン海プレート内）

1997/1/1~2014/4/16 M ≥ 1.1

クラスタ除去




地震活動指数はやや少ない状態を示しているが、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)には特段の変化は見られない。


浜名湖周辺（フィリピン海プレート内）

1995/1/1~2014/4/16 M $\geq$ 1.1 *クラスタ除去したデータ



震央分布図




地震活動経過図 (規模別)




地震回数積算図





時空間分布図 (東西方向)



M-T図



地震回数積算図



[東側] 地震回数積算図 (右下図) を見ると、地震活動は2000年以降低調。


[西側] 地震回数積算図 (左下図) を見ると、2006年以降低調。

駿河湾


1990/1/1~2014/4/16 M ≥ 1.4

震央分布図

N=4364





クラスタ
除去





震央分布図



N=2143




時空間分布図(南北方向)



M-T図



地震回数積算図





2010年頃地震活動指数はやや高い状態を示しており、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からも同様の傾向が見られる。これは、2009年8月の駿河湾の地震(M6.5)と、2011年8月の駿河湾の地震(M6.2)余震活動が適切にデクラスタされていないためである。現在の地震活動指数もやや高い状態で推移している。


プレート境界とその周辺の地震活動(最近の活動状況)

(Hirose et al. (2008)によるフィリピン海プレート上面深さの±3kmの地震を抽出)

プレート境界とその周辺の地震の震央分布 (最近約1ヶ月半、Mすべて)




プレート境界とその周辺の地震の震央分布 (2002年10月以降、 $M \geq 0.5$)



2002年10月以降 ($M \geq 0.5$) で見ると、東海地域のプレート境界とその周辺の地震活動は、2007年中頃あたりからやや活発に見える。なお、2009年8月11日以降は、駿河湾の地震 ($M6.5$) の余震活動の一部を抽出している。 $M3$ を超える地震については、その震央を矢印で示しているが、これらの地震の発震機構解は想定東海地震のものとは類似の型ではない。

想定東海地震の発震機構解と類似の型の地震


1987年9月1日～2014年4月16日



想定東海地震の発震機構解と類似の型の地震を抽出した。抽出条件は、P軸の傾斜角が45度以下、かつP軸の方位角が65度以上145度以下、かつT軸の傾斜角が45度以上、かつN軸の傾斜角が30度以下とした。

プレート境界で発生したと疑われる地震の他、明らかに地殻内またはフィリピン海プレート内で発生したと推定される地震も含まれている。また、2009年までに発生した地震については、Nakamura et al. (2008)の3次元速度構造で震源とメカニズム解を再精査し、いくつかの地震は候補から削除されている。点線楕円で囲まれた地震は、2011年8月1日に発生したM6.2の地震の余震で、フィリピン海プレート内の地震である。

なお、吹き出し図中、震源球右下隣りにSの表示があるものは、発震機構解に十分な精度がない。



上記イベントの、想定震源域内におけるM-T図。


3月～4月 伊豆東部※の活動

※ 「伊豆東部の地震活動の見通しに関する情報」で対象としている領域


2014年3月以降、特に目立った地震活動はなかった。

3月下旬～4月下旬にかけて、伊豆東部の体積ひずみ計（東伊豆奈良本）及び傾斜計（伊東猪山、伊東、岡、徳永）では、雨による変化以外に目立った変化は観測されていない。


震央分布図（1997年10月1日～2014年4月16日、 $M \geq 0.5$ 、深さ0～20km）



左図内の地震の時空間分布図（南北投影）
（2013年4月1日～2014年4月16日）



左図内の地震のM-T図及び回数積算図



東伊豆地域の体積ひずみ計・傾斜計の記録
（2014年3月17日 0時～2014年4月17日 0時）

体積ひずみ・傾斜（気圧・潮汐補正）伊豆東部
2014/03/17 00:00 - 2014/04/17 00:00

EXP. NEup

2.0E-07 strain
1.0E-06 radian
50 count/hour
30 mm/hour

東伊豆奈良本LP
-2.150538E-08/DAY
伊東猪山傾NS

伊東猪山傾EW

防)伊東傾NS

防)伊東傾EW

防)岡傾NS


防)岡傾EW

防)徳永傾NS


防)徳永傾EW

鎌田地震回数

稲取雨



東伊豆奈良本は、降水に伴うひずみ変化を補正している。




防)は独立行政法人防災科学技術研究所の観測点である。

ひずみ計による観測結果 (2013年10月1日～2014年4月16日)


短期的ゆっくりすべりに起因すると見られる次の地殻変動がひずみ計で観測された。

- SSE1 : 2014年1月23日から2月7日にかけて観測された。(第334回地震防災対策強化地域判定会資料参照)
 SSE2 : 2014年3月20日から23日にかけて観測された。(第336回地震防災対策強化地域判定会資料参照)
 SSE3 : 2014年4月7日から16日にかけて観測された。(第336回地震防災対策強化地域判定会資料参照)

ひずみ計の配置図



ひずみ変化 時間値(東海地域)




※ C: 地震に伴うステップ状の変化, L: 局所的な変化, S: 例年見られる変化, M: 調整, T: 障害

※ 田原高松、新城浅谷、壳木岩倉、掛川高天神、藤枝蔵田、静岡落合は、降水に伴う ひずみ変化を補正していない。

気象庁作成

ひずみ変化 時間値(東海地域(西部))



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。

※記号Vは体積ひずみを、Sは多成分ひずみ計で観測した線ひずみより計算した面積ひずみを示す。

※田原高松、新城浅谷、亮木岩倉は、降水に伴うひずみ変化を補正していない。

※田原福江は、地下水の汲み上げに伴うひずみ変化を補正している。


SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2014.01.23-02.07
SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2014.03.20-03.23
SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2014.04.09-04.16

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

表示観測点の名称

田原福江	たはらふくえ
田原高松	たはらたかまつ
蒲郡清田	がまごおりせいだ
新城浅谷	しんしろあさや
浜松三ヶ日	はまつみつかび
亮木岩倉	うるぎいわくら
浜松佐久間	はまつさくま
浜松宮口	はまつみやぐち
浜松横川	はまつよこかわ
浜松春野	はまつはるの
掛川富部	かけがわとんべ

ひずみ変化 時間値(東海地域(東部))



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。

※記号Vは体積ひずみを、Sは多成分ひずみ計で観測した線ひずみより計算した面積ひずみを示す。

※掛川高天神、藤枝蔵田、静岡落合は、降水に伴うひずみ変化を補正していない。

SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2014.03.20-03.23


表示観測点の名称

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

掛川高天神	かけがわとかてんじん
島田川根	しまだかわね
川根本町東藤川	かわねほんちょう
	ひがしふじかわ
御前崎大山	おまえざきおおやま
御前崎佐倉	おまえざきさくら
藤枝蔵田	ふじえだくらた
牧之原坂部	まきのはらさかべ
藤枝花倉	ふじえだはなくら
静岡落合	しずおかおちあい
静岡漆山	しずおかうるしやま
静岡但沼	しずおかただぬま

気象庁作成

ひずみ変化 時間値(伊豆地域)



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。


・ 特記事項なし。

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

表示観測点の名称

富士鶴無ヶ淵	ふじう ないがふち
湯河原鍛冶屋	ゆがわらかじや
熱海下多賀	あたみしもたが
東伊豆奈良本	ひがしいずならもと
伊豆小下田	いずこしもだ
南伊豆入間	みなみいずいるま
大島津倍付	おおしまつばいつき

ひずみ変化 時間値(南関東地域)




・ 特記事項なし。

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

表示観測点の名称

秦野菩提	はだのぼだい
日野程久保	ひのほどくぼ
横浜川和	よこはまかわわ
三浦三崎	みうらみさき
横須賀馬堀	よこすかまぼり
館山中里	たてやまなかざと
富津望井	ふつつもちい
鴨川八色	かもがわやいろ
長柄刑部	ながらおさかべ
大多喜宇筒原	おおたきうとうばら
勝浦墨名	かつうらとな
匝瑳飯高	そうさいいだか
銚子明神	ちようしみようじん


気象庁作成




※面積ひずみは、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

ひずみ変化 日平均値(伊豆・南関東)


↑30000 nstrain
100 hPa
100 mm



掛川富部(かけがわとんべ) ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2014.01.23-02.07

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

掛川富部ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1、2、3の
各方向成分から1999年7月1日を基点として算出

Exp.
↑ 5000 nstrain




*各成分の括弧付き数字はスケールの番号に対応


※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

←→ 伸び
→← 縮み
2.0e-06 strain

浜松春野（はまつはるの）ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2014.01.23-02.07
SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2014.03.20-03.23

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

浜松春野ひずみ変化 日値

・ 最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ2、3、4の
各方向成分から2003年1月1日を基点として算出


Exp.
↑ 10000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

←→ 伸び
→← 縮み
2.0e-06 strain

浜松佐久間（はまつさくま）ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2014.01.23-02.07
SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2014.03.20-03.23
SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2014.04.07-04.16

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

浜松佐久間ひずみ変化(日値)


・ 最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1、2、3の
各方向成分から2000年1月1日を基点として算出

Exp.
↑ 5000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

川根本町東藤川(かねほんちょう ひがしふじかわ) ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。




SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2014.03.20-03.23

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

川根本町東藤川ひずみ変化 日値

- ・ 最大剪断ひずみおよび面積ひずみはひずみ1、2、3の各方向成分から2000年1月1日を基点として算出


Exp.
↑ 2000 nstrain




* 最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うコサイスミックなステップを除去して計算している。

←→ 伸び
→← 縮み
2.0e-07 strain

浜松宮口（はまつみやぐち）ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2014.01.23-02.07

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

浜松宮口ひずみ変化 日値

・ 最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1、2、3の
各方向成分から2002年7月1日を基点として算出



Exp.
↑ 5000 nstrain



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

←→ 伸び
→→→ 縮み
1.0e-06 strain

静岡落合(しずおかおちあい) ひずみ変化 時間値




・ 特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

静岡落合ひずみ変化 日値

・ 最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1、2、3の
各方向成分から2011年1月17日を基点として算出


Exp.
↑ 20000 nstrain



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の
変化を除去して計算している。


← 伸び
→ 縮み
5.0e-06 strain

藤枝蔵田(ふじえだくらた) ひずみ変化 時間値



() 内は測定方位
[] 内は面積ひずみ計算に
用いた成分

※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。




・ 特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

藤枝蔵田ひずみ変化 日値

・ 最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1、2、3の
各方向成分から2011年1月17日を基点として算出


Exp.
↑ 50000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の
変化を除去して計算している。

← 伸び
→ 縮み
5.0e-06 strain

掛川高天神（かけがわたかてんじん） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。




・ 特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

掛川高天神ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1、2、3の
各方向成分から2011年1月17日を基点として算出


Exp.
↑ 30000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の
変化を除去して計算している。

←→ 伸び
→← 縮み
1.0e-05 strain

売木岩倉(うるぎいわくら) ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2014.01.23-02.07
SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2014.03.20-03.23

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

売木岩倉ひずみ変化 日値

- ・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1、2、3の各方向成分から2011年1月17日を基点として算出


Exp.
↑ 20000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

 伸び
 縮み
 1.0e-05 strain

新城浅谷(しんしろあさや) ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。



SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2014.01.23-02.07

SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2014.04.09-04.16

C : 地震に伴うステップ状の変化

L : 局所的な変化

S : 例年見られる変化


M : 調整

T : 障害

新城浅谷ひずみ変化 日値

- ・ 最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1、2、3の各方向成分から2011年1月17日を基点として算出


Exp.
↑ 20000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

← 伸び
→ 縮み
2.0e-06 strain

田原高松(たはらたかまつ) ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2014.01.23-02.07

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

田原高松ひずみ変化 日値

・ 最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1、2、3の
各方向成分から2011年1月17日を基点として算出

Exp.
↑ 20000 nstrain



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の
変化を除去して計算している。


← 伸び
→ 縮み
5.0e-06 strain

多成分ひずみ計データ


ひずみ1・2・3成分(浜松春野は、2・3・4成分)から90日前を基準として算出

2012.10.01~2014.04.14


基準日:2012/07/03 比較日:2012/10/01




基準日:2012/10/03 比較日:2013/01/01




基準日:2013/01/01 比較日:2013/04/01




基準日:2013/04/02 比較日:2013/07/01




基準日:2013/07/03 比較日:2013/10/01




基準日:2013/10/03 比較日:2014/01/01



基準日:2014/01/01 比較日:2014/04/01



基準日:2014/01/17 比較日:2014/04/17



多成分ひずみ計データ 新設点

ひずみ1・2・3成分から90日前を基準として算出

2012.10.01~2014.04.14


基準日:2012/07/03 比較日:2012/10/01




基準日:2012/10/03 比較日:2013/01/01




基準日:2013/01/01 比較日:2013/04/01




基準日:2013/04/02 比較日:2013/07/01




基準日:2013/07/03 比較日:2013/10/01




基準日:2013/10/03 比較日:2014/01/01



基準日:2014/01/01 比較日:2014/04/01



基準日:2014/01/17 比較日:2014/04/17



東海地域の短期的ゆっくりすべりの監視

2014. 03. 01~2014. 04. 17


今期間、気象庁が監視している東海地方の浜松春野、浜松佐久間、川根本町東藤川び売木岩倉で短期的ゆっくりすべりに伴うひずみ計の変化が観測された。

東海周辺ひずみ変化 1

<2014/ 3/ 1 0: 0 ~2014/ 4/18 0: 0 >

気圧、潮汐、降水、地下水(田原福江)補正データ

1.0E-07 strain
60 mm/Hour
10 count/Hour





東海周辺ひずみ変化2

<2014/ 3/ 1 0: 0 ~2014/ 4/18 0: 0 >

気圧、潮汐、降水、地下水(田原福江)補正データ

2.0E-07 strain
30 mm/1hour
10 count/Hour




- 体積ひずみ観測点
- ◇ 多成分ひずみ観測点

※浜松春野・川根本町東藤川は静岡県整備

気象庁作成

GNSS6時間値による面的監視




対象範囲(内側の矩形内)と使用観測点(●印)。+印の観測点はデータ不安定な
により今回の解析に使用していない。


東海地域におけるGNSS6時間値(国土地理院)を用いて、最近1日間及び1週間の
中央値を過去と比較した。夏季に解析値のばらつきが見られるほかは特に目立っ
た変位は見られない。

※GNSS(Global Navigation Satellite System)とは、GPSをはじめとする衛星測
位システム全般を指す呼称。

最近1日間とその前1週間との比較







最近1週間とその前1ヶ月間との比較



最近1年間(2013年4月1日00:00～2014年4月17日00:00)の 面的監視による対象範囲内の最大値の経過

(前ページまでのカラーマッピングはこれらのグラフの右端の状況。)



夏季に解析値のばらつきが見られる。

点線はノイズレベルであり、異常検知の閾値。閾値は、2006年1月～2007年12月の2年間分のデータを元に、1年に1回出現する最大値・最小値を把握できる値を求め設定。

* 1)の上下成分の1日/1週間は振幅を1/3倍、* 2)の発散ひずみ成分の1日/1週間は振幅を1/2倍にしてある。

GNSS 日値による面的監視（南海トラフ沿い）

今期間の解析結果には、特に目立った変位は見られない。

南海トラフ沿いの地域について紀伊水道を境に東西二つに分け、GNSS 日値 F3 解（国土地理院）を用いて、①最近 1 ヶ月間とその前の 3 ヶ月間の座標変化（各期間の中央値の差から 2 ヶ月間の変位）、②最近 1 ヶ月間と 1 年前の 1 ヶ月間との座標変化（1 年間の変位）、③各対象範囲内の最大値の経過、およびそれぞれ水平成分から計算したひずみを面的監視手法で見た。GNSS 座標値は観測点ごとに定常変位と見なされる期間の直線トレンドを除去しており、年周変化は補正していない。また、主な地震に伴うオフセットを差し引いている。東側の領域（東海～紀伊半島）は、2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震に伴う余効変動を差し引いている。

※GNSS (Global Navigation Satellite System) とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称。

① 最近 2 ヶ月間の変位とひずみ

(余効除去)

南北





東西

上下

面積ひずみ

回転

最大せん断



対象期間 : 2014/02/27-2014/03/29 (1month)

基準期間 : 2013/11/29-2014/02/27 (3month)

特に目立った変化は見られない。

②最近1年間の変位とひずみ

(余効除去)

南北


東西

上下

面積ひずみ


回転

最大せん断




(ΔEW)

ノイズレベル




(ΔNS)



ノイズレベル




(ΔUD)



(ΔUD)




(ΔUD)




(Rot)

ノイズレベル




(Rot)


ノイズレベル




(Shr)



(Shr)



(Shr)



(Shr)

対象期間：2014/02/27-2014/03/29(1month)
特に目立った変化は見られない。

基準期間：2013/02/26-2013/03/29(1month)



③ 面的監視による対象範囲内の最大値の経過 (1997 年 1 月～2014 年 3 月)

(監視期間：2 か月)



(四国)

(東海～紀伊半島；余効除去)

変位





ひずみ





(監視期間：1 年)

変位



ひずみ



豊後水道の長期的ゆっくりすべりによる影響がこれまでに3度みられるが、このほかでは特に目立った変化は見られない。