

第377回
地震防災対策強化地域判定会

記者会見資料



平成29年9月25日

気象庁

国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成している。

また、2016年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、米国大学間地震学研究連合（IRIS）の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成している。

以下の資料は暫定であり、後日の調査で変更されることがあります。

目次

定例資料

1. 地震活動概況 P. 1-7
2. 注目すべき地震・地殻活動 P. 8-14
3. 活動指数 P. 15-19
4. 静穏化・活発化領域の抽出 P. 20-21
5. 領域別地震活動 P. 22-31
6. ひずみ計による地殻変動観測 P. 32-62
7. GNSSによる面的地殻変動監視 P. 63-72
8. 東海・東南海地域の海底津波計記録の長期変化 P. 73

平成 29 年 8 月 1 日～ 9 月 19 日の主な地震活動

○ 想定震源域およびその周辺； $M \geq 3.0$ または震度 1 以上を観測した地震


特に目立った活動はなかった。

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	最大 震度	発震機構
8/25	12:05	愛知県東部	12	3.0	2	東西方向に圧力軸を持つ型
8/27	20:16	静岡県西部	33	3.0	1	東西方向に張力軸を持つ型
9/4	07:38	静岡県中部	13	3.5	1	西北西－東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型
9/7	00:48	静岡県中部	13	2.9	1	西北西－東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型
9/17	04:12	静岡県中部	34	3.8	2	北西－南東方向に張力軸を持つ型

※深部低周波地震（微動）活動

- ・ 8 月 5 日から 7 日にかけて、8 月 12 日、8 月 15 日から 16 日にかけて、8 月 23 日、9 月 3 日から 4 日にかけて及び 9 月 14 日に、三重県から伊勢湾を震央とする深部低周波地震（微動）を観測した。
- ・ 8 月 5 日に、奈良県から和歌山県を震央とする深部低周波地震（微動）を観測した。
- ・ 8 月 16 日に、愛知県を震央とする深部低周波地震（微動）を観測した。
- ・ 8 月 26 日から 29 日に、和歌山県から紀伊水道を震央とする深部低周波地震（微動）を観測した。
- ・ 9 月 3 日から 5 日にかけて、奈良県から和歌山県を震央とする深部低周波地震（微動）を観測した。
- ・ 9 月 6 日から 7 日にかけて、和歌山県を震央とする深部低周波地震（微動）を観測した。


東海地方とその周辺の広域地震活動 2017年8月1日~2017年9月19日



図中の吹き出しは、陸域M4.5以上・海域M5.0以上とその他の主な地震

気象庁作成

東海・南関東地域の地震活動 2017年8月 (1日~31日)



精度良く震源決定された地震のみを表示している。


5日に、和歌山県から奈良県（領域a）を震央とする深部低周波地震を観測した。

5日から7日かけて、12日、15日から16日にかけて及び23日に、三重県から伊勢湾（領域b）を震央とする深部低周波地震を観測した。

16日に、愛知県（領域c）を震央とする深部低周波地震を観測した

気象庁作成

東海・南関東地域の地震活動 2017年9月 (1日~19日)



精度良く震源決定された地震のみを表示している。

3日~5日に、奈良県から和歌山県 (領域a) を震央とする深部低周波地震を観測した。


3日~4日及び14日に、三重県 (領域b) を震央とする深部低周波地震を観測した。

6日~7日に、和歌山県 (領域c) を震央とする深部低周波地震を観測した。

気象庁作成


東海・南関東地域の発震機構解 (1)

Period:2017/08/01 00:00—2017/09/19 24:00



(下半球投影)
[気象庁作成]

東海・南関東地域の発震機構解 (2)




※東海地域のM2.4以上の地震及び南関東地域のM3.5以上の地震の発震機構を表示している。
各震源球の上には震源要素、下部には発震機構の断層パラメータが併記されている。
断層パラメータが併記されていないものは、発震機構解の精度がやや劣るものである。

(下半球投影)
[気象庁作成]


深部低周波地震活動 (2000年1月1日~2017年9月19日)

深部低周波地震は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。



上図矩形内の時空間分布図 (A-H投影)

(2017年8月1日~2017年9月19日)




※時空間分布図中、網掛けした期間は現在と比較して十分な検知能力がなかったことを示す。

気象庁作成

スタッキング波形によるプレート境界のすべりの監視

下図に示した監視点のスタッキングデータにおいて、以下の点で短期的ゆっくりすべりによる有意な変化を検出した。

188番等: 9月3日~6日 Mw5.3



スタッキング波形は、上図の各監視点について、宮岡・横田(2012)の手法により、気象庁、静岡県、国立研究開発法人産業技術総合研究所のひずみ計データを基に作成している。

48時間階差のスタッキングデータのS/N比と、基データの観測値と理論値の一致度から有意な変化を検出し、規模を推定している。


(参考)

- ・宮岡一樹・横田崇(2012): 地殻変動検出のためのスタッキング手法の開発, 地震, 2, 65, 205-218.
- ・露木貴裕・他(投稿中): 新しい地震活動等総合監視システム(EPOS)における地殻変動監視手法の改善, 験震時報.

スタッキング波形

表示期間: 2017/08/16.00:00 - 2017/09/18.23:00

↑ 200 nstrain
50 mm/hour
10 回/hour




気象庁作成


5月中旬頃からの静岡県中部の活動

震央分布図


(1997年10月1日～2017年9月19日、M \geq 1.0、深さ0～50km)
 灰:1997年10月1日～2017年4月30日、緑:2017年5月1日～5月30日、
 青:2017年6月1日～7月31日、桃:8月1日～9月19日



震央分布図の赤線は、Hirose et al (2008)によるフィリピン海プレート上面の深さを示す。
 点線は、東海地震の想定震源域を示す。
 領域a内の断面図(A-B投影)




領域b内のMT図・回数積算図



2017年5月中旬頃から、静岡県中部のフィリピン海プレートと陸のプレートの境界(以下、プレート境界)付近で、ややまとまった地震活動となっている。最も活発であった5月から7月頃比べると、最近はやや活動は収まっている。

今回の活動のうち、発震機構が逆断層型になる地震は以下の通りである。このうち、③、④、⑤の地震は、低角逆断層型である。




番号	発生月日	M	発震機構 (圧力軸の方向)
①	5月15日	1.9	西北西-東南東方向
②	5月15日	2.3	西北西-東南東方向
③	5月17日	2.1	西北西-東南東方向
④	6月28日	1.9	東西方向
⑤	7月1日	2.1	西北西-東南東方向

8月25日 愛知県東部の地震

震央分布図

(1997年10月1日～2017年9月19日24時、
M \geq 1.0、深さ0～20km)
2017年8月以降の地震を赤く表示




8月25日12時05分に愛知県東部の深さ12kmでM3.0の地震(最大震度2)が発生した。この地震は、地殻内で発生した。発震機構は東西方向に圧力軸を持つ型である。

1997年10月以降の活動をみると、今回の地震の震源付近(領域a内)では、M3.0以上の地震は初めてである。2007年頃から2010年頃にかけては、やや地震活動の活発な時期であった。

なお、ひずみ計には特段の変化は現れていない。


黒色の点線は東海地震の想定震源域を示す。
茶色の実線及びび点線は、新編日本の活断層による活断層を示す。

領域a内のM-T図及び回数積算図



8月27日 静岡県西部の地震

震央分布図
 (1997年10月1日～2017年9月19日、
 $M \geq 1.0$ 、深さ0～60km)
 2017年8月以降の地震を赤く表示




点線は、東海地震の想定震源域を示す

8月27日20時16分に静岡県西部の深さ33kmでM3.0の地震(最大震度1)が発生した。この地震は、発震機構が東西方向に張力軸を持つ型で、フィリピン海プレート内部で発生した。


1997年10月以降の活動をみると、今回の地震の震源付近(領域b内)は、地震活動のあまり活発な領域ではなく、M3.0以上の地震は時々発生している程度である。

なお、ひずみ計には特段の変化は現れていない。

領域a内の断面図(A-B投影)



領域b内のM-T図及び回数積算図



9月4日以降の静岡県中部の地震活動

震央分布図

(1997年10月1日～2017年9月19日、
M \geq 1.0、深さ0～20km)

灰: 1997年10月1日～2016年1月31日


黒: 2016年2月1日～2017年9月3日

赤: 2017年9月4日～9月6日




青: 2017年9月7日以降

茶色の細線は地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を示す。

点線は、東海地震の想定震源域を示す。



領域a内のM-T図及び回数積算図



9月4日07時38分に静岡県中部の深さ13kmでM3.5の地震(最大震度1)が発生した。その後、ほぼ同じ場所で、4日07時38分にM3.1の地震(M3.5の地震とほぼ同時刻に発生したため震度を分離できない)、7日00時48分にM2.9の地震(最大震度1)が発生するなど、4日から9日頃にかけてややまとまった地震活動となった。これらの地震は、地殻内で発生した。発震機構は、西北西-東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型である。


今回の地震の震源付近(領域a内)では、2016年2月から4月頃にかけてまとまった活動となり、2016年4月4日にはM3.4の地震(最大震度1)が発生した。今回の地震活動も、2016年2月から4月の活動とほぼ同じ場所で発生した。

なお、ひずみ計には特段の変化は現れていない。

領域a内の震央分布図



(2016年2月1日～2017年9月19日、深さ0～20km、M全て)

黒: 2016年2月1日～2017年9月3日、赤: 2017年9月4日～9月6日、青: 2017年9月7日以降




領域b内の断面図 (南北投影)

領域b内の時空間分布図 (東西投影)



9月17日 静岡県中部の地震

震央分布図
 (1997年10月1日～2017年9月19日24時、
 $M \geq 1.0$ 、深さ0～60km)
 2017年9月以降の地震を赤く表示




9月17日04時12分に静岡県中部の深さ34kmでM3.8の地震 (最大震度2) が発生した。この地震の発震機構は、北西-南東方向に張力軸を持つ型で、フィリピン海プレート内部で発生した。


1997年10月以降の活動をみると、今回の地震の震源付近 (領域b内) では、M3.0以上の地震はしばしば発生している。2001年4月から6月にかけてまとまった活動があり、2001年4月3日にM5.3の地震 (最大震度5強)、6月1日にM5.0の地震 (最大震度3) の地震が発生した。2001年4月3日の地震では、負傷者8人、住家一部破損76棟などの被害が生じた (日本被害地震総覧による)。

なお、ひずみ計には特段の変化は現れていない。

領域a内の断面図 (A-B投影)



領域b内のM-T図及び回数積算図



東海地域の地震活動指数 (クラスタを除いた地震回数による)

2017年9月19日現在

	① 静岡県中西部		② 愛知県		③ 浜名湖周辺			④ 駿河湾
	地殻内	フィリピン海プレート	地殻内	フィリピン海プレート	フィリピン海プレート内 全域	西側	東側	全域
短期活動指数	8	5	0	2	3	4	4	6
短期地震回数 (平均)	12 (5.29)	9 (7.00)	4 (13.16)	8 (14.15)	2 (3.72)	1 (1.43)	1 (2.28)	9 (6.06)
中期活動指数	7	4	1	3	2	3	3	6
中期地震回数 (平均)	24 (15.87)	18 (21.00)	26 (39.48)	36 (42.44)	3 (7.44)	1 (2.87)	2 (4.57)	17 (12.12)

*Mしきい値： 静岡県中西部、愛知県、浜名湖周辺：M≥1.1、駿河湾：M≥1.4


*クラスタ除去：震央距離が Δr 以内、発生時間差が Δt 以内の地震をグループ化し、最大地震で代表させる。
静岡県中西部、愛知県、浜名湖周辺： $\Delta r=3\text{km}$ 、 $\Delta t=7\text{日}$
駿河湾： $\Delta r=10\text{km}$ 、 $\Delta t=10\text{日}$

*対象期間： 静岡県中西部、愛知県：短期30日間、中期90日間
浜名湖周辺、駿河湾：短期90日間、中期180日間

*基準期間： おおむね長期的スロースリップ（ゆっくり滑り）発生前の地震活動を基準とする。
静岡県中西部、愛知県：1997年—2001年（5年間）、駿河湾：1991年—2000年（10年間）、
浜名湖周辺：1997年—2000年 および 2006年—2012年（11年間）

- [各領域の説明]
- ① 静岡県中西部：プレート間が強く「くっついている」と考えられている領域（固着域）。
 - ② 愛知県：フィリピン海プレートが沈み込んでいく先の領域。
 - ③ 浜名湖周辺：固着域の縁。長期的スロースリップ（ゆっくり滑り）が発生する場所であり、同期して地震活動が変化すると考えられている領域。
 - ④ 駿河湾：フィリピン海プレートが沈み込み始める領域。

2009年8月11日の駿河湾の地震（M6.5）と2011年8月1日の駿河湾の地震（M6.2）の余震域の活動を除いた場合での活動指数についても求めた（次ページ）。




*Hirose et al. (2008) によるプレート境界の等深線を破線で示す

指数	確率 (%)	地震数
8	1	多い
7	4	やや多い
6	10	
5	15	ほぼ平常
4	40	
3	15	やや少ない
2	10	
1	4	少ない
0	1	

地震活動指数の推移（中期活動指数）


① 静岡県中西部（対象期間：90日）

1997/1/1~2017/9/19 M ≥ 1.1




② 愛知県（対象期間：90日）

1997/1/1~2017/9/19 M ≥ 1.1




③ 浜名湖周辺（対象期間：180日）

1995/1/1~2017/9/19 M ≥ 1.1




④ 駿河湾（対象期間：180日）

1990/1/1~2017/9/19 M ≥ 1.4




2009年8月11日の駿河湾の地震（M6.5）と2011年8月1日の駿河湾の地震（M6.2）の余震域の活動を除去した場合




基準期間
 地震活動指数（0-8）

地震活動指数の推移

① 静岡県中西部



地殻内は多い(8~7)。フィリピン海プレート内はほぼ平常(5~4)。




地殻内は多い(8~7)。
フィリピン海プレート内はやや多い(6~5)。


／ : 地震活動指数 (0-8)
■ : 地震回数 (クラスタを除く)

地震活動指数の推移

② 愛知県



地殻内は少ない(0~1)。フィリピン海プレート内はやや少ない(2~3)。




地殻内はほぼ平常(5)。
フィリピン海プレート内はやや少ない(2~4)。

／ : 地震活動指数 (0-8)
■ : 地震回数 (クラスターを除く)

地震活動指数の推移

③ 浜名湖周辺（フィリピン海プレート内）


(90日) 1995/ 1/ 1~2017/ 9/19 M ≥ 1.1 (180日)



フィリピン海プレート内の地震活動はやや少ない(2~3)。

④ 駿河湾

(90日) 1990/ 1/ 1~2017/ 9/19 M ≥ 1.4 (180日)



地震活動はやや多い(6)。

ただし、2009年8月11日 駿河湾の地震 (M6.5) と、2011年8月1日 駿河湾の地震 (M6.2) の余震活動の影響が残っている。

／：地震活動指数 (0-8)
■：地震回数 (クラスタを除く)

静穏化・活発化領域の検出（東海地方、地殻内）

抽出した地震
東海地方、地殻内で発生した
M 1.1 以上の地震

- : 全期間の地震
- : 解析対象期間内に発生した地震

クラスター除去（デクラスター）
震央距離 3.0 km 以内、発生時刻 7.0 日以内
の地震をグループ化し、最大地震で代表させる

図の注釈

静穏化

- : 半径 15.0 km 以内でレベル 0
- : 半径 20.0 km 以内でレベル 0

活発化


- : 半径 15.0 km 以内でレベル 8
- : 半径 20.0 km 以内でレベル 8

タイムバー


全体：検出領域中心として解析に用いたデータの期間

- : 基準期間
- : 解析対象期間


[1] 2016/12/24--2017/03/23



[2] 2017/03/24--2017/06/21



[3] 2017/06/22--2017/09/19



静穏化・活発化領域の検出（東海地方、プレート内）

抽出した地震
東海地方、プレート内で発生した
M 1.1 以上の地震

- ：全期間の地震
- ：解析対象期間内に発生した地震

クラスタ除去（デクラスタ）
震央距離 3.0 km 以内、発生時刻 7.0 日以内
の地震をグループ化し、最大地震で代表させる

図の注釈

静穏化

- ：半径 15.0 km 以内でレベル 0
- ：半径 20.0 km 以内でレベル 0


活発化

- ：半径 15.0 km 以内でレベル 8
- ：半径 20.0 km 以内でレベル 8


タイムバー

- 全体：検出領域中心として解析に用いたデータの期間
- ：基準期間
- ：解析対象期間


[1] 2016/12/24--2017/03/23



[2] 2017/03/24--2017/06/21







[3] 2017/06/22--2017/09/19





静岡県中西部 (最近90日)



2017/6/22~2017/9/19 M ≥ 0.0 0 ≤ 深さ(km) ≤ 60



時間分布図 (A B 方向)



M-T 図










地震回数積算図

*吹き出しはM≥3.0

静岡県中西部 (地殻内)

1997/1/1~2017/9/19 M \geq 1.1

クラスタ除去










クラスタ除去後の地震回数積算図 (右下図) を見ると、長期的ゆっくりすべり発生時期 (右下図濃い網掛け領域) に対応して地震活動が変化している。2013年以降、活動が低調になっており、今回の長期的ゆっくりすべり発生が示唆されている期間と概ね対応する。

なお、今回の長期的ゆっくりすべりはすでに停止していると考えられるが、地震活動には現時点では特段の変化は見られない。

静岡県中西部 (フィリピン海プレート内)

1997/ 1/ 1~2017/ 9/ 19 M ≥ 1.1









クラスタ除去



2009年末から2011年初めまで、地震活動指数はやや高い状態を示しており、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からも同様な傾向が見られていた。これは2009年8月11日に発生した駿河湾の地震(M6.5)の余震活動が適切にデクラスタできていないためである。現在の地震活動指数は低下する傾向で推移している。

愛知県 (地殻内)
1997/1/1~2017/9/19 M ≥ 1.1

クラスタ除去




地震活動指数は2013年以降やや少ない状態を示しており、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)も、2013年以降はやや低調で推移している。

愛知県 (フィリピン海プレート内)

1997/ 1/ 1~2017/ 9/19 M \geq 1.1

クラスタ除去




クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)に、特段の変化は見られない。

浜名湖周辺 (フィリピン海プレート内)

1995/ 1/ 1~2017/ 9/19 M ≥ 1.1 *クラスタ除去したデータ

震央分布図



N=332



depth (km)
 M
 7.0 ○
 6.0 ○
 5.0 ○
 4.0 ○
 3.0 ○
 1.1 +



M-T図

n=332





時空間分布図 (東西方向)

地震回数積算図



n=142

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016



n=191

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

M-T図

地震回数積算図



[東側] 地震回数積算図 (右下図) を見ると、地震活動は2000年から傾きに変化。

[西側] 地震回数積算図 (左下図) を見ると、2006年から傾きに変化

駿河湾


1990/1/1~2017/9/19 M ≥ 1.4

震央分布図


N=4890

震央分布図




N=2451





クラスタ
除去
→





depth
(km)



時空間分布図 (南北方向)



M-I 図




地震回数積算図

2010年頃から2015年末頃まで、地震活動指数はやや高い状態で推移しており、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からも同様の傾向が見られる。これは、2009年8月の駿河湾の地震(M6.5)と、2011年8月の駿河湾の地震(M6.2)余震活動が適切にデクラスタされていないためである。

駿河湾

1990/ 1/ 1~2017/ 9/19 M ≥ 1.4





2009年8月の駿河湾の地震(M6.5)と、2011年8月の駿河湾の地震(M6.2)の余震活動域を除外した。


プレート境界とその周辺の地震活動(最近の活動状況)

(Hirose et al. (2008)によるフィリピン海プレート上面深さの±3kmの地震を抽出)


プレート境界とその周辺の地震の震央分布(最近約1ヶ月半、Mすべて)



プレート境界とその周辺の地震の震央分布
(2002年10月1日~2017年9月19日、M≥0.5)



回数積算図とM-T図




2002年10月以降(M≥0.5)で見ると、東海地域のプレート境界とその周辺の地震活動は、2007年中頃あたりからやや活発に見える。なお、2009年8月11日以降は、駿河湾の地震(M6.5)の余震活動の一部を抽出している。M3を超える地震については、その震央を矢印で示しているが、これらの地震の発震機構解のうち、想定東海地震のものと類似の型に相当したものは2017年1月27日の地震である。

※震央分布図中の点線は、Hirose et al. (2008)によるフィリピン海プレート上面の深さを示す。


気象庁作成

想定東海地震の発震機構解と類似の型の地震

1987年9月1日～2017年9月19日
(2010年1月以降の地震に吹き出しを付けている)



上図イベントの、想定震源域内におけるM-T図



想定震源域内で発生した地震のうち、2010年1月以降に発生したM3.0以上かつプレート境界からの鉛直方向の距離が±3km以内の地震の枠を赤く表示

吹き出し内に () で記載した値は、Hirose et al. (2008)によるプレート境界からの鉛直方向の距離。+はプレート境界より浅く、-は深いことを示す。

震央分布図中の点線は、Hirose et al. (2008)によるプレート境界を示す。

最近発生した5つの地震については、丸数字で順番を示す。

想定東海地震の発震機構解と類似の型の地震を抽出した。抽出条件は、P軸の傾斜角が45度以下、かつP軸の方位角が65度以上145度以下、かつT軸の傾斜角が45度以上、かつN軸の傾斜角が30度以下とした。

プレート境界で発生したと疑われる地震の他、明らかに地殻内またはフィリピン海プレート内で発生したと推定される地震も含まれている。点線楕円で囲まれた地震は、2011年8月1日に発生したM6.2の地震の余震で、フィリピン海プレート内の地震である。

なお、吹き出し図中、震源球右下隣りにSの表示があるものは、発震機構解に十分な精度がない。

ひずみ計による観測結果 (2017年3月1日～2017年9月19日)


短期的ゆっくりすべりに起因すると見られる次の地殻変動がひずみ計で観測された。

SSE1 : 2017年3月28日から4月3日にかけて観測された。(第372回判定会資料参照)

SSE2 : 2017年5月18日から19日にかけて観測された。(第373回判定会資料参照)


SSE3 : 2017年6月26日から29日にかけて観測された。(第375回判定会資料参照)

ひずみ計の配置図




※観測点名の記号Vは体積ひずみを、Sは多成分ひずみ計で観測した線ひずみより計算した面積ひずみを示す。
 ※観測点名、観測成分名右側の縦棒は、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。
 ※多成分ひずみ計成分名の() 内は測定方位、[] 内は面積ひずみ計算に用いた成分を示す。
 ※多成分ひずみ計の最大剪断ひずみ、面積ひずみ及び主軸方向は、広域のひずみに換算して算出している。

東海地域 ひずみ変化 時間値



※田原高松、新城浅谷、売木岩倉、掛川高天神、藤枝蔵田、静岡落合は、降水に伴うひずみ変化を補正していない。
※田原福江は、地下水の汲み上げに伴うひずみ変化を補正している。

東海地域（西部） ひずみ変化 時間値




※田原高松、新城浅谷、売木岩倉は、降水に伴うひずみ変化を補正していない。
※田原福江は、地下水の汲み上げに伴うひずみ変化を補正している。

SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2017.03.28-04.03
SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2017.05.18-05.19
SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2017.06.26-06.29

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害

東海地域（東部） ひずみ変化 時間値




※掛川高天神、藤枝蔵田、静岡落合は、降水に伴うひずみ変化を補正していない。

SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2017.06.26-06.29

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害


伊豆地域 ひずみ変化 時間値



・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害


南関東地域 ひずみ変化 時間値



・特記事項なし。


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

東海地域 ひずみ変化 日平均値



※面積ひずみは、東北地方太平洋沖地震および熊本地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


伊豆・南関東地域 ひずみ変化 日平均値



掛川富部（かけがわとんべ） ひずみ変化 時間値

・気圧, 潮汐, 降水, 地磁気補正データ

Exp.
↑ 100 nstrain
30 hPa
50 mm/day



・特記事項なし。


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



掛川富部 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ1・2・3の各方向成分から1999年7月1日を基点として算出


Exp.
↑ 5000 nstrain



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成


浜松春野（はまつはるの） ひずみ変化 時間値



浜松春野 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 2・3・4 の各方向成分から2003年1月1日を基点として算出


Exp.
↑ 5000 nstrain



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成


浜松佐久間（はまつさくま） ひずみ変化 時間値



浜松佐久間 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ1・2・3の各方向成分から2000年1月1日を基点として算出

Exp.
↑ 5000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成

川根本町東藤川 (かわねほんちょうひがしふじかわ) ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ

Exp.
↑ 100 nstrain
30 hPa
50 mm/day



SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2017.06.26-06.29


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



川根本町東藤川 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ1・2・3の各方向成分から2000年1月1日を基点として算出


Exp.
↑
2000 nstrain



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成

浜松宮口（はまつみやぐち） ひずみ変化 時間値



・特記事項なし。


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



浜松宮口 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 1・3・4 の各方向成分から2002年7月1日を基点として算出


Exp.
↑ 5000 nstrain



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震および熊本地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成

静岡落合（しずおかおちあい） ひずみ変化 時間値



・特記事項なし。


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



静岡落合 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 5・6・4 の各方向成分から2011年1月17日を基点として算出

Exp.
↑ 20000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成

藤枝蔵田（ふじえだくらた） ひずみ変化 時間値

・気圧, 潮汐, 地磁気補正データ

Exp.
↑ 1000 nstrain
30 hPa
100 mm/day



・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- I : 障害




気象庁作成

藤枝蔵田 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 5・6・7 の各方向成分から2011年1月17日を基点として算出

Exp.
↑ 50000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成

掛川高天神 (かけがわたかてんじん) ひずみ変化 時間値


・気圧, 潮汐, 地磁気補正データ

Exp.
↑ 500 nstrain
30 hPa
100 mm/day



・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




気象庁作成

掛川高天神 ひずみ変化 日値


・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 5・6・7 の各方向成分から2011年1月17日を基点として算出

Exp.
↑ 30000 nstrain



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

売木岩倉（うるぎいわくら） ひずみ変化 時間値



SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2017.06.26-06.29


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



売木岩倉 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 6・7・8 の各方向成分から2011年1月17日を基点として算出


Exp.
↑ 20000 nstrain



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


気象庁作成

新城浅谷（しんしろあさや） ひずみ変化 時間値



SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2017.03.28-04.03
SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2017.05.18-05.19


- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



新城浅谷 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 5・6・8の各方向成分から2011年1月17日を基点として算出


Exp.
↑ 5000 nstrain



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成

田原高松（たはらたかまつ） ひずみ変化 時間値



SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2017.03.28-04.03
SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2017.05.18-05.19


C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害



田原高松 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 5・6・7 の各方向成分から2011年1月17日を基点として算出

Exp.
↑
10000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東北地方太平洋沖地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成


多成分ひずみ計日値による主ひずみ解析結果

(90日間の変化量から算出)


観測点配置図




基準日：2016/03/03 比較日：2016/06/01




基準日：2016/06/03 比較日：2016/09/01




基準日：2016/09/02 比較日：2016/12/01




基準日：2016/12/01 比較日：2017/03/01




基準日：2017/03/03 比較日：2017/06/01




基準日：2017/06/03 比較日：2017/09/01



基準日：2017/06/21 比較日：2017/09/19



GNSS 6時間値による面的監視



対象範囲(内側の矩形内)と使用観測点(●印)。+印の観測点はデータ不安定などにより今回の解析に使用していない。

東海地域におけるGNSS6時間値(国土地理院)を用いて、最近1日間及び1週間の中央値を過去と比較した。異常検知の閾値(ノイズレベル)は、2006年1月～2007年12月の2年間分のデータを元に、1年に1回出現する最大値・最小値を把握できる値を求め設定。


夏季に解析値のばらつきが見られるほかは特に目立った変位は見られない。

※GNSS(Global Navigation Satellite System)とは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称。


最近1日間とその前1週間との比較

対象期間：2017/09/18 00:00 - 2017/09/19 00:00 UTC (1日)
 基準期間：2017/09/11 00:00 - 2017/09/18 00:00 UTC (1週間)

対象期間：2017/09/18 00:00 - 2017/09/19 00:00 UTC (1日)
 基準期間：2017/09/11 00:00 - 2017/09/18 00:00 UTC (1週間)




最近1年間(2016年9月1日00:00~2017年9月19日00:00)の 面的監視による対象範囲内の最大値の経過




最近1週間とその前1ヶ月間との比較

対象期間：2017/09/12 00:00 - 2017/09/19 00:00 UTC (1週間)
 基準期間：2017/08/13 00:00 - 2017/09/12 00:00 UTC (1ヶ月)

対象期間：2017/09/12 00:00 - 2017/09/19 00:00 UTC (1週間)
 基準期間：2017/08/13 00:00 - 2017/09/12 00:00 UTC (1ヶ月)



最近1年間(2016年9月1日00:00~2017年9月19日00:00)の 面的監視による対象範囲内の最大値の経過



GNSS 日値による面的監視

今期間の解析結果には、特に目立った変位は見られない。

南海トラフ沿いの地域について東海地域・紀伊半島・四国地域の三つに分け、GNSS日値(国土地理院)を用いて、以下の通り面的監視手法で見た。

- ① 最近1ヶ月間とその前の3ヶ月間との座標変化と水平ひずみ(R3解)
- ② 最近1ヶ月間と1年前の1ヶ月間との座標変化と水平ひずみ(R3解)
- ③ 各対象範囲内の最大値の経過(F3解)


面的監視手法(小林, 2005¹⁾)とは、GNSSデータを用いて以下の手順で解析したものである。

1. 観測点ごとに定常変位と見なされる期間の直線トレンドを除去
2. 主な地震に伴うオフセットを除去
3. 各期間中の中央値から、観測点ごとの座標変化を計算
4. 各領域内の座標変化の中央値を固定値として各観測点の変化量を計算
5. 各領域の外周を変化なしと仮定
6. 緯度経度0.5度ごとに変化量の中央値を求め、スプライン関数で平滑化する
7. 平滑化した格子点データからノイズレベルを算出する
8. 格子点データから水平ひずみを計算
9. 得られた格子点データから等値線図を作成
10. 格子点データの最大値・最小値から時系列グラフを作成


1) 小林昭夫(2005): GPS東海地域3時間解析値の面的監視, 験震時報第68巻第3~4号 P99~104

※GNSS(Global Navigation Satellite System)とは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称。

最近2ヶ月間の変位とひずみ - 東海地域 -




対象範囲内の最大値の経過(1997年1月~2017年9月)




気象庁・気象研究所作成

最近1年間の変位とひずみ — 東海地域 —




対象範囲内の最大値の経過 (1997年1月～2017年9月)




気象庁・気象研究所作成

最近2ヶ月間の変位とひずみ —紀伊半島—




対象範囲内の最大値の経過 (1997年1月～2017年9月)




気象庁・気象研究所作成


最近1年間の変位とひずみ — 紀伊半島 —




対象範囲内の最大値の経過 (1997年1月～2017年9月)



最近2ヶ月間の変位とひずみ —四国地域—




対象範囲内の最大値の経過 (1997年1月～2017年9月)




気象庁・気象研究所作成

最近1年間の変位とひずみ —四国地域—



対象範囲内の最大値の経過 (1997年1月～2017年9月)




気象庁・気象研究所作成


東海・東南海地域の海底津波計記録の長期変化

海底津波計 日値 (潮汐補正データ)
1995/01/01 - 2017/09/18

隆起
1000 mm
沈降



1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



気象庁作成