


浅間山

○ 火山活動評価：静穏な状況（レベル 1）

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しています。

現在の火山活動度レベルは 1 です。平成 18 年 9 月 22 日以降、レベル 1 が継続しています。



○ 概況

・ 噴煙など表面現象の状況（図 1、図 2、図 3－②③④、表 1）

山頂火口からの噴煙活動は引き続きやや活発で、噴煙高度は火口縁上 100～200m で推移しました。

16日に実施した観測では、二酸化硫黄の放出量は 1 日あたり 100～200 t 程度で、昨年 8 月以降やや少ない状態が続いています。

・ 地震や微動の発生状況（図 3－⑤⑥⑦⑧、図 4、図 6、表 1）

火山性地震の回数は 1 日あたり 4～25 回とやや少ない状態で経過しました。これらのうち、ほとんどが周期の長い特徴を持つ BL 型地震（波形例は図 6 参照）でした。震源は求まっていますが、山頂火口直下のごく浅い所に発生していると推定されます。

このほか、周期の短い特徴を持つ BH 型地震（波形例は図 6 参照）が発生しており、求まった震源はこれまでと同様に山頂直下の深さ約 1～3 km に分布していました。また、A 型地震（波形例は図 6 参照）は山頂のやや西寄りの深さ約 4 km 付近に 1 回発生しています。

火山性微動の回数は 1 日あたり 0～1 回で、いずれも振幅の小さなものでした。月別回数は 4 回と先月（14 回）に比べると少なくなっています。

・ 地殻変動の状況（図 3－⑨⑩）

山体周辺の GPS 連続観測では、特段の変化はありませんでした。このほか、傾斜観測¹⁾や光波測距観測²⁾でも、火山活動の高まりを示すような変化はありませんでした。

1) 火山活動による山体の傾きを精密に観測する機器。火山体直下へのマグマの注入等により、山体が膨張・収縮した場合に変化が観測されることがある。

2) 光波距離計を用いて山体に設置した反射鏡までの距離を測定する機器。火山体直下へのマグマの注入等により、山体が膨張・収縮した場合に距離の変化が観測されることがある。

※この資料は気象庁のほか、国土交通省利根川水系砂防事務所、陸上自衛隊第 12 旅団、東京大学及び独立行政法人産業技術総合研究所のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図 50m メッシュ（標高）』を使用しています（承認番号：平 17 総使、第 503 号）。

陸上自衛隊第12旅団撮影



図 1※ 浅間山 山頂部の噴煙の状況（2月21日、西上空付近から撮影）



図 2 浅間山 山頂部の噴煙の状況（2月26日、鬼押し出し遠望カメラによる）




図 3※ 浅間山 最近の火山活動の推移（2002 年 1 月～2007 年 2 月）

⑥⑦⑧ 地震の種類別（図 6 参照）に計数を開始した 2002 年 6 月 1 日からのデータを掲載。




図4※ 浅間山 火山性地震の震源分布（2006年3月1日～2007年2月28日）




図5 浅間山 気象庁の観測点配置図（小さな白丸は観測点位置を示しています）

GPS 基線③は図3の⑨に対応しています。

表 1※ 浅間山 2007 年 2 月の火山活動状況

	噴火回数	火山性地震の回数 3)						微動回数	噴煙の状況 4)		火映強度 5)	備考
		A型	BH型	BL型	Ex型	その他	地震合計		日最高(m)	噴煙量		
1日	0	0	9	8	0	0	17	0	x	x	-	
2日	0	0	6	6	0	0	12	0	100	1	-	
3日	0	0	5	17	0	0	22	0	100	1	-	
4日	0	0	4	2	0	0	6	0	50	1	-	
5日	0	1	3	8	0	0	12	0	300	2	-	
6日	0	0	2	11	0	0	13	0	100	1	-	
7日	0	0	4	9	0	0	13	0	200	1	-	
8日	0	0	4	16	0	0	20	0	100	1	-	
9日	0	0	3	6	0	0	9	0	x	x	-	
10日	0	0	4	9	0	0	13	1	x	x	-	
11日	0	0	5	13	0	0	18	1	x	x	-	
12日	0	0	3	5	0	0	8	0	100	1	-	
13日	0	0	5	12	0	0	17	0	100	1	-	SO2放出量:100-170t/日
14日	0	0	2	14	0	0	16	0	x	x	x	
15日	0	0	3	4	0	0	7	0	x	x	x	
16日	0	0	4	4	0	0	8	0	100	1	-	
17日	0	0	7	7	0	0	14	0	100	1	-	
18日	0	0	3	15	0	0	18	0	x	x	-	
19日	0	0	10	4	0	0	14	0	100	1	-	
20日	0	0	8	4	0	0	12	1	x	x	x	
21日	0	0	2	12	0	0	14	0	100	1	-	
22日	0	0	1	3	0	0	4	1	100	x	-	
23日	0	0	7	9	0	0	16	0	x	x	-	
24日	0	0	6	9	0	0	15	0	100	1	-	
25日	0	0	8	17	0	0	25	0	200	1	-	
26日	0	0	2	12	0	0	14	0	100	1	-	
27日	0	0	8	12	0	0	20	0	200	1	-	
28日	0	0	3	3	0	0	6	0	200	2	-	
合計	0	1	131	251	0	0	383	4				

3) 火山性地震の計数基準はB点振幅 $0.1 \mu\text{m}$ 以上でS-P時間3秒以内、火山性地震の種類は以下のとおりです。




図 6 浅間山 主に発生している火山性地震の特徴と波形例

4) 噴煙の高さと噴煙量は定時観測（09 時・15 時）の日最大値です。噴煙量は以下の 7 階級で観測しています。

- 1：極めて少量 2：少量 3：中量 4：やや多量 5：多量 6：極めて多量
7：噴煙量 6 以上の大噴火。噴煙が山体を覆うぐらい多く、噴煙の高さは成層圏まで達したとみられる

5) 火映の強度は以下の 4 段階で観測しています。

- 0：肉眼では確認できず、高感度カメラのみ確認できる程度 1：肉眼でようやく認められる程度
2：肉眼で明らかに認められる程度 3：肉眼で非常に明るい色で異常に感じる程度
－：火映なし ×：視程不良（終日観測できなかった場合）