

御嶽山の火山活動解説資料(平成27年6月)

気象庁地震火山部
火山監視・情報センター

御嶽山の火山活動は低下した状態が続き、昨年(2014年)10月以降噴火が発生していないことから、昨年9月27日と同程度の噴火の可能性は低下していると考えられます。

これらのことから、6月26日17時00分に噴火警戒レベルを3(入山規制)から2(火口周辺規制)に引下げ、警戒の必要な範囲を火口から概ね1kmの範囲に縮小しました。その後警報事項に変更はありません。

しかしながら、弱いながらも噴煙活動や地震活動が続いていることから、昨年9月27日より規模の小さな噴火が今後も突発的に発生する可能性は否定できません。

火口から概ね1kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。風下側では降灰及び風の影響を受ける小さな噴石に注意してください。

活動状況

- ・噴煙など表面現象の状況(図1、図4 - 、図5 - 、表1)

三岳黒沢及び鈴蘭高原に設置している遠望カメラ、中部地方整備局が滝越等に設置しているカメラによる観測では、白色の噴煙が火口縁上100~700mの高さで経過しています。また、上空の風が弱いときには一時的に最高で1000mの高さまで上がりました。

- ・山頂及び火山ガスの状況(図2、図4 - 、表1)

6月10日に長野県と合同で現地調査を実施しました。山頂では硫化水素が最高で6ppm検出されましたが、二酸化硫黄は検出されませんでした¹⁾。

地獄谷内には主な噴気孔が5~6箇所あり、いずれもやや活発な白色噴煙の活動を確認しました。赤外熱映像装置²⁾による観測では噴気孔の温度は最高で108(測定距離約300m)であることを確認しました。

- ・地震や微動の発生状況(図3、図4 - 、図5 - 、表1)

今期間、火山性地震は少ない状態で経過していますが、2014年8月以前の状況には戻っていません。

低周波地震を5回観測しています(5月は2回)。これらの地震の発生時及びその前後で、噴煙や地殻変動の観測データに火山活動の高まりを示す変化はみられていません。

火山性微動は観測されていません。

- ・地殻変動の状況(図4 - 、図5 - ~ 、図6~7、図9)

今期間、傾斜計³⁾やGNSS⁴⁾連続観測で、火山活動の高まりを示す変化は観測されていません。

1) いずれも携帯型火山ガス検知器による測定です。

2) 赤外熱映像装置による観測。赤外熱映像装置は、物体が放射する赤外線を感知して温度を測定する測器で、熱源から離れた場所から測定することができる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で実際の温度よりも低く測定される場合があります。

3) 火山活動による山体の傾きを精密に観測する機器。火山体直下へのマグマの貫入等により変化が観測されることがあります。1マイクロラジアンは1km先が1mm上下するような変化量です。

4) GNSS(Global Navigation Satellite Systems)とは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページ(<http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/volcano.html>)でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料(平成27年7月分)は平成27年8月10日に発表する予定です。

この資料は気象庁のほか、中部地方整備局、国土地理院、東京大学、京都大学、名古屋大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所、長野県及び岐阜県のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図50mメッシュ(標高)』『数値地図25000(行政界・海岸線)』『数値地図25000(地図画像)』を使用しています(承認番号:平26情使、第578号)。



図 1 御嶽山 噴煙の状況

左図：三岳黒沢遠望カメラ（剣ヶ峰山頂の南東約 15km、6 月 28 日撮影）

右図：中部地方整備局の滝越設置のカメラ（剣ヶ峰山頂の南南西約 6 km、6 月 28 日撮影）

- ・白色の噴煙が火口縁上 100～700mの高さで経過しています。



撮影場所及び登山ルート




図 2 御嶽山 山頂付近の状況及び地表面温度分布（2015 年 6 月 10 日 10 時 50 分奥の院から撮影）
上図：可視画像、下図：温度分布²⁾

- ・地獄谷内には主な噴気孔が 5～6 箇所あり、いずれもやや活発な白色噴煙の活動を確認しました。赤外熱映像装置²⁾による観測では噴気孔の温度は最高で 108（測定距離約 300m）であることを確認しました。




図3 御嶽山 震源分布図(2006年12月1日~2015年6月30日)

: 2006年12月1日~2015年5月31日 : 2015年6月1日~6月30日

・今期間発生した地震の震源は、剣ヶ峰山頂付近の海面下0~2kmに分布しています。

観測点の稼動状況により震源決定精度が低下している場合があります。




図4 御嶽山 最近の火山活動経過図(2014年8月15日~2015年5月31日)

遠望カメラによる噴煙の高さ 噴煙の高さは日最大値(噴火時以外は定時観測(09時・15時)の値)。矢印は噴火発生を示します。また、視界不良時には噴煙の高さが表示されていませんが、2014年9月27日の噴火発生以降は噴煙が連続的に発生しているものと考えられます。

図8のGNSS基線 に対応した基線長の変化を示します。グラフの空白部分は欠測を示します。点線で囲んだ変化は、火山活動との関係はないと考えられます。

- ・火山性地震は今期間少ない状態で経過しています。
- ・火山性微動は観測されていません。
- ・山頂での現地調査の結果、二酸化硫黄の放出量は検出限界以下となっています。




図5 御嶽山 長期間の火山活動経過図(2006年1月1日~2015年6月30日)

遠望カメラによる噴煙の高さ 噴煙の高さは日最大値(噴火時以外は定時観測(09時・15時)の値)。矢印は噴火開始を示します。

~ GNSS連続観測による基線長変化(国): 国土地理院の基線で2014年10月以降縮みの傾向がみられます。

には東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)に伴うステップ状の変化がみられます。

2010年10月以降のデータについては、電離層の影響を補正する等、解析方法を改良しています。

図中 ~ は図9のGNSS基線 ~ に対応します。グラフの空白部分は欠測を示します。




図6 御嶽山 田の原観測点(剣ヶ峰山頂の南東約3 km)の傾斜変動
(2014年8月1日~2015年6月30日)

データは時間平均値、潮汐補正済み

- ・今期間、特段の変化は認められません。
- ・田の原観測点では、原因不明のステップがみられることがあります(図中下向き矢印)。
- ・主に東西成分に降水によるとみられる変動が現れることがあります(図中点線丸印)。

御嶽山周辺GNSS連続観測基線図






図7 御嶽山 国土地理院によるGNSS基線変化グラフ⁵⁾

左図：2006年1月1日～2015年6月27日、右図：2014年1月1日～2015年6月27日

(1)(2)のグラフはそれぞれ上図中の1、2の基線に対応。

5) 最終解は国際的なGNSS観測機関(IGS)が計算したGNSS衛星の最終の軌道情報(精密暦)で解析した結果で、最も精度の高いものです。速報解は速報的な軌道情報による解析結果で、最終解に比べ精度は若干下回りますが、早期に解を得ることができます。

- ・国土地理院のGNSSデータの解析によると、長期的には2014年9月上旬頃から御嶽山を挟む基線でごくわずかな伸びがみられ、また、9月下旬頃からごくわずかな縮みの傾向がみられ、2014年12月までに9月上旬頃の基線長に戻っています。

表 1 御嶽山 2015 年 6 月の火山活動状況

6月	噴火回数	火山性地震回数 ⁶⁾				火山性微動回数	噴煙の状況 ⁷⁾				備考
		高周波地震	やや低周波地震	低周波地震	日地震回数合計		山頂火口		地獄谷下部		
							日最高(m)	噴煙量	日最高(m)	噴煙量	
1日	0	11	0	0	11	0	X	X	X	X	
2日	0	2	0	0	2	0	200	1	20	1	白色噴煙
3日	0	6	0	0	6	0	X	X	X	X	
4日	0	2	0	0	2	0	100	1	50	1	白色噴煙
5日	0	4	1	0	5	0	200	1	20	1	白色噴煙
6日	0	7	0	0	7	0	X	X	80	1	白色噴煙
7日	0	4	0	0	4	0	X	X	X	X	
8日	0	2	0	0	2	0	X	X	X	X	
9日	0	1	0	0	1	0	X	X	X	X	
10日	0	2	0	0	2	0	200	1	20	1	白色噴煙
11日	0	6	2	0	8	0	300	1	50	1	白色噴煙
12日	0	2	0	1	3	0	300	1	50	1	白色噴煙
13日	0	3	0	0	3	0	400	1	50	1	白色噴煙
14日	0	2	0	0	2	0	X	X	X	X	
15日	0	2	0	1	3	0	500	2	80	1	白色噴煙
16日	0	3	0	2	5	0	700	2	100	1	白色噴煙
17日	0	4	0	0	4	0	X	X	X	X	
18日	0	2	0	0	2	0	X	X	40	1	白色噴煙
19日	0	2	0	0	2	0	500	2	X	X	白色噴煙
20日	0	1	0	0	1	0	X	X	X	X	
21日	0	1	1	0	2	0	X	X	X	X	
22日	0	1	0	0	1	0	X	X	X	X	
23日	0	2	0	0	2	0	X	X	X	X	
24日	0	3	0	0	3	0	X	X	50	1	白色噴煙
25日	0	2	0	0	2	0	X	X	X	X	
26日	0	5	1	0	6	0	200	1	30	1	白色噴煙
27日	0	4	0	1	5	0	X	X	X	X	
28日	0	3	0	0	3	0	300	2	30	1	白色噴煙
29日	0	2	0	0	2	0	X	X	X	X	
30日	0	4	0	0	4	0	X	X	X	X	
合計	0	95	5	5	105	0					

6) 火山性地震の計数基準は田の原上観測点で最大振幅 1.5 μm/s 以上、S-P 時間 1 秒以内です。
火山性地震の種類は図 8 のとおりです。

7) 噴煙の高さ及び噴煙量は日最大値（噴火時以外は定時観測(09 時・15 時)の値)です。
噴煙量は以下の 7 階級で観測しています。

- 1 : 極めて少量 2 : 少量 3 : 中量 4 : やや多量 5 : 多量 6 : 極めて多量
7 : 噴煙量 6 以上の大噴火で、噴煙が山体を覆う位に多く噴煙の高さは成層圏まで達したと思われるもの
- : 噴煙なし x : 不明





図 8 御嶽山 主に発生している火山性地震の特徴と波形例



小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 （国）：国土地理院、（中地）：中部地方整備局、（防）：防災科学技術研究所、（名）：名古屋大学、
 （長）：長野県、（岐）：岐阜県

図9 御嶽山 観測点配置図

図中のGNSS基線 ~ は図4の ~、図5の ~ に対応しています。
 なお、御嶽山頂観測点からのデータは現在入っていません。