










3 成分歪観測データ

掛川 (時間値)

Exp.
↑ 1.0e-06 strain
30 hPa
20 mm/h



掛川歪 1 (N177E)

掛川歪 2 (N087E)

掛川歪 3 (N042E)

掛川歪 4 (N132E)



掛川気圧

掛川歪雨

() 内は歪拡大機構
の取付方位

春野 (時間値)

Exp.
↑ 5.0e-06 strain
30 hPa
20 mm/h



春野歪 1 (N002E)

春野歪 2 (N092E)



春野歪 3 (N047E)


春野歪 4 (N137E)

春野気圧

春野歪雨




() 内は歪拡大機構
の取付方位










平均的な地殻変動からのずれ（最終解）

- 平均的な変動として、1998年1月～2000年1月までのデータから平均速度及び年周変化を推定し、時系列データから除去している。
- 2003年以降の上下成分は年周補正を行っていない。
- 2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震および同年10月23日に発生した新潟県中越地震による地殻変動の影響を暫定的に取り除いている。



1年間で見た東海非定常地殻変動（水平変動）大潟固定



(5)は、2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震および同年10月23日に発生した新潟県中越地震による地殻変動の影響を暫定的に取り除いている。