

第307回
地震防災対策強化地域判定会

記者レクチャー資料



平成23年11月21日

気象庁

この資料は、独立行政法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、気象庁、独立行政法人産業技術総合研究所、国土地理院、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所、横浜市及び独立行政法人海洋研究開発機構のデータを基に作成しています。

以下の資料は暫定であり、後日の調査で変更されることがあります。

目次

定例資料

1. 地震活動概況 P. 1-6
2. 注目すべき地震活動 P. 7
3. 活動指数 P. 8-12
4. 静穏化・活発化領域の抽出 P. 13-14
5. 領域別地震活動 P. 15-26
6. ひずみ計による地殻変動観測 P. 27-52
7. GPS による面的地殻変動監視 P. 53-59

平成 23 年 10 月～11 月 16 日の主な地震活動

(平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震の余震域で発生した地震については $M \geq 5.0$ のみ記述)

○ 想定震源域およびその周辺； $M \geq 3.0$ または震度 1 以上を観測した地震

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	最大 震度	発震機構
11/11	4:19	駿河湾	20	3.0	1	—
11/16	8:31	静岡県東部	13	2.0	1	—

※ 深部低周波地震活動

長野県で深部低周波地震が観測された。

○ 南関東； $M \geq 4.0$

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	参考		最大 震度	発震機構
					Mj	Mw		
10/9	1:08	茨城県南部	60	4.3	4.3	—	2	東西に圧力軸を持つ逆断層型
11/3	19:34	茨城県南部	62	4.9	4.9	5.0	4	東西に圧力軸を持つ逆断層型
11/14	4:40	千葉県南部	71	4.1	4.1	—	2	北北東—南南西に張力軸をもつ正断層型


発震機構は初動発震機構解による。

○ その他の地域； $M \geq 6.0$

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	参考		最大 震度	発震機構
					Mj	Mw		
10/21	17:02	上川地方中部	196	6.3	6.3	6.1	3	北北西—南南東に張力軸を持つ型(初動発震機構解)
11/8	11:59	沖縄本島北西沖	217	7.0	7.0	6.9	4	東西に張力軸を持つ正断層型(CMT解)

Mj は従来から用いられている気象庁マグニチュード。Mw はモーメントマグニチュード。


東海地方とその周辺の広域地震活動 2011年10月1日～11月16日



図中の吹き出しは、陸域M4.5以上・海域M5.0以上とその他の主な地震

気象庁作成


東海・南関東地域の地震活動 2011年10月 (1日~31日)



気象庁作成

精度良く震源決定された地震のみを表示している。
上野原南部(破線の領域a)で10月11日に深部低周波地震が観測された。
奈良原(破線の領域b)で10月28日から31日まで深部低周波地震が観測された。

東海・南関東地域の地震活動 2011年11月 (1日～16日)




精度良く震源が定された地震のみを表示している。

気象庁作成

東海・南関東地域の発震機構解 (1)

Period: 2011/10/01 00:00 -- 2011/11/16 24:00


M



Depth(km)

(下半球投影)
[気象庁作成]

東海・南関東地域の発電機構造解(2)




(下半球投影)
[氣象庁作成]

※東海地域のM2.4以上の地震及び南関東地域のM3.5以上の地震の発震機構を表示している。
各震源球の上部には震源要素、下部には発震機構の断層パラメータが併記されている。
断層パラメータが併記されていないものは、発震機構解の精度がやや劣るものである。

深部低周波地震活動 (2000 年 1 月 1 日 ~ 2011 年 11 月 16 日)


(2011 年 10 月 1 日以降の震源を○で表示)

N=17204



上図矩形内の時空間分布図 (A-H 投影)

(2011 年 10 月 1 日 ~ 11 月 16 日)



※時空間分布図中、網掛けした期間は現在と比較して十分な検知能力がなかったことを示す。


Oct

気象庁作成

11月11日 駿河湾の地震

震央分布図 (1997年10月1日～2011年11月16日、
M $\geq$ 1.0、深さ0～50km)


深さ25km以浅の地震を濃く、それより深い地震を薄く表示。
震源球右下にSの表示があるものは、発震機構解に十分な精度がない。




2011年11月11日04時19分に駿河湾の深さ20kmでM3.0の地震 (最大震度1) が発生した。この地震の発震機構は、東西方向に張力軸を持つ横ずれ断層型 (参考解) で、フィリピン海プレート内で発生した地震である。

1997年10月以降の活動を見ると、今回の地震の震源付近 (領域b) では、2009年8月11日にはM6.5の地震 (最大震度6弱)、2011年8月1日にはM6.2の地震 (最大震度5弱) が発生していた。

領域b内の地震活動経過図、回数積算図



領域a内の断面図 (A-B投影)



東海地域の地震活動指数 (クラスタを除いた地震回数による)

2011年11月16日 現在

	① 静岡県中西部		② 愛知県		③ 浜名湖周辺			④ 駿河湾
	地殻内	フィリ ピン海 プレート	地殻内	フィリ ピン海 プレート	フィリピン海プレート内 全域	西側	東側	全域
短期活動指数	8	4	4	3	1	3	1	5
短期地震回数 (平均)	12 (5.29)	7 (7.00)	12 (13.16)	11 (14.15)	1 (6.16)	1 (2.46)	0 (3.70)	8 (6.06)
中期活動指数	8	4	6	4	0	3	0	6
中期地震回数 (平均)	27 (15.87)	19 (21.00)	48 (39.48)	39 (42.44)	4 (12.32)	3 (4.93)	1 (7.39)	17 (12.12)

* Mしきい値： 静岡県中西部、愛知県、浜名湖周辺：M $\geq$ 1.1、駿河湾：M $\geq$ 1.4

* クラスタ除去：震央距離が Δr 以内、発生時間差が Δt 以内の地震をグループ化し、最大地震で代表させる。

静岡県中西部、愛知県、浜名湖周辺： $\Delta r=3\text{km}$ 、 $\Delta t=7\text{日}$

駿河湾： $\Delta r=10\text{km}$ 、 $\Delta t=10\text{日}$

* 対象期間： 静岡県中西部、愛知県：短期30日間、中期90日間

浜名湖周辺、駿河湾：短期90日間、中期180日間

* 基準期間： おおむね長期的スロースリップ（ゆっくり滑り）発生前の地震活動を基準とする。

静岡県中西部、愛知県：1997年－2001年（5年間）、


浜名湖周辺：1998年－2000年（3年間）、駿河湾：1991年－2000年（10年間）

[各領域の説明] ① 静岡県中西部：プレート間が強く「くっついている」と考えられている領域（固着域）。

② 愛知県：フィリピン海プレートが沈み込んでいく先の領域。

③ 浜名湖周辺：固着域の縁。長期的スロースリップ（ゆっくり滑り）が発生する場所であり、同期して地震活動が変化すると考えられている領域。

④ 駿河湾：フィリピン海プレートが沈み込み始める領域。



* プレート境界の等深線を破線で示す。


地震回数の指数化		
指数	確率 (%)	地震数
8	1	多い
7	4	やや多い
6	10	
5	15	
4	40	ほぼ平常
3	15	
2	10	
1	4	やや少ない
0	1	
		少ない

気象庁作成

地震活動指数の推移（中期活動指数）


① 静岡県中西部（対象期間：90日）

1997/1/1~2011/11/16 M ≥ 1.1




② 愛知県（対象期間：90日）

1997/1/1~2011/11/16 M ≥ 1.1




③ 浜名湖周辺（対象期間：180日）

1995/1/1~2011/11/16 M ≥ 1.1



④ 駿河湾（対象期間：180日）

1990/1/1~2011/11/16 M ≥ 1.4





■：基準期間

／：地震活動指数（0－8）


地震活動指数の推移

① 静岡県中西部




地震活動指数の推移

② 愛知県



地殻内はやや高い(4から6)。フィリピン海プレート内はほぼ平常(4から3)。




地殻内はやや低い(4から2)。
フィリピン海プレート内もやや低い(3から2)。

／ : 地震活動指数 (0-8)
■ : 地震回数 (クラスタを除く)

地震活動指数の推移

③ 浜名湖周辺（フィリピン海プレート内）


(90日) 1995/1/1~2011/11/16 M $\geq$ 1.1 (180日)



フィリピン海プレート内の地震活動は低い(3から0)。

④ 駿河湾


(90日) 1990/1/1~2011/11/16 M $\geq$ 1.4 (180日)




地震活動はやや高い(5から6)。

／：地震活動指数（0－8）
■：地震回数（クラスタを除く）


静穏化・活発化領域の検出（東海地方、地殻内）




[1] 2011/02/20–2011/05/20



[2] 2011/05/21–2011/08/18




[3] 2011/08/19–2011/11/16




想定震源域周辺では、今期(最新の[3])は静岡県中西部で活発化領域が検出さ 気象庁作成
れている。静穏化領域は検出されていない。


静穏化・活発化領域の検出（東海地方、プレート内）




[1] 2011/02/20--2011/05/20



[2] 2011/05/21--2011/08/18



[3] 2011/08/19--2011/11/16




想定震源域周辺では、今期（最新の[3]）は駿河湾、遠州灘で活発化領域が検出されている。静岡県中西部、愛知県東部で静穏化領域が検出されている。

気象庁作成


静岡県中西部（最近90日）

2011/8/19~2011/11/16 M $\geq$ 0.0 0 $\leq$ 深さ(km) $\leq$ 60



*吹き出しはM $\geq$ 3.0

静岡県中西部（地殻内） 1997/1/1~2011/11/16 M $\geq$ 1.1




クラスタ除去後の地震回数積算図（右下図）を見ると、2000年半ばまでは傾きが急でやや活発、その後2005年半ばまでは傾きが緩やかでやや低調、2005年半ば以降はやや活発、という傾向が見られる。この地震活動変化は、概ね長期的スロースリップの進行（右下図網掛け領域）・停滞の時期に対応している。2007年後半以降はさらに活発な傾向が見られていた。2010年の春頃からは一時的にほぼ平常な状態に推移していたが、現在の地震活動指数は再び高い状態である。

気象庁作成

1997/1/1~2011/11/16 $M \geq 2.0$


1997/1/1~2011/11/16 $M \geq 2.0$



静岡県中西部（フィリピン海プレート内）

1997/1/1~2011/11/16 M $\geq$ 1.1

クラスター除去




* 吹き出しは最近60日以内、M $\geq$ 3.0
最近60日以内の地震を濃く表示

地震活動指数はやや高い状態を示していたが、クラスター除去後の地震回数積算図(右下図)からも2009年後半からやや活発になっている様子が見られていた。これは、2009年8月11日に発生した駿河湾の地震(M6.5)の余震活動が適切にデクラス気象庁作成タされていないためである。現在の地震活動指数はほぼ平常となっている。

愛知県（地殻内）

1997/1/1~2011/11/16 M $\geq$ 1.1

クラスタ除去











地震活動指数はやや高い状態を示しているが、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からは顕著な変化は見られない。

愛知県（地殻内）

1997/1/1~2011/11/16 M $\geq$ 2.0

クラスタ除去




*吹き出しは最近60日以内、M $\geq$ 3.0

地震活動指数はやや低い状態を示しているが、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からは2009年終わり頃から地震活動がやや静穏な状態になっているように見える。

愛知県（フィリピン海プレート内）

1997/1/1~2011/11/16 M $\geq$ 2.0

クラスタ除去



*吹き出しは最近60日以内、M $\geq$ 3.0


地震活動指数はやや低い状態を示しているが、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からも2011年中頃からやや静穏になっている様子が見られる。このような状態は、2004年から2005年にかけてなど、度々見られる。

浜名湖周辺（フィリピン海プレート内）

1995/1/1~2011/11/16 M $\geq$ 1.1 *クラスタ除去したデータ



震央分布図

N=281





地震活動経過図（規模別）

n=281





時空間分布図（東西方向）


地震回数積算図



地震活動経過図（規模別）



地震回数積算図



[東側] 地震回数積算図（右下図）を見ると、地震活動は2000年以降やや低調。


[西側] 地震回数積算図（左下図）を見ると、2006年以降やや低調。

駿河湾

1990/1/1~2011/11/16 M ≥ 1.4

震央分布図

N=3865





震央分布図

N=1881


クラスタ
除去

depth
(km)



M
0
7.0 10
6.0 20
5.0 30
4.0 40
3.0 50
1.4 60





時空間分布図(南北方向)



地震活動経過図(規模別)



地震回数積算図



地震活動指数はやや高い状態を示していたが、クラスタ除去後の地震回数積算図(右下図)からも2010年頃からやや活発になっていた様子が見られる。これは、2009年8月11日に発生した駿河湾の地震(M6.5)の余震活動が適切にデクラスタされていないためである。現在、地震活動指数は再びやや高い状態を示しているが、デクラスタ後の地震回数積算図(右下図)からは顕著な変化は見られない。

10月～11月 伊豆東部※の活動


※ 「伊豆東部の地震活動に関する情報」で対象としている領域

11月2日16時37分にM3.4の地震（最大震度2）が発生した。その後2日～3日にかけて、一時的に地震活動が活発となったが、10日以降は収まっている。


10月下旬～11月中旬にかけて、伊豆東部の体積ひずみ計（東伊豆奈良本）及び傾斜計（伊東猪山、岡、徳永、吉田）では、目立った変化は観測されていない。なお、伊東猪山傾斜計で11月2日の地震（M3.4）によるステップ状の変化が見られた。

震央分布図（1997年10月1日～2011年11月16日、 $M \geq 0.5$ 、深さ0～20km）


2011年9月までの地震を薄く、2011年10月以降の地震を濃く表示。



領域a内の時空間分布図（南北投影）
（2011年1月1日～2011年11月16日）



領域a内の地震活動経過図、回数積算図



東伊豆地域の体積ひずみ計・傾斜計の記録
（2011年10月17日～11月16日）

体積ひずみ・傾斜（気圧・潮汐補正;時間値）伊豆東部

2011/10/17 00:00 - 2011/11/17 00:00

東伊豆奈良本
-1.563500E-08/DAY
伊東猪山傾NS

伊東猪山傾EV

防)岡傾NS

防)岡傾EV

防)徳永傾NS


防)徳永傾EV

防)吉田傾NS

防)吉田傾EV


鎌田地震回数

網代雨



EXP, NEUP 2.0E-07 strain 30 hPa
1.0E-06 radian 30 mm/hour
0.5 degree
100 count/hour

11月2日の地震（M3.4）による変化




防)は独立行政法人防災科学技術研究所の観測点である。

プレート境界とその周辺の地震活動(最近の活動状況)


(Hirose et al. (2008)によるフィリピン海スラブ上面深さの±3kmの地震を抽出)

プレート境界とその周辺の地震の震央分布(最近約1ヶ月半、Mすべて)



プレート境界とその周辺の地震の震央分布(2002年10月以降、Mすべて)

2002年10月1日~2011年11月16日




2002年10月以降(Mすべて)で見ると、東海地域のプレート境界とその周辺の地震活動は、2007年中頃あたりからやや活発に見える。なお、2009年8月11日以降は、駿河湾の地震(M6.5)の余震活動の一部を抽出している。M3を超える地震については、その震央を矢印で示しているが、これらの地震の発震機構解は想定東海地震のものとは類似の型ではない。

気象庁作成

想定東海地震の発震機構解と類似の型の地震


1987年9月1日～2011年11月16日



想定東海地震の発震機構解と類似の型の地震を抽出した。抽出条件は、P軸の傾斜角が45度以下、かつP軸の方位角が65度以上145度以下、かつT軸の傾斜角が45度以上、かつN軸の傾斜角が30度以下とした。

プレート境界で発生したと疑われる地震の他、明らかに地殻内またはスラブ内で発生したと推定される地震も含まれている。また、2009年までに発生した地震については、Nakamura et al. (2008)の3次元速度構造で震源とメカニズム解を再精査し、いくつかの地震は候補から削除されている。

なお、吹き出し図中、震源球右下隣りにSの表示があるものは、発震機構解に十分な精度がない。




ひずみ計による観測結果 (2011年5月1日～2011年11月17日)

短期的ゆっくり滑りに起因すると見られる次の地殻変動がひずみ計観測網で観測された。

SSE1 : 2011年7月26日頃から8月1日頃にかけて観測された。(第304回地震防災対策強化地域判定会資料参照)

SSE2 : 2011年8月20日頃から22日頃にかけて観測された。(第304回地震防災対策強化地域判定会資料参照)


ひずみ計の配置図




- : 体積ひずみ計
- ▲ : 多成分ひずみ計
- △ : 多成分ひずみ計(静岡県整備)
- : レーザー式変位計(気象研整備)

気象庁作成

ひずみ変化 時間値 (東海地域)



ひずみ変化 時間値（東海地域（西部））



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の变化の幅（ノイズレベル）を示す。

※記号Vは体積ひずみを、Sは多成分ひずみ計で観測した線ひずみより計算した面積ひずみを示す。

※天竜船明（気象研究所整備）は、レーザー式変位計におけるひずみ変化を示す。

SSE1 : 短期的ゆっくり滑り 2011.07.26-08.01


表示観測点の名称

C : 地震に伴うコサイスマックなステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整

田原福江	たはらふくえ
田原高松	たはらたかまつ
蒲郡清田	がまごおりせいだ
新城浅谷	しんしろあさや
浜松三ヶ日	はまつみっかび
売木岩倉	うるぎいわくら
浜松佐久間	はまつさくま
浜松宮口	はまつみやぐち
浜松横川	はまつよこかわ
浜松春野	はまつはるの
掛川富部	かけがわとんべ
天竜船明	てんりゅうふなぎら

気象庁作成

ひずみ変化 時間値 (東海地域 (東部))



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。

※記号Vは体積ひずみを、Sは多成分ひずみ計で観測した線ひずみより計算した面積ひずみを示す。

・特記事項なし。


C : 地震に伴うコサイスミックなステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整

表示観測点の名称

掛川高天神	かけがわとかてんじん
島田川根	しまだかわね
川根本町東藤川	かわねほんちょう
	ひがしふじかわ
御前崎大山	おまえざきおおやま
御前崎佐倉	おまえざきさくら
牧之原坂部	まきのはらさかべ
藤枝花倉	ふじえだはなくら
静岡落合	しずおかおちあい
静岡漆山	しずおかうるしやま
静岡但沼	しずおかただぬま

気象庁作成

ひずみ変化 時間値 (伊豆地域)



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。


- ・7月中旬に伊豆東部の地震活動に伴う変化が見られた(図中*1)。
- ・9月中旬に伊豆東部の地震活動に伴う変化が見られた(図中*2)。

C : 地震に伴うコサイスマミックなステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整

表示観測点の名称

富士鶴無ヶ淵	ふじうないがふち
湯河原鍛冶屋	ゆがわらかじや
熱海下多賀	あたみしもたが
東伊豆奈良本	ひがしいずならもと
伊豆小下田	いずこしもだ
南伊豆入間	みなみいずいるま
大島津倍付	おおしまつばいつき

ひずみ変化 時間値 (南関東地域)



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。


・特記事項なし。

C : 地震に伴うコサイスマックなステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整

表示観測点の名称

秦野菩提	はだのぼだい
日野程久保	ひのほどくぼ
横浜川和	よこはまかわわ
三浦三崎	みうらみさき
横須賀馬堀	よこすかまぼり
館山中里	たてやまなかざと
富津望井	ふつつもちい
鴨川八色	かもがわやいろ
長柄刑部	ながらおさかべ
大多喜宇筒原	おおたきうとうぼら
勝浦壘名	かつうらとな
匝瑳飯高	そうさいいだが
銚子明神	ちようしみようじん


気象庁作成




※面積ひずみは、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うコサイスマミックなステップを除外して計算している。

ひずみ変化 日平均値 (伊豆・南関東)

↑ 30000 nstrain
100 hPa
100 mm




掛川富部（かけがわとんべ） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に 1 日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。

・特記事項なし。




- C : 地震に伴うコサイスミックなステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整

掛川富部ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ 1、2、3 の
各方向成分から1999年7月1日を基点として算出

Exp.
↑ 5000 nstrain (1)
20000 nstrain (2)




*各成分の括弧付き数字はスケールの番号に対応

※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うコサイミックなステップを除去して計算している。


← 伸び
→ 縮み
1.0e-06 strain

浜松春野（はままつはるの） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に 1 日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。

・特記事項なし。




- C : 地震に伴うコサイスマミックなステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整

浜松春野ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ2、3、4の
各方向成分から2003年1月1日を基点として算出


Exp.
↑ 20000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うマイクロサイスミックなステップを除去して計算している。

気象庁作成

浜松佐久間（はまつさくま） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくり滑り 2011.07.26-08.01

- C : 地震に伴うコサイスマックなステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整

浜松佐久間ひずみ変化（日値）

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ 1、2、3 の各方向成分から2000年1月1日を基点として算出


Exp.
↑ 5000 nstrain




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うコサイスマミックなステップを除去して計算している。

気象庁作成

川根本町東藤川（かわねほんちょうひがしふじかわ） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に 1 日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくり滑り 2011.07.26-08.01

C : 地震に伴うコサイスミックなステップ状の変化
I : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整

川根本町東藤川ひずみ変化 日値


・最大剪断ひずみおよび面積ひずみはひずみ1、2、3の
各方向成分から2000年1月1日を基点として算出

Exp.
↑ 2000 nstrain




*最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うコサイスミックなステップを除去して計算している。

浜松宮口（はまつみやぐち） ひずみ変化 時間値



浜松宮口
(埋設深度: 765m)



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。


・特記事項なし。

- C : 地震に伴うコサイスミックなステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整

浜松宮口ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ 1、2、3 の各方向成分から2002年7月1日を基点として算出

Exp.
↑ 5000 nstrain (1)
20000 nstrain (2)




*各成分の括弧付き数字はスケールの番号に対応

※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、東海道沖（紀伊半島南東沖）の地震、駿河湾の地震および東北地方太平洋沖地震に伴うコサイスミックなステップを除去して計算している。


気象庁作成

静岡落合（しずおかおちあい）ひずみ変化 時間値




※観測点名の右側のスケールは、平常時に 1 日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。

・特記事項なし。




- C : 地震に伴うコサイスミックなステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整

掛川高天神（かけがわたかてんじん） ひずみ変化 時間値




※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。

・特記事項なし。




C : 地震に伴うコサイスミックなステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整

売木岩倉（うるぎいわくら）ひずみ変化 時間値




※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。

・特記事項なし。




- C : 地震に伴うコサイスミックなステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整

新城浅谷（しんしろあさや） ひずみ変化 時間値




※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。




SSE1 : 短期的ゆっくり滑り 2011.07.26-08.01
SSE2 : 短期的ゆっくり滑り 2011.08.20-08.22

C : 地震に伴うコサイスマックなステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整

田原高松（たはらたかまつ） ひずみ変化 時間値



※観測点名の右側のスケールは、平常時に1日間で変動し得る最大の変化の幅(ノイズレベル)を示す。



SSE2 : 短期的ゆっくり滑り 2011.08.20-08.22


C : 地震に伴うコサイスミックなステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整

多成分ひずみ計データ


ひずみ1・2・3成分(浜松春野は、2・3・4成分)から90日前を基準として算出

2010.05.01~2011.11.17

2010/05/01




2010/08/01




2010/11/01




2011/02/01



2011/05/01




2011/08/01



2011/11/01




2011/11/17



多成分ひずみ計データ 新設点

ひずみ1・2・3成分から90日前を基準として算出

2011.05.01～2011.11.17



東海地域の短期的ゆっくりすべりの監視


2011. 10. 14 ~ 2011. 11. 17

今期間、気象庁が監視している東海地方の各体積ひずみ計、多成分ひずみ計で短期的ゆっくりすべりが原因とみられる明瞭な変化は観測されていない。
東海周辺ひずみ変化 1

東海周辺ひずみ変化 1

< 2011/10/17 0:00 -- 2011/11/17 0:00 >
気圧、潮汐、降水 (体積ひずみ), 磁気 (多成分ひずみ) 補正データ



1.0E-07 strain
60 mm/Hour
10 counts/Hour



東海周辺ひずみ変化 2

< 2011/10/17 0:00 -- 2011/11/17 0:00 >
気圧、潮汐補正データ

2.0E-07 strain
30 mm/Hour




□ 体積ひずみ観測点
◇ 多成分ひずみ観測点

※浜松春野・川根本町東藤川は静岡県整備

気象庁作成


GPS6時間値による面的監視

2011年11月17日現在
気象研究所・気象庁資料



対象範囲(内側の矩形内)と使用観測点(●印)。+印の観測点はデータ不安定などにより今回の解析に使用していない。
東海地域におけるGPS6時間値(国土地理院)を用いて、最近1日間、1週間、1ヶ月間と過去とを比較した。夏季に解析値のばらつきが見られるほかは特に目立った変位は見られない。


最近1日間とその前1週間との比較



対象期間：2011/11/16 00:00 - 2011/11/17 00:00(1day)

基準期間：2011/11/09 00:00 - 2011/11/16 00:00(1week)

最近1週間とその前1ヶ月間との比較




対象期間：2011/11/10 00:00 - 2011/11/17 00:00(1week)
基準期間：2011/10/11 00:00 - 2011/11/10 00:00(1month)

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の影響が見られる。

氣象庁・氣象研究所作成

最近1年間(2010年10月1日00:00～2011年10月20日00:00)の 面的監視による対象範囲内の最大値の経過

(前ページまでのカラーマッピングはこれらのグラフの右端の状況。)



夏季に解析値のばらつきが見られる他、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の影響が見られる。
点線はノイズレベルであり、異常検知のしきい値。しきい値は、2006年1月～2007年12月の2年間分のデータに、1年に1回出現する最大値・最小値を把握できる値を求め設定。
* 1)の上下成分の1日-1週間は振幅を1/3倍、* 2)の発散ひずみ成分の1日-1週間は振幅を1/2倍にしてある。



GPS 日値による面的監視（南海トラフ沿い；余効変動除去）

南海トラフ沿いの地域について紀伊水道を境に東西二つに分け、GPS1 日値 F3 解（国土地理院）を用いて、①最近 1 ヶ月間とその前の 3 ヶ月間の座標変化（各期間の中央値の差から 2 ヶ月間の変位）、②最近 1 ヶ月間と 1 年前の 1 ヶ月間との座標変化（1 年間の変位）、およびそれぞれ水平成分から計算したひずみを面的監視手法で見た。GPS 座標値は観測点ごとに定常変位と見なされる期間の直線トレンドを除去しており、年周変化は補正していない。また、主な地震に伴うオフセットと、2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震に伴う余効変動を差し引いている。



四国南西部から九州東部に、2009 年末から 2010 年秋まで継続した豊後水道長期的スロースリップに伴う変位がわずかに見られる。

①最近 2 ヶ月間の変位とひずみ



南北





東西





上下





面積ひずみ



回転



最大せん断




対象期間：2011/9/29-2011/10/29(1month)

基準期間：2011/7/1-2011/9/29(3month)

特に目立った変化は見られない。

②最近 1 年間の変位とひずみ



対象期間：2011/9/29-2011/10/29 (1month)

基準期間：2010/9/28-2010/10/29 (1month)

四国南西部から九州東部に、2009 年末から 2010 年秋までの豊後水道長期的スロースリップに伴う変位がわずかに見られる。

気象庁・気象研究所作成