

災害時気象資料

令和5年台風第6号による7月30日から8月10日にかけての
九州・山口県の気象状況について

概要	1～ 3
天気図及び気象衛星画像	4～ 9
気象レーダー画像	10～21
アメダス総降水量の分布図	22
アメダス最大風速の分布図	23
アメダス最大瞬間風速の分布図	24
観測史上1位及び8月の1位を更新した観測値	25～33
波浪実況分布図	34～45
顕著な大雨に関する気象情報の発表状況	46
キキクルの最大危険度	47～49
参考資料（雨の強さと降り方）	50～51

注)この資料に使用した値はすべて速報値であり、後日修正することがあります。

※令和5年8月23日更新内容

2p: 宮崎県の被害状況、22p: アメダス総降水量分布図

令和5年8月16日
福岡管区気象台

概要

【台風の状況】

7月28日にフィリピンの東で発生した台風第6号は発達しながら北西へ進み、31日15時には大型で非常に強い勢力となった。8月4日には宮古島の北北西約250キロ付近で進路を東に変え、さらに7日から8日にかけて奄美市の東南東約150キロ付近で進路を北北西に変えた。その後、ゆっくりした速さで九州の西の海上を北上し、11日には朝鮮半島付近で熱帯低気圧に変わった。

台風第6号は台風の眼が大きく、台風から少し離れた場所で雨域が明瞭であった。また、ゆっくりした速さで進んだため、九州では台風による風雨等の影響が1週間以上にわたり続いた。

【大雨の状況】

7月30日から8月10日にかけて、九州北部地方や九州南部・奄美地方の広い範囲で激しい雨や非常に激しい雨となった。8月9日から10日にかけては鹿児島県、宮崎県、熊本県、大分県で線状降水帯が発生し、猛烈な雨や非常に激しい雨が降った。九州の太平洋側では、台風第6号が接近する前から東よりの暖かく湿った空気の流れ込みで雨が続き、さらに台風本体の雨が加わり、期間内の総降水量は神門（宮崎県東臼杵郡美郷町）で1073.5ミリ、日之影（宮崎県西臼杵郡日之影町）で929.0ミリ、屋久島（鹿児島県熊毛郡屋久島町）で837.5ミリを観測し、多くの観測所で8月の月降水量平年値の2倍を超える大雨となった。また、8月9日の1時間降水量が小林（宮崎県小林市）で93.5ミリ、日之影で58.5ミリを観測するなど、観測史上1位の値を更新した。

【暴風の状況】

8月1日に鹿児島県与論島が風速25m/s以上の暴風域に入り、その後台風の北上に伴い、九州の東シナ海側を中心に、鹿児島県、熊本県、長崎県、佐賀県、福岡県が暴風域に入った。

最大風速は与論島（鹿児島県大島郡与論町）で27.4m/s、枕崎（鹿児島県枕崎市）で25.2m/sを観測した。

また、最大瞬間風速は枕崎（鹿児島県枕崎市）で41.8m/s、与論島（鹿児島県大島郡与論町）で38.1m/s、種子島（鹿児島県西之表市）で36.2m/s、美津島（長崎県対馬市）で35.0m/sを観測した。

【主な災害の状況】

＜佐賀県＞ 令和5年8月10日17時00分現在 佐賀県調べ

人的被害:軽傷者1名

住家被害:なし

＜長崎県＞ 令和5年8月10日13時30分現在 長崎県調べ

人的被害:重傷者1名、軽傷者2名

住家被害:なし

＜熊本県＞ 令和5年8月10日9時00分現在 熊本県調べ

人的被害:軽傷者1名

住家被害:なし

＜宮崎県＞ 令和5年8月21日16時00分現在 宮崎県調べ

人的被害:軽傷者1名

住家被害:全壊1棟、一部破損6棟、床上浸水4棟、床下浸水16棟

非住家被害:その他1棟

＜鹿児島県＞ 令和5年8月10日15時30分現在 鹿児島県調べ


人的被害:重傷者2名、軽傷者5名

住家被害:一部破損6件、床上浸水4件、床下浸水22件


非住家被害:全壊2件、半壊9件

※山口県、福岡県、大分県においては人的被害及び住家被害なし



【台風経路図】





経路上の○印は傍らに記した日の午前9時、●印は午後9時(いずれも日本標準時)の位置で、→は消滅を示します。





天気図及び気象衛星画像 7月30日～7月31日 6時間毎





天気図及び気象衛星画像 8月1日～8月2日 6時間毎





天気図及び気象衛星画像 8月3日～8月4日 6時間毎





天気図及び気象衛星画像 8月5日～8月6日 6時間毎




天気図及び気象衛星画像 8月7日～8月8日 6時間毎




天気図及び気象衛星画像 8月9日～8月10日 6時間毎




気象レーダー画像(7月30日 3時間毎)




気象レーダー画像(7月31日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月1日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月2日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月3日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月4日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月5日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月6日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月7日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月8日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月9日 3時間毎)




気象レーダー画像(8月10日 3時間毎)




アメダス総降水量の分布図(7月30日～8月10日)



アメダス最大風速の分布図(7月30日～8月10日)



アメダス最大瞬間風速の分布図(7月30日～8月10日)



観測史上1位を更新した観測値(1時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	更新した値		これまでの1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	58.5	2023/8/10 1:01	58.0	2017/9/17	2010年	
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	93.5	2023/8/9 21:01	80.5	2022/7/15	2000年	

8月の1位を更新した観測値(1時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	特定期間内における最大値		これまでの8月の1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	58.5	2023/8/10 1:01	50.5	2011/8/6	2010年	
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	93.5	2023/8/9 21:01	56	2006/8/13	2001年	
鹿児島県	曾於市	大隅(オオスミ)	61.0	2023/8/9 19:23	58.0	2017/8/27	1977年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	尾之間(オノアイダ)	54.0	2023/8/9 8:44	51.0	2019/8/30	1976年	

气象台、測候所、特別地域気象観測所は地点名に「*」を付加しています。

観測値に付加された記号の意味

”)”：準正常値 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

”]”：資料不足値 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

観測史上1位を更新した観測値(3時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	更新した値		これまでの1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	133.5	2023/8/10 2:30	131.0	2022/9/18	2010年	
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	177.5	2023/8/9 21:20	167.5	2022/7/15	2000年	

8月の1位を更新した観測値(3時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	特定期間内における最大値		これまでの8月の1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	133.5	2023/8/10 2:30	120.5	2011/8/6	2010年	
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	177.5	2023/8/9 21:20	88	2003/8/8	2001年	
鹿児島県	曾於市	大隅(オオスミ)	118.5	2023/8/9 20:50	89.5	2013/8/4	1977年	
鹿児島県	肝属郡錦江町	田代(タシロ)	150.0	2023/8/9 17:50	113.5	2015/8/25	1977年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	屋久島(ヤクシマ)*	135.5	2023/8/9 10:40	101	2003/8/13	1976年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	尾之間(オノアイダ)	95.5	2023/8/9 10:30	92	1987/8/10	1976年	

气象台、測候所、特別地域気象観測所は地点名に「*」を付加しています。

観測値に付加された記号の意味

”)”：準正常値 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

”]”：資料不足値 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

観測史上1位を更新した観測値(6時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	更新した値		これまでの1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	222.0	2023/8/9 21:30	214.5	2022/7/15	2000年	
鹿児島県	肝属郡錦江町	田代(タシロ)	247.5	2023/8/9 18:00	242.5	2018/9/30	1977年	

8月の1位を更新した観測値(6時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	特定期間内における最大値		これまでの8月の1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	213.5	2023/8/10 4:20	141.0	2015/8/25	2010年	
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	222.0	2023/8/9 21:30	139.5	2015/8/25	2001年	
鹿児島県	曾於市	大隅(オオスミ)	155.5	2023/8/9 21:10	136.5	2013/8/4	1977年	
鹿児島県	肝属郡錦江町	田代(タシロ)	247.5	2023/8/9 18:00	206.5	2015/8/25	1977年	
鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	197.5)	2023/8/9 17:30	148	1982/8/2	1977年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	屋久島(ヤクシマ)*	238.0	2023/8/9 14:00	141	2004/8/30	1976年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	尾之間(オノアイダ)	156.0	2023/8/9 9:50	97.0	2019/8/30	1976年	

气象台、測候所、特別地域気象観測所は地点名に「*」を付加しています。

観測値に付加された記号の意味

”)”：準正常値 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

”]”：資料不足値 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

観測史上1位を更新した観測値(12時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	更新した値		これまでの1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	282.5	2023/8/9 21:20	270.5	2011/9/20	2000年	
鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	281.5)	2023/8/9 17:30	265	2007/7/11	1977年	

8月の1位を更新した観測値(12時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	特定期間内における最大値		これまでの8月の1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	262.5	2023/8/10 6:20	210.5	2015/8/25	2010年	
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	282.5	2023/8/9 21:20	210	2004/8/30	2001年	
鹿児島県	肝属郡錦江町	田代(タシロ)	323.5	2023/8/9 18:00	267	2004/8/30	1977年	
鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	281.5)	2023/8/9 17:30	211	2004/8/30	1977年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	屋久島(ヤクシマ)*	391.0	2023/8/9 17:10	198	2004/8/30	1976年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	尾之間(オノアイダ)	271.5	2023/8/9 15:40	151	1985/8/8	1976年	
鹿児島県	鹿児島郡十島村	宝島(タカラジマ)	176.0	2023/8/9 10:00	168.5	2017/8/6	2014年	

气象台、測候所、特別地域気象観測所は地点名に「*」を付加しています。

観測値に付加された記号の意味

”)”：準正常値 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

”]”：資料不足値 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

観測史上1位を更新した観測値(24時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	更新した値		これまでの1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	455.5)	2023/8/9 17:40	389	1997/9/16	1977年	

8月の1位を更新した観測値(24時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	特定期間内における最大値		これまでの8月の1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	387.5	2023/8/10 4:10	235.0	2011/8/6	2010年	
宮崎県	東臼杵郡椎葉村	椎葉(シイバ)	375.0	2023/8/9 22:00	261.5	2015/8/25	2012年	
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	352.0	2023/8/10 1:30	240	2004/8/30	2001年	
鹿児島県	薩摩川内市	中甕(ナカコシキ)	233.5	2023/8/10 5:50	206.5	2015/8/25	1976年	
鹿児島県	曾於市	大隅(オオスミ)	293.0	2023/8/9 21:10	291	2004/8/30	1977年	
鹿児島県	肝属郡錦江町	田代(タシロ)	498.0	2023/8/9 18:00	355	2004/8/30	1977年	
鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	455.5)	2023/8/9 17:40	258	2004/8/30	1977年	
鹿児島県	熊毛郡中種子町	中種子(ナカタネ)	222.5	2023/8/9 6:40	201	2007/8/3	2006年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	屋久島(ヤクシマ)*	484.0	2023/8/9 19:20	431.5	1970/8/14	1938年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	尾之間(オノアイダ)	310.5	2023/8/10 3:30	223	1985/8/8	1976年	

气象台、測候所、特別地域気象観測所は地点名に「*」を付加しています。

観測値に付加された記号の意味

”)”：準正常値 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

”)”：資料不足値 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

観測史上1位を更新した観測値(48時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	更新した値		これまでの1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	622.5	2023/8/10 5:50	553.5	2022/9/19	2010年	
鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	528.0	2023/8/9 18:10	522	1997/9/16	1977年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	屋久島(ヤクシマ)*	589.0	2023/8/10 3:50	539	1997/9/16	1976年	

8月の1位を更新した観測値(48時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	特定期間内における最大値		これまでの8月の1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
熊本県	球磨郡湯前町	湯前横谷(ユノマエヨコタニ)	496.5	2023/8/10 2:10	443	1993/8/2	1976年	
宮崎県	西臼杵郡五ヶ瀬町	鞍岡(クラオカ)	530.5	2023/8/10 3:40	520	2004/8/30	1979年	
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	622.5	2023/8/10 5:50	286.0	2012/8/28	2010年	
宮崎県	東臼杵郡椎葉村	椎葉(シイバ)	513.5	2023/8/10 0:20	333.5	2021/8/13	2012年	
宮崎県	児湯郡西米良村	西米良(ニシメラ)	527.0	2023/8/9 23:20	433	1985/8/13	1979年	
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	462.0	2023/8/10 1:40	315.0	2014/8/1	2001年	
宮崎県	日南市	深瀬(フカセ)	432.5	2023/8/10 12:00	406	2004/8/30	1977年	
鹿児島県	鹿屋市	輝北(キホク)	379.0	2023/8/10 13:00	340	2004/8/30	1977年	
鹿児島県	曾於市	大隅(オオスミ)	398.5	2023/8/9 21:20	332	1993/8/2	1977年	
鹿児島県	肝属郡肝付町	肝付前田(キモツキマエダ)	495.5	2023/8/9 20:00	463	2004/8/31	1977年	
鹿児島県	肝属郡肝付町	内之浦(ウチノウラ)	341.5	2023/8/10 8:40	294	1984/8/27	1976年	
鹿児島県	肝属郡錦江町	田代(タシロ)	633.5	2023/8/9 18:30	386	2004/8/30	1977年	
鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	528.0	2023/8/9 18:10	271	2004/8/30	1977年	
鹿児島県	熊毛郡中種子町	中種子(ナカタネ)	335.0	2023/8/10 4:00	213.0	2019/8/15	2006年	
鹿児島県	熊毛郡南種子町	上中(カミナカ)	309.5	2023/8/10 3:40	301	1985/8/9	1976年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	屋久島(ヤクシマ)*	589.0	2023/8/10 3:50	411	2004/8/30	1976年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	尾之間(オノアイダ)	386.5	2023/8/10 3:40	301	1985/8/10	1976年	

気象台、測候所、特別地域気象観測所は地点名に「*」を付加しています。

観測値に付加された記号の意味

”)”：準正常値 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

”)”：資料不足値 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

観測史上1位を更新した観測値(72時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	更新した値		これまでの1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	709.5	2023/8/10 11:20	563.5	2022/9/20	2010年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	屋久島(ヤクシマ)*	641.0	2023/8/10 2:10	553	1997/9/16	1976年	

8月の1位を更新した観測値(72時間降水量)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	特定期間内における最大値		これまでの8月の1位の値		統計開始年	備考
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日		
熊本県	球磨郡湯前町	湯前横谷(ユノマエヨコタニ)	531.0	2023/8/10 14:30	508	1993/8/3	1976年	
宮崎県	西臼杵郡高千穂町	高千穂(タカチホ)	434.5	2023/8/10 12:30	425	1993/8/11	1976年	
宮崎県	西臼杵郡五ヶ瀬町	鞍岡(クラオカ)	600.0	2023/8/10 15:10	528	2004/8/31	1979年	
宮崎県	西臼杵郡日之影町	日之影(ヒノカゲ)	709.5	2023/8/10 11:20	318.5	2012/8/29	2010年	
宮崎県	東臼杵郡椎葉村	椎葉(シイバ)	549.0	2023/8/10 14:50	425.0	2021/8/14	2012年	
宮崎県	児湯郡西米良村	西米良(ニシメラ)	572.5	2023/8/10 11:10	479	1985/8/14	1979年	
宮崎県	小林市	小林(コバヤシ)	484.5	2023/8/10 10:40	382.5	2014/8/2	2001年	
宮崎県	串間市	串間(クシマ)	422.0	2023/8/10 7:30	374	1993/8/2	1976年	
鹿児島県	鹿屋市	輝北(キホク)	406.5	2023/8/10 13:20	346	1993/8/1	1977年	
鹿児島県	曾於市	大隅(オオスミ)	412.5	2023/8/10 9:20	407	1993/8/1	1977年	
鹿児島県	肝属郡肝付町	肝付前田(キモツキマエダ)	506.5	2023/8/9 22:40	463.0]	2004/8/31	1977年	
鹿児島県	肝属郡肝付町	内之浦(ウチノウラ)	364.5	2023/8/10 7:20	311.5	2021/8/20	1976年	
鹿児島県	肝属郡錦江町	田代(タシロ)	653.5	2023/8/10 18:00	403	1978/8/2	1977年	
鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	531.5]	2023/8/10 16:10	277	1978/8/2	1977年	
鹿児島県	熊毛郡中種子町	中種子(ナカタネ)	369.0	2023/8/10 7:50	217.0	2019/8/16	2006年	
鹿児島県	熊毛郡南種子町	上中(カミナカ)	353.5	2023/8/10 6:50	310	1985/8/9	1976年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	屋久島(ヤクシマ)*	641.0	2023/8/10 2:10	412	2004/8/31	1976年	
鹿児島県	熊毛郡屋久島町	尾之間(オノアイダ)	532.5	2023/8/10 6:30	322	1985/8/10	1976年	

気象台、測候所、特別地域気象観測所は地点名に「*」を付加しています。

観測値に付加された記号の意味

”)”：準正常値 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

”)”：資料不足値 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

観測史上1位を更新した観測値(最大風速)(7月30日～8月10日)

1位の値を更新した地点はありません。

8月の1位を更新した観測値(最大風速)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	特定期間内における最大値			これまでの8月の1位の値			統計開始年	備考
			m/s	風向	年月日 時分(まで)	m/s	風向	年月日		
山口県	山口市	徳佐(トクサ)	10.0	南	2023/8/10 14:03	8	西	2004/8/30	1977年	
長崎県	対馬市	鰐浦(ワニウラ)	24.3	東	2023/8/10 5:59	22	東	2002/8/31	1995年	

气象台、測候所、特別地域気象観測所は地点名に「*」を付加しています。

観測値に付加された記号の意味

”)”：準正常値 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

”]”：資料不足値 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

観測史上1位を更新した観測値(最大瞬間風速)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	更新した値			これまでの1位の値			統計開始年	備考
			m/s	風向	年月日 時分(まで)	m/s	風向	年月日		
大分県	国東市	国見(クニミ)	26.8	南南東	2023/8/10 1:25	23.2	南	2015/8/25	2008年	

8月の1位を更新した観測値(最大瞬間風速)(7月30日～8月10日)

都道府県	市町村	地点	特定期間内における最大値			これまでの8月の1位の値			統計開始年	備考
			m/s	風向	年月日 時分(まで)	m/s	風向	年月日		
福岡県	福岡市博多区	博多(ハカタ)	23.7	南東	2023/8/10 7:36	23.1	西	2015/8/25	2009年	
大分県	国東市	国見(クニミ)	26.8	南南東	2023/8/10 1:25	23.2	南	2015/8/25	2008年	
長崎県	対馬市	鰐浦(ワニウラ)	34.5	東南東	2023/8/10 5:46	31.4	南	2010/8/11	2009年	
長崎県	対馬市	美津島(ミツシマ)	35.0	東南東	2023/8/10 5:30	30.9	北東	2015/8/25	2009年	
長崎県	大村市	大村(オオムラ)	28.3	南東	2023/8/9 23:48	28.3	北北東	2015/8/25	2009年	[タイ記録]
宮崎県	西臼杵郡五ヶ瀬町	鞍岡(クラオカ)	25.8	北北東	2023/8/8 2:18	25.2	北北東	2015/8/25	2008年	
鹿児島県	鹿屋市	輝北(キホク)	25.4	南東	2023/8/9 12:19	25.3	東南東	2015/8/24	2008年	
鹿児島県	志布志市	志布志(シブシ)	23.5	東南東	2023/8/8 22:37	23.3	南東	2015/8/25	2008年	
鹿児島県	肝属郡肝付町	肝付前田(キモツキマエダ)	28.7	北北東	2023/8/8 19:19	28.1	南南東	2015/8/25	2009年	
鹿児島県	大島郡与論町	与論島(ヨロンジマ)	38.1	東南東	2023/8/2 0:18	38.1	東南東	2011/8/5	2009年	[タイ記録]


気象台、測候所、特別地域気象観測所は地点名に「*」を付加しています。

観測値に付加された記号の意味

”)”：準正常値 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。


”]”：資料不足値 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

波浪実況分布図(7月30日)



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


7月30日 09時



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


7月30日 21時

波浪実況分布図(7月31日)



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


7月31日 09時



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


7月31日 21時

波浪実況分布図(8月1日)



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月1日 09時



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月1日 21時

波浪実況分布図(8月2日)



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月2日 09時




All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency

8月2日 21時

波浪実況分布図(8月3日)




8月3日 09時




8月3日 21時

波浪実況分布図(8月4日)



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月4日 09時



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月4日 21時

波浪実況分布図(8月5日)



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月5日 09時



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月5日 21時

波浪実況分布図(8月6日)



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月6日 09時



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月6日 21時

波浪実況分布図(8月7日)



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月7日 09時



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月7日 21時

波浪実況分布図(8月8日)



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency


8月8日 09時




All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency

8月8日 21時

波浪実況分布図(8月9日)




8月9日 09時




8月9日 21時

波浪実況分布図(8月10日)



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency

8月10日 09時






All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency

8月10日 21時

顕著な大雨に関する気象情報の発表状況

発表日時		府県予報区	一次細分区域
8月9日	10時20分	鹿児島	種子島・屋久島地方
8月9日	21時00分	宮崎県	宮崎県南部山沿い
8月9日	21時00分	熊本県	球磨地方
8月10日	01時39分	大分県	大分県南部
8月10日	01時39分	宮崎県	宮崎県北部平野部、北部山沿い




※レーダー画像はそれぞれの地域において顕著な大雨に関する気象情報の発表に用いた解析時刻の画像を示しています。

※線状降水帯の事例一覧については以下の気象庁ホームページをご参照ください。


https://www.data.jma.go.jp/senjo_list/list_senjokousuitai.html

キキクルの最大危険度(8月8日)




※最大危険度は、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(8月9日)



※最大危険度は、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

キキクルの最大危険度(8月10日)



※最大危険度は、それぞれのキキクルにおいて各格子ごとに当該日で最も高くなった危険度を表示したものです。

参考資料

雨の強さと降り方

1 時間雨量 (mm)	雨の強さ (予報用語)	人の受ける イメージ	人への影響	屋内 (木造住宅を想定)	屋外の様子	車に乗っていて
10 ～20	やや 強い雨	ザーザーと 降る。	地面からの跳ね返 りで足元がぬれる。	雨の音で話し声 が良く聞き取れ ない。	地面一面に水たまり ができる。 	
20 ～30	強い雨	どしゃ降り。	傘をさしていてもぬれる。 	寝ている人の半数 くらいが雨に気が つく。 		ワイパーを速くして も見づらい。
30 ～50	激しい雨	バケツを ひっくり返した ように降る。			道路が川のように なる。	高速走行時、車輪と 路面の間に水膜が生 じブレーキが効か なくなる。 (ハイドロブレーニ ング現象)
50 ～80	非常に 激しい雨	滝のように降る。 (ゴーゴーと降り 続く)	傘は全く役に立た なくなる。 		水しぶきであたり一 面が白っぽくなり、 視界が悪くなる。 	車の運転は危険。 
80 ～	猛烈な雨	息苦しくなる ような圧迫感 がある。恐怖 を感じる。				

参考資料

風の強さと吹き方

平均風速 (m/s) およその時速	風の強さ (予報用語)	速さ の目安	人への影響	屋外・樹木 の様子	走行中の車	建造物	およその 瞬間風速 (m/s)
10～15 ～約50km/h	やや 強い風	一般道路 の自動車	風に向かって歩きにくくなる。傘がさせない。	樹木全体が揺れ始める。 電線が揺れ始める。	道路の吹流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける。	樋（とい）が揺れ始める。	20
15～20 ～約70km/h	強い風		風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出る。高所での作業はきわめて危険。	電線が鳴り始める。 看板やトタン板が外れ始める。	高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる。	屋根瓦・屋根葺材がはがれるものがある。雨戸やシャッターが揺れる。	
20～25 ～約90km/h	非常に 強い風	高速道路 の自動車	何かにつかまっていないと立ってられない。飛来物によって負傷するおそれがある。 	細い木の幹が折れたり、根の張っていない木が倒れ始める。看板が落下・飛散する。道路標識が傾く。 	通常の速度で運転するのが困難になる。 	屋根瓦・屋根葺材が飛散するものがある。固定されていないプレハブ小屋が移動、転倒する。ビニールハウスのフィルム（被覆材）が広範囲に破れる。 	30
25～30 ～約110km/h							
30～35 ～約125km/h	猛烈な風	特急電車	屋外での行動は極めて危険。 	多くの樹木が倒れる。電柱や街灯で倒れるものがある。ブロック壁で倒壊するものがある。 	走行中のトラックが横転する。 	固定の不十分な金属屋根の葺材がめくれる。養生の不十分な仮設足場が崩落する。	40
35～40 ～約140km/h						外装材が広範囲にわたって飛散し、下地材が露出するものがある。 	
40～						住家で倒壊するものがある。鉄骨構造物で変形するものがある。	60
約140km/h～							