

エルニーニョ監視速報 (No. 85)

太平洋赤道域の海水温等の 1999 年 9 月の状況、及びエルニーニョ監視海域の海面水温の今後の見通しは、以下の通りである。

1999 年 9 月の状況

- ① エルニーニョ監視海域(北緯 4 度～南緯 4 度、西経 150 度～西経 90 度)の 9 月の海面水温偏差は、 -0.8°C であった(図 1、表)。
- ② 9 月の太平洋赤道域の海面水温は、東経 160 度以東で平年より低く、西経 140 度と西経 125 度付近及び西経 115 度から西経 100 度にかけて -1°C 以下の負偏差が見られた。一方、東経 125 度から東経 150 度にかけて $+0.5^{\circ}\text{C}$ 以上の正偏差が見られた(図 2)。
- ③ 9 月の南方振動指数は -0.1 (暫定値)であった(表)。(南方振動指数は貿易風の強さの目安であり、正(負)の値は貿易風が強(弱)いことを示す。)
- ④ 太平洋の赤道に沿った表層(海面から深度数百 m までの領域)水温の断面図では、8 月に比べ、西経 130 度から西経 100 度にかけての海面から深度 150m までの領域で負偏差が強まり、西経 115 度の深度 75m 付近には -4°C 以下の負偏差が見られた(図 3)。太平洋の赤道に沿った海面から深度 260m までの平均水温平年偏差の経度 - 時間断面図では、7 月以来正偏差域が東に広がる傾向が見られ、9 月にはその東端が西経 170 度付近に達した。(図 5)。

表 エルニーニョ監視指数

	1998 年			1999 年								
	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
月平均海面水温 ($^{\circ}\text{C}$)	23.8	24.1	23.8	24.2	25.5	26.8	26.7	26.4	25.5	24.8	24.0	23.8
平年偏差 ($^{\circ}\text{C}$)	-0.8	-0.5	-1.1	-1.2	-0.7	-0.1	-0.4	-0.2	-0.6	-0.4	-0.6	-0.8
5 か月移動平均 ($^{\circ}\text{C}$)	<u>-0.6</u>	<u>-0.8</u>	<u>-0.8</u>	<u>-0.7</u>	<u>-0.7</u>	<u>-0.5</u>	<u>-0.4</u>	<u>-0.3</u>	<u>-0.5</u>	<u>-0.5</u>		
南方振動指数	+1.2	+1.0	+1.5	+1.5	+0.8	+0.8	+1.8	+0.3	+0.1	+0.6	+0.0	!-0.1

エルニーニョ監視海域：北緯 4 度～南緯 4 度、西経 150 度～西経 90 度

海面水温の平年値は、1961～1990 年の 30 年平均値である。

気象庁では、エルニーニョ監視海域の海面水温偏差の 5 か月移動平均値が 6 か月以上続けて $+0.5^{\circ}\text{C}$ 以上となった場合をエルニーニョ現象、6 か月以上続けて -0.5°C 以下となった場合をラニーニャ現象としている。

5 か月移動平均値の 下線部 は $+0.5^{\circ}\text{C}$ 以上となった月を、斜字体は -0.5°C 以下となった月を示す。

南方振動指数の!印は暫定値であることを示す。

エルニーニョ監視海域
 (北緯4度~南緯4度、
 西経150度~西経90度)




図1 エルニーニョ監視海域の月平均海面水温偏差(°C)の推移(1975年1月~1999年9月)。折線は月平均値、滑らかな太線は5か月移動平均値を示し、正の値は平年(1961~90年の30年平均値)より高いことを示す。エルニーニョ現象の発生期間は上側に、ラニーニャ現象の発生期間は下側に、それぞれ陰影を施してある。




図2 1999年9月の海面水温図(上)及び平年偏差図(下)。海面水温図の太線は5°C毎、細線は1°C毎の、平年偏差図の太線は1°C毎、細線は0.5°C毎の等値線を示す。海面水温図の陰影部は28°C以上の領域を、偏差図の濃い(薄い)陰影部は1°C以上の正偏差域(0°C以下の負偏差域)を示す(平年は1961~90年の30年平均値)。




図3 1999年9月の太平洋の赤道に沿った水温(上図)及び平年偏差(下図)の断面図(海洋データ同化システムによる)。上図の等値線間隔は 1°C で 28°C 以上には陰影を施し、下図の等値線間隔は 0.5°C で $+1^{\circ}\text{C}$ 以上(-1°C 以下)の偏差には濃い(薄い)陰影を施した(平年は1987~98年の12年平均値)。




図4 太平洋の赤道に沿った海面水温平年偏差の経度-時間断面図。等値線の間隔は 0.5°C 、 $+0.5^{\circ}\text{C}$ 以上(-0.5°C 以下)の偏差には濃い(薄い)陰影を施した(平年は1961~1990年の30年平均値)。




図5 太平洋の赤道に沿った海面から深度260mまでの平均水温平年偏差の経度-時間断面図(海洋データ同化システムによる)。等値線の間隔は 0.5°C 、 $+0.5^{\circ}\text{C}$ 以上(-0.5°C 以下)の偏差には濃い(薄い)陰影を施した(平年は1987~98年の12年平均値)。

エルニーニョ現象等の今後の見通し（1999年10月～2000年4月）

エルニーニョ監視海域の海面水温が平年より低い状態は今後2、3か月持続し、その後も平年並からやや低めに経過する。


【解説】

エルニーニョ予測モデルは、監視海域の海面水温が今後数か月で徐々に平年並に近づき、その後は平年並の状態が続くという予測結果を示している（下図）。

南方振動指数に見られるように、貿易風は今年の春以来次第に弱まり平年並に近づいたが、東部太平洋赤道域の海面から深度150mまでの水温は平年より1から2°C低く、西部の正偏差域にも顕著な変化は見られない。このような実況から監視海域の海面水温はエルニーニョ予測モデルの予測値よりもやや低い状態で経過すると考えられ、今後数か月間、監視海域の海面水温偏差は負の状態が続く可能性が高い。

監視海域の海面水温偏差5か月移動平均値は6月から-0.5°C以下の状態が続いているので、再びラニーニャ現象の基準を満たす可能性もある。

エルニーニョ予測モデルによるエルニーニョ監視海域の海面水温偏差予測



この図は、先月までのエルニーニョ監視海域の海面水温偏差の推移（折れ線グラフ）とエルニーニョ予測モデルから得られた今後の予測（ボックス）を示したものです。各月のボックスは、予測される海面水温偏差が70%の確率で入る範囲を示します。

来月の発表は、11月10日14時の予定です。

内容に関する問い合わせ先：エルニーニョ監視予報センター
（電話 03-3212-8341 内線 5134、5135）