

山 梨 県 気 象 旬 報

令和8年8月 上旬

甲 府 地 方 気 象 台

令和8年8月12日発行

【天気概況】

この期間の天気は、高気圧に緩やかに覆われて晴れた日もありましたが、気圧の谷や湿った空気の影響で雨や雷雨の日が多くなりました。

甲府の旬平均気温は高く、旬間日照時間は多く、旬降水量は少なくなりました。

【旬の値】


	気温 (°C)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	28.7	27.6	高い	88.1	69.4	多い	13.5	43.0	少ない
河口湖	23.3	23.0	平年並	66.5	58.9	多い	11.0	50.3	少ない

【日毎の概況】


	昼 (06h00m～18h00m)	夜 (18h00m～翌06h00m)
1日	曇時々晴	曇一時雨後晴、雷を伴う
2日	晴後時々曇、雷を伴う	曇一時雨、雷を伴う
3日	曇後時々晴一時雨	曇後時々晴
4日	晴	晴一時曇
5日	晴	晴後一時雨
6日	晴後一時雨一時曇	晴
7日	晴、雷を伴う	曇時々晴、雷を伴う
8日	晴時々曇後雨、雷を伴う	曇一時雨、雷を伴う
9日	曇一時晴、雷を伴う	曇一時雨、雷を伴う
10日	晴一時曇	晴時々曇

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月10日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月10日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川



(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	24.1	23.7	+0.4
葦崎	27.2	26.1	+1.1
甲府	28.7	27.6	+1.1
勝沼	26.8	26.7	+0.1
大月	25.6	25.6	0.0
古閑	25.3	24.7	+0.6
切石	27.6	26.6	+1.0
河口湖	23.3	23.0	+0.3
山中	21.7	21.7	0.0
南部	28.0	26.8	+1.2

階級区分

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	73.0	36.4	201
乙女湖	71.5	65.5	109
葦崎	19.5	34.2	57
甲府	13.5	43.0	31
勝沼	49.0	27.1	181
大月	20.5	47.0	44
上野原	30.5	//	//
富士川	31.0	26.6	117
古閑	15.0	49.2	30
切石	34.5	39.9	86
河口湖	11.0	50.3	22
山中	23.0	58.2	40
南部	30.0	71.0	42

階級区分

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間 (h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	85.4	70.3	121
葦崎	88.2	73.0	121
甲府	88.1	69.4	127
勝沼	89.8	69.0	130
大月	66.4	68.4	97
古関	94.5	69.5	136
切石	97.7	72.7	134
河口湖	66.5	58.9	113
山中	66.0	67.7	97
南部	86.1	59.5	145

階級区分

かなり少ない
 少ない
 平年並
 多い
 かなり多い
 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

クビアカツヤカミキリの早期発見、緊急防除にご協力ください

先月、特定外来生物のクビアカツヤカミキリが、県内で初めて確認されました。

クビアカツヤカミキリは、サクラやモモ、ウメなどのバラ科樹木に寄生し、幼虫は、木の内部を食い進み、樹勢^{じゅせい}の低下や枯れてしまう被害をもたらします。

また、成虫は、体がツヤのある黒色^{くろいろ}で、胸に赤く、コブ状の突起があるのが特徴です。

繁殖力が強い^{ため}、発生地域の拡大を防ぐためには、早期発見・早期防除が非常に重要です。

特に、成虫が産卵を行う今の時期は、被害拡大を食い止めるための最も重要な防除の機会です。

生産者の皆様におかれましては、果樹園の一斉点検を実施していただき、発見した場合は、お近くの農務事務所、または市町村にお知らせください。

また、成虫が活動している8月中の緊急薬剤防除の実施も、併せてお願いいたします。

県では、クビアカツヤカミキリに対する緊急防除に必要な農薬購入経費に対する補助金を、新たに創設いたしました。

補助金の詳細につきましては、県農業技術課のホームページでご確認いただくか、お近くの農務事務所、または県農業技術課までお問い合わせください。

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など
<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/>

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。