

山梨県気象旬報

令和8年9月中旬

甲府地方気象台

令和8年9月24日発行

【天気概況】

この期間の天気は、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が続き、雷雨の日もありました。

甲府の旬平均気温は平年並、旬間日照時間はかなり少なく、旬降水量は多くなりました。

【旬の値】


	気温 (℃)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	23.4	23.5	平年並	26.4	49.5	かなり少ない	94.5	71.0	多い
河口湖	18.7	18.9	平年並	18.4	40.7	かなり少ない	113.5	86.4	多い

【日毎の概況】


	昼 (06h00m～18h00m)	夜 (18h00m～翌06h00m)
11日	雨時々曇	曇後雨時々晴
12日	曇一時雨	曇時々雨
13日	曇時々雨	晴時々曇
14日	晴後雨時々曇	雨時々曇
15日	雨時々曇	曇後時々雨
16日	雨、雷を伴う	雨後時々曇
17日	晴時々曇	曇後一時晴
18日	晴後一時曇	曇時々晴
19日	曇後一時雨	曇時々雨
20日	曇時々雨	雨

アメダス 気象経過図：2026年09月11日-2026年09月20日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2026年09月11日-2026年09月20日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	19.8	19.4	+0.4
葦崎	22.2	22.0	+0.2
甲府	23.4	23.5	-0.1
勝沼	22.0	22.4	-0.4
大月	20.8	21.3	-0.5
古関	20.4	20.5	-0.1
切石	22.3	22.5	-0.2
河口湖	18.7	18.9	-0.2
山中	17.8	17.6	+0.2
南部	23.1	23.2	-0.1

階級区分

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	54.5	62.8	87
乙女湖	95.0	65.8	144
葦崎	91.5	73.5	124
甲府	94.5	71.0	133
勝沼	69.5	66.7	104
大月	113.0	73.0	155
上野原	136.0	//	//
富士川	97.5	58.4	167
古関	111.5	119.7	93
切石	113.0	105.2	107
河口湖	113.5	86.4	131
山中	135.0	122.1	111
南部	175.0	141.2	124

階級区分

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間 (h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	29.0	49.5	59
葦崎	23.7	48.7	49
甲府	26.4	49.5	53
勝沼	25.4	49.5	51
大月	11.1	44.3	25
古閑	18.9	45.6	41
切石	20.1	50.3	40
河口湖	18.4	40.7	45
山中	15.5	38.2	41
南部	22.0	41.9	53

階級区分

かなり少ない
 少ない
 平年並
 多い
 かなり多い
 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

「秋のクビアカツヤカミキリ対策」として

樹の幹を今すぐチェックしましょう

クビアカツヤカミキリは、モモ、サクラ、ウメなどのバラ科の樹木に寄生するカミキリムシで、繁殖力が強く、農業や生態系へ深刻な影響を及ぼすことから、特定外来生物に指定されています。

今年、県内で初めて発生が確認され、生産者の皆様には、成虫発生時期の緊急的な防除に御協力いただきました。

秋は10月頃まで、幼虫の活動により、木くずと糞が混ざった「フラス」と呼ばれるおがくず状の排出物が見つかりやすい時期です。

モモやスモモ、ウメなどの園地では、樹の株元や主幹部を中心に、フラスが出ていないか、定期的な見回りをお願いします。

また、園地周辺のサクラについても併せて確認してください。

フラスを発見した時は、速やかに最寄りのJAや農務事務所へご連絡ください。

クビアカツヤカミキリは被害が拡大すると防除が難しくなるため、被害の拡大を防ぐには早期発見が非常に重要です。

大切な果樹園を守るため、園地や周辺樹木の見回りを徹底し、クビアカツヤカミキリの早期発見にご協力をお願いします。

クビアカツヤカミキリについての詳しい情報は、県農業技術課のホームページに掲載していますので、ぜひご確認ください。

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など
<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/>

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。