

山梨県気象旬報

令和8年10月上旬

甲府地方気象台

令和8年10月13日発行

【天気概況】

この期間の天気は、高気圧に覆われて概ね晴れましたが、湿った空気の影響で曇りとなった日もありました。

甲府の旬平均気温は高く、旬間日照時間はかなり多く、旬降水量はかなり少なくなりました。

【旬の値】


	気温 (°C)			日照 (h)			降水量 (mm)		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
甲府	21.1	19.4	高い	78.7	47.0	かなり多い	0.0	69.0	かなり少ない
河口湖	16.0	15.1	高い	47.2	39.0	多い	0.5	93.2	かなり少ない

【日毎の概況】


	昼 (06h00m～18h00m)	夜 (18h00m～翌06h00m)
1日	晴	晴後一時曇
2日	晴時々曇	曇後時々晴
3日	晴時々曇	曇
4日	曇時々晴	曇時々雨
5日	曇時々晴	晴一時曇
6日	晴後一時曇	曇
7日	晴一時曇	晴
8日	晴	曇時々晴
9日	晴一時曇	晴時々曇
10日	晴	晴

アメダス 気象経過図：2026年10月01日-2026年10月10日


甲府




大泉




韮崎




勝沼



大月




古閑




(注) 甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2026年10月01日-2026年10月10日


河口湖




切石




山中




南部




乙女湖



上野原




富士川



（注）甲府・河口湖以外における観測地点の日照時間値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	16.2	15.4	+0.8
葦崎	19.4	18.0	+1.4
甲府	21.1	19.4	+1.7
勝沼	19.7	18.4	+1.3
大月	18.5	17.4	+1.1
古関	17.4	16.4	+1.0
切石	19.8	18.3	+1.5
河口湖	16.0	15.1	+0.9
山中	14.6	13.7	+0.9
南部	21.0	19.5	+1.5

階級区分

かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	0.5	56.7	1
乙女湖	0.0	54.4	0
葦崎	0.0	68.9	0
甲府	0.0	69.0	0
勝沼	0.0	62.4	0
大月	0.5	82.1	1
上野原	0.5	//	//
富士川	0.0	73.2	0
古関	0.0	94.2	0
切石	0.0	93.5	0
河口湖	0.5	93.2	1
山中	2.5	131.6	2
南部	0.0	126.5	0

階級区分

かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 日照時間 (h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	87.4	47.4	184
菰崎	74.6	44.9	166
甲府	78.7	47.0	167
勝沼	78.1	47.3	165
大月	57.1	40.6	141
古閑	58.4	41.8	140
切石	67.3	43.7	154
河口湖	47.2	39.0	121
山中	46.3	33.4	139
南部	62.9	37.9	166

階級区分

かなり少ない
 少ない
 平年並
 多い
 かなり多い
 欠測等

記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

高温に強い水稻品種「にじのきらめき」を 作ってみませんか

みなさん、「にじのきらめき」をご存じでしょうか。

「にじのきらめき」は、近年続く夏場の高温でも品質が落ちにくく、収量の多い水稻品種です。猛暑の年でも、割れや濁りの少ない良質な米が収穫できるため、安定した米づくりが期待できます。

また、コシヒカリと比べて草丈が低く、強風でも倒れにくい特長があります。この特長を十分に発揮するためには、適切な施肥管理^{せひ}を行うことが大切です。特に穂肥^{ほごえ}の時期や量に注意することで、安定した収量の確保と良質米の生産につながります。

さらに、収穫時期の見極めにも注意が必要です。「にじのきらめき」は、コシヒカリと収穫適期の判断が異なり、適期になっても葉の緑色が比較的濃く残ります。このため、葉の色だけで判断すると収穫が遅れることがあります。穂の成熟状態をしっかりと確認して収穫時期を判断することが重要です。

栽培面での特長に加え、食味にも優れています。粒が大きく、食べ応えがあり、甘みが強く、もっちりとした食感があります。冷めてもおいしいため、おにぎりやお弁当にも適しています。

来年の作付けを検討されている生産者の皆さん、「にじのきらめき」の栽培に挑戦してみませんか。栽培方法については、県ホームページに掲載しています。栽培に関するご相談は、お近くの農務事務所までお問い合わせください。

掲載している観測データ

観測値や統計値の定義は「気象観測統計指針」に準拠しています。詳しくは気象庁ホームページの「気象観測統計の解説」のページに掲載しています。

■ホームページのご案内

農業気象災害 … 山梨県ホームページ（農業気象災害に係るマニュアル・資料等）
<https://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kisyousaigai.html>

気象庁ホームページ … 季節予報など
<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

過去の気象データ検索 … 観測値・統計値
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/>

気象観測統計の解説 … 観測値・統計値の定義
<https://www.data.jma.go.jp/stats/data/kaisetu/>

－ 利用上の注意 －

この資料は速報値です。後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。その他、利用上の留意事項については、気象庁ホームページの利用規約(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠します。