

阿蘇山の火山活動解説資料（平成 24 年 2 月）

福岡管区気象台

火山監視・情報センター

火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は認められませんが、火口内では土砂や火山灰の噴出する可能性があります。また、火口付近では火山ガスに対する注意が必要です。

平成 23 年 6 月 20 日に噴火予報（噴火警戒レベル 1、平常）を発表しました。その後、予報警報事項に変更はありません。

○ 2 月の活動概況

・噴煙など表面現象の状況（図 2、図 3、図 7～9）

噴煙活動は低調で、噴煙の高さは火口縁上 300m 以下で経過しました。

湯だまり¹⁾量は 9 割（1 月：9 割）で変化はありませんでした。湯だまりの表面温度²⁾は 51°C（1 月：46°C）でした。噴湯現象³⁾は確認できませんでした。

南側火口壁の最高温度²⁾は 150°C で、前回（1 月：166°C）と比較して特段の変化はありませんでした。赤外熱映像装置⁴⁾による南側火口壁の温度分布にも、特段の変化はありませんでした。

・地震や微動の発生状況（図 2、図 4）

孤立型微動⁵⁾は、月回数が 92 回（1 月：45 回）で、少ない状態で経過しました。

火山性地震は、月回数が 89 回（1 月：26 回）で、少ない状態で経過しました。震源は、主に中岳第一火口付近のごく浅いところに分布しました。

振幅が小さく、継続時間の短い火山性微動が 1 回発生しました（1 月：なし）。火山性微動が発生したのは 2011 年 9 月以来でした。

- 1) 活動静穏期の中岳第一火口には、地下水などを起源とする約 50～60°C の緑色の湯がたまっています。これを湯だまりと呼んでいます。火山活動が活発化するにつれ、湯だまり温度が上昇・噴湯して湯量の減少や濁りがみられ、その過程で土砂を噴き上げる土砂噴出現象等が起こり始めることができます。
- 2) 赤外放射温度計で観測しています。赤外放射温度計は、物体が放射する赤外線を感じて温度を測定する測器で、熱源から離れた場所から測定できる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で実際の熱源の温度よりも低く測定される場合があります。
- 3) 湯だまり内で火山ガス等が噴出し、湯面が盛り上がる現象です。
- 4) 赤外熱映像装置は物体が放射する赤外線を感じて温度分布を測定する測器です。熱源から離れた場所から測定することができる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で実際の熱源の温度よりも低く測定される場合があります。
- 5) 阿蘇山特有の微動で、火口直下のごく浅い場所で発生しており、周期 0.5～1.0 秒、継続時間 10 秒程度で振幅が 5 μm/s 以上のものを孤立型微動としています。

この火山活動解説資料は福岡管区気象台ホームページ（<http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/>）や気象庁ホームページ（<http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/volcano.html>）でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（平成 24 年 3 月分）は平成 24 年 4 月 9 日に発表する予定です。

※この資料は気象庁のほか、国土地理院、京都大学、独立行政法人防災科学技術研究所及び阿蘇火山博物館のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図 50m メッシュ（標高）』及び『数値地図 10m メッシュ（火山標高）』を使用しています（承認番号：平 23 情使、第 467 号）。

・地殻変動の状況（図 5、図 6）

GPS 連続観測では、火山活動によると考えられる変化は認められませんでした。




図 1 阿蘇山 観測点配置図

小さな白丸は気象庁、小さな黒丸は阿蘇火山博物館の観測点位置を示しています。




図2 阿蘇山 噴煙、火山性地震、孤立型微動の状況（1989年1月～2012年2月）

<2月の状況>

- ・噴煙活動は低調で、噴煙の高さは火口縁上 300m 以下で経過しました。
- ・孤立型微動は、月回数が 92 回（1月：45 回）で、少ない状態で経過しました。
- ・火山性地震は、月回数が 89 回（1月：26 回）で、少ない状態で経過しました。
- ・振幅が小さく、継続時間の短い火山性微動が 1 回発生しました（1月：なし）。

2002年3月1日から検測基準を変位波形から速度波形に変更しました。





図3* 阿蘇山 湯だまり、火口壁、二酸化硫黄放出量の状況（1989年1月～2012年2月）

<2月の状況>

- ・湯だまり量は9割（1月：9割）で変化はありませんでした。
- ・湯だまりの表面温度は51°C（1月：46°C）でした。
- ・南側火口壁の最高温度は150°C（1月：166°C）と前回と比較して特段の変化はありませんでした。

6) 湯だまり面の標高の観測は2007年1月21日から実施しています。

7) 火山ガスの観測は2007年3月6日から実施しています。



● : 2012 年 2 月の震源

○ : 2004 年 1 月～2012 年 1 月の震源

図 4* 阿蘇山 震源分布図（2004 年 1 月～2012 年 2 月）

<2 月の状況>

震源は、主に中岳第一火口付近のごく浅いところに分布しました。




図 5 阿蘇山 GPS 連続観測点と基線番号

小さな白丸は気象庁、小さな黒丸は国土地理院の観測点位置を示しています。




図 6* 阿蘇山 GPS 連続観測による基線長変化（2001 年 3 月～2012 年 2 月）

②の基線においては長期的な縮みの傾向が続いています。

この基線は図 5 の①～⑤に対応しています。

2008 年 2 月 1 日に砂千里浜観測点の取付台を移動したことにより、草千里-砂千里浜、仙酔峠-砂千里浜の基線長が約 70cm ずれたため、補正して表示しています。

2009 年 7 月 22 日～9 月 29 日は仙酔峠観測点障害のため欠測。

2010 年 10 月以降のデータについては、電離層の影響を補正する等、解析方法を改良しています。また、掲載する基線を一部変更しました




図 7 阿蘇山 噴煙の状況（2月 29 日、草千里遠望カメラによる）
白色の噴煙が火口縁上 300mまで上がりました。




図 8 阿蘇山 中岳第一火口南西側定点から第一火口内の状況
・湯だまり量は 9 割（2012 年 1 月：9 割）で変化はありませんでした。
・噴湯現象は確認できませんでした。




図9 阿蘇山 赤外熱映像装置による中岳第一火口南側火口壁の地表面温度分布
温度分布に特段の変化はありませんでした。