

## 霧島山の火山活動解説資料（令和2年4月）

福岡管区気象台  
地域火山監視・警報センター  
鹿児島地方気象台

### えびの高原（硫黄山）周辺

硫黄山では活発な噴気活動が続いていますが、火山性地震は少ない状態で経過しています。また、GNSS 連続観測では、硫黄山近傍の基線の伸びは2019年2月頃から概ね停滞しています。

火山活動に特段の変化は認められませんが、現在活発な噴気活動がみられている硫黄山の西側500mの噴気地帯から概ね100mの範囲、及び硫黄山火口内では、熱水・熱泥等が飛散する可能性がありますので注意してください。また、火山ガスにも注意が必要です。地元自治体等が行う立ち入り規制に従うとともに、火口周辺や噴気孔の近くには留まらないでください。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

### ○ 活動概況

#### ・噴煙など表面現象の状況（図1～3、図5-①②、図6-①）

硫黄山の南側の噴気地帯では、白色の噴気が最高で400mまで上がるなど活発な噴気活動が続いています。硫黄山の西側500m付近の噴気活動はやや活発な状態が継続しており、噴気の高さは概ね50m以下で経過しました。

9日にえびの高原及び韓国岳4合目付近から実施した現地調査では、硫黄山周辺の噴気地帯や地熱域の状況に特段の変化は認められませんでした。

#### ・地震や微動の発生状況（図4、図5-④～⑥、図6-②～⑤）

硫黄山付近では、ごく微小な地震を含め火山性地震は少ない状態で経過しました。

火山性微動は2018年6月20日以降、観測されていません。

ごく微小な地震を含む硫黄山付近の火山性地震の月回数は16回（ごく微小な地震は13回）で、前月（3月：35回（ごく微小な地震は28回））と比べ減少しました。えびの高原周辺（硫黄山以外）では、火山性地震の月回数は33回（3月：5回）で、このうち4日20時48分に発生した白鳥山付近の浅部を震源とする地震では、聞き取りによる調査の結果、えびの高原においてわずかに体を感じる揺れがありました。

この火山活動解説資料は福岡管区気象台ホームページ（<https://www.jma-net.go.jp/fukuoka/>）や気象庁ホームページ（[https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly\\_v-act\\_doc/monthly\\_vact.php](https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php)）でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（令和2年5月分）は令和2年6月8日に発表する予定です。

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

（<https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html>）

この資料は気象庁のほか、国土地理院、東京大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、宮崎県及び鹿児島県のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図50mメッシュ（標高）』『基盤地図情報』『基盤地図情報（数値標高モデル）』を使用しています（承認番号：平29情使、第798号）。

震源が求めた火山性地震は23回で、主に韓国岳周辺及び北東側の深さ0～3km付近、大浪池周辺の深さ3km付近、白鳥山周辺の深さ2～3km付近に分布しました。韓国岳近傍とその周辺では、2018年8月頃から地震が増加し、その後も引き続き地震活動がみられています。

・地殻変動の状況（図5-③、図7～10）

GNSS連続観測では、硫黄山近傍の基線で、2018年4月の噴火後に山体の収縮がみられました。その後再び山体の膨張を示す伸びの傾向がみられていましたが、2019年2月頃から概ね停滞しています。一方、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸びは2019年2月以降停滞しています。

・全磁力変化の状況（図11～13）

全磁力観測では、観測を開始した2016年2月以降、硫黄山の北側の観測点では全磁力の増加が、南側の観測点では全磁力の減少が継続しており、硫黄山周辺の地下で熱消磁現象の進行を示す全磁力変動が観測されていますが、その変動は2019年4月頃から鈍化しています。



図 1-1 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山付近の状況  
（4月6日、えびの高原監視カメラによる）

硫黄山の南側の噴気地帯では活発な噴気活動が、西側 500m付近ではやや活発な噴気活動が続いています。



図 1-2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山南側の状況  
（4月24日、硫黄山南監視カメラによる）

硫黄山の南側の噴気地帯で活発な噴気活動が続いています。






図 2-1 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山南側の噴気の状態  
硫黄山南側の噴気孔では引き続き活発な噴気活動を確認しました。噴気孔内の湯だまりでは前回（3月17日）の観測と同様に噴湯現象が認められました。



図 2-2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山西側500mの噴気の状態  
硫黄山西側500mの噴気孔では、引き続きやや活発な噴気活動を確認しました。







図 2-3 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山の火口及びその周辺の状況  
（韓国岳4合目（図3参照）から観測）

- ・硫黄山の火口及びその周辺では、引き続き噴気活動及び地熱域を確認しました。
  - ・前回の観測（2019年11月19日）と比べて、特段の変化は認められませんでした。
- ※一部の地熱域は噴気により遮蔽されています（白破線域）。






図 2-4 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山の状況（えびの高原（図 3 参照）から観測）  
 硫黄山南側の活発な噴気や硫黄山の西側 500m のやや活発な噴気及び硫黄山南西側の地熱域を  
 引き続き確認しました。




図3 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 図2の観測位置及び撮影方向（上段）、及び噴火位置、主な噴気地帯及び地熱域（下段）

えびの高原（硫黄山）周辺の噴気地帯及び地熱域の状況に変化はありません。

- ・ ☆は噴火位置を示します。白丸（○）は気象庁、黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
- ・ 2018年4月の噴火以前から確認されている噴気地帯及び地熱域を●で示します。
- ・ 2018年4月9日に確認した噴気地帯及び地熱域を●で示します（一時期、活発な熱泥の噴出がみられました）。
- ・ 2018年4月の噴火以降に拡大した噴気地帯を●及び●で示します。






図4 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 震源分布図（2015年1月～2020年4月）

< 4月の状況 >

震源が求まった火山性地震は23回で、震源は主に韓国岳周辺及び北東側の深さ0～3km付近、大浪池周辺の深さ3km付近、白鳥山周辺の深さ2～3km付近に分布しました（東西断面図）。韓国岳近傍とその周辺では、2018年8月頃から地震が増加し、その後も引き続き地震活動がみられています。

その他、えびの岳西側約1～2kmの深さ1～3km付近（図中の矩形内）においても地震活動がみられています。

※えびの高原（硫黄山）周辺以外の震源も含まれています。

※2018年10月は、観測点の障害により、硫黄山近傍で震源が求まらなかった期間があります。




図5 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 火山活動経過図（2018年1月～2020年4月）

＜4月の状況＞

- ・硫黄山の南側の噴気地帯では、噴気が最高で400mまで上がりました。硫黄山の西側500m付近では、噴気の高さは概ね50m以下で経過しました。
- ・火山性微動は2018年6月20日以降、観測されていません。
- ・ごく微小な地震を含む火山性地震は、少ない状態で経過しました。




図6 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 火山活動経過図（2014年1月～2020年4月）

< 4月の状況 >

- ・ごく微小な地震を含む硫黄山付近の火山性地震の月回数は16回（ごく微小な地震は13回）で、前月（3月：35回（ごく微小な地震は28回））と比べて減少しました。
- ・えびの高原周辺（硫黄山以外）では、火山性地震の月回数は33回（3月：5回）でした。
- ・火山性微動は2018年6月20日以降、観測されていません。

※2016年2月10日14時43分頃に発生した火山性微動は、韓国岳北東観測点が欠測中であったため⑤のグラフには掲載していません。






図7 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） GNSS 連続観測による基線長変化  
 (2017年10月～2020年4月)

GNSS 連続観測では、硫黄山近傍の基線で、2018年3月頃から山体の膨張を示す変動（青矢印）がみられていましたが、4月19日の噴火（▲）後に山体の収縮を示す変動（黒矢印）がみられました。その後、6月上旬から再び伸びの傾向（赤矢印）がみられていましたが、2019年2月頃から概ね停滞しています。

これらの基線は図9の①～⑤に対応しています。  
 緑色の破線内の変化は、地面の凍上の影響と考えられます。  
 青色の破線内の変化は、年周変動（季節変動）が含まれている可能性があります。  
 紫色の破線内の変化は、硫黄山南西観測点固有の局所的な変動による影響と考えられます。




図 8-1 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） GNSS 連続観測による基線長変化  
(2015年1月～2020年4月)

GNSS 連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸び（赤矢印）が2019年2月以降停滞しています。えびの高原周辺の基線（②）での硫黄山周辺の膨張を示すと考えられる基線の伸び（橙矢印）は、概ね停滞しています。

これらの基線は図 10 の①～⑤に対応しています。

緑色の破線内の変化は、地面の凍上の影響と考えられます。

橙色の破線内の変化は、観測点固有の局所的な変動によるものと考えられます。

基線の空白部分は欠測を示しています。

（国）：国土地理院




図 8-2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） GNSS 連続観測による基線長変化  
 (2015年1月～2020年4月)

GNSS 連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸び（赤矢印）が2019年2月以降停滞しています。えびの高原周辺の基線（⑧）での硫黄山周辺の膨張を示すと考えられる基線の伸び（橙矢印）は、概ね停滞しています。

これらの基線は図 10 の⑥～⑩に対応しています。

緑色の破線内の変化は、地面の凍上の影響と考えられます。

橙色の破線内の変化は、観測点固有の局所的な変動によるものと考えられます。

紫色の破線内の変化は、観測点周囲の環境の変化に伴う影響と考えられます。

基線の空白部分は欠測を示しています。

（国）：国土地理院






図9 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 図7のGNSS連続観測点と基線番号




図10 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 図8のGNSS連続観測点と基線番号

白丸（○）は気象庁、黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
 (国)：国土地理院




図 11 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 全磁力観測点配置図

2016年2月の観測開始以降の各観測点の全磁力の変化傾向（図12の変化傾向）を「■（増加傾向）」「■（減少傾向）」でそれぞれ示しています。




図 12 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 全磁力観測点で観測された全磁力変動  
（2016年2月～2020年4月）

- ・ 硫黄山の南約 60km にある地磁気観測所祓川観測点で観測された全磁力値を基準とした場合の 00:00 から 02:59 (JST) での日平均値を示しています。
- ・ 図上部の三角は 2018年4月19日および4月26日の噴火の発生を示しています。
- ・ 硫黄山の北側で全磁力の増加傾向（赤矢印）、南側で減少傾向（青矢印）が観測されており、観測を開始した 2016年2月以降、硫黄山周辺の地下で熱消磁現象の進行を示す全磁力変動が観測されていますが、その変動は 2019年4月頃から鈍化しています。

【参考】全磁力観測について

火山活動が静穏なときの火山体は地球の磁場（地磁気）の方向と同じ向きに磁化されています。これは、火山を構成する岩石には磁化しやすい鉱物が含まれており、マグマや火山ガス等に熱せられていた山体が冷えていく過程で、地磁気の方に帯磁するためです。しかし、火山活動の活発化に伴い、マグマが地表へ近づくなどの原因で火山体内の温度が上昇するにつれて、周辺の岩石が磁力を失うようになります。これを「熱消磁」と言います。そして地下で熱消磁が発生すると、地表で観測される磁場の強さ（全磁力）が変化します。これらのことから、全磁力観測により火山体内部の温度の様子を知る手がかりを得ることができます。

例えば、山頂直下で熱消磁が起きたとすると、火口の南側では全磁力の減少、火口北側では逆に全磁力の増大が観測されます。この変化は、熱消磁された部分に地磁気と逆向きの磁化が生じたと考えることで説明できます。山頂部で観測した全磁力の値は、南側Aでは地磁気と逆向きの磁力線に弱められて小さく、北側Bでは強められて大きくなるのがわかります（図13）。

ただし全磁力の変化は、熱消磁によるものだけでなく、地下の圧力変化などによっても生じることがあります。




図13 熱消磁に伴う全磁力変化のモデル

| 火山体周辺の全磁力変化と火山体内部の温度 |        |                   |
|----------------------|--------|-------------------|
| 北側の観測点で全磁力増加         | [消磁] → | 火山体内部の温度上昇を示唆する変化 |
| 南側の観測点で全磁力減少         |        |                   |
| 北側の観測点で全磁力減少         | [帯磁] → | 火山体内部の温度低下を示唆する変化 |
| 南側の観測点で全磁力増加         |        |                   |



## 新燃岳

新燃岳では、火山性地震の回数が増減を繰り返しています。また、火口西側斜面の割れ目付近において地熱域のわずかな拡大や噴気が継続して認められ、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量が増加するなど、火山活動が高まった状態となっています。一方で、地殻変動のデータに特段の変化がみられていないことから、現在のところ規模の大きな噴火に至る可能性は低いと考えられます。

弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね2 km まで、火砕流が概ね1 km まで達する可能性があります。そのため、新燃岳火口から概ね2 km の範囲では警戒してください。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石（火山れき）が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

地元自治体等が行う立入規制等にも留意してください。

令和2年1月2日に火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）を発表しました。その後、警報事項に変更はありません。

### ○ 活動概況

#### ・噴煙など表面現象の状況（図1～3、図4-①⑤、図5-①②）

新燃岳では、2018年6月28日以降、噴火は観測されていません。

火口周辺では、白色の噴煙が最高で火口縁上400mまで上がりました。火口西側斜面の割れ目では、2月13日以降噴煙が観測されており、概ね高さ100m以下で経過しました。

22日及び28日に新湯温泉付近から実施した現地調査では、流下した溶岩の上部及び火口西側斜面の割れ目で、前回（3月25日）の観測と同様に噴気を確認しました。また、割れ目付近では地熱域を確認しました。

#### ・地震や微動の発生状況（図4-②③⑥⑦、図5-④⑤、図6）

新燃岳火口直下を震源とする火山性地震は、4月には979回（3月：884回）と増加しました。発生回数は2019年11月以降増減を繰り返しており、4月21、22及び23日には日回数がそれぞれ301、188及び105回とさらに増加しました。日回数が300回を超えたのは2018年5月14日（410回）以来です。なお、火山性微動は観測されていません（3月：2回）。

震源が求まった火山性地震は22回（3月：42回）で、主に新燃岳火口直下のごく浅いところから深さ1 km 付近に分布しました。

#### ・火山ガスの状況（図4-④⑧、図5-③）

山麓で実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の1日あたりの放出量は、9日に100トン（前回2019年12月27日、検出限界未満）と増加しました。その後、23日には500トンとさらに増加しましたが、28日には100トンとやや減少しました。

なお、山麓の現地調査で火山ガス（二酸化硫黄）が検出されたのは2018年10月13日（1日あたり50トン）以来で、1日あたりの放出量が500トン以上となったのは同年4月11日（1日あたり600トン）以来です。

#### ・地殻変動の状況（図5-⑥、図7、図8）

新燃岳近傍の傾斜計では、2018年6月以降、顕著な変化は観測されていません。

GNSS連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸びは2019

年2月以降停滞しています。



図1 霧島山（新燃岳） 噴煙の状況（3月25日及び4月25日、韓国岳監視カメラによる）

- ・火口付近では白色の噴煙が最高で火口縁上400mまで上がりました。
- ・火口西側斜面の割れ目からの噴気が2月13日以降観測されており、概ね高さ100m以下で経過しました。
- ・3月以降、火口西側斜面の割れ目付近で地熱域のわずかな広がり認められています（黄破線）。



図2 霧島山（新燃岳） 図3の観測位置及び撮影方向




図3 霧島山（新燃岳） 新燃岳南西側斜面の状況（新湯温泉付近から観測）

流下した溶岩の上部及び火口西側斜面の割れ目で、前回（3月25日）の観測と同様に噴気を確認しました。また、割れ目付近では地熱域を確認しました。






図4 霧島山（新燃岳）火山活動経過図（2003年1月～2020年4月）

⑥の赤線は、地震の回数の積算を示しています。






図5 霧島山（新燃岳） 火山活動経過図（2018年2月～2020年4月）

< 4月の状況 >

- ・ 火口付近では白色の噴煙が最高で火口縁上400mまで上がりました。火口西側斜面の割れ目では2月13日以降噴気が観測されており、概ね高さ100m以下で経過しました。
- ・ 9日、23日及び28日に山麓で実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の1日あたりの放出量は100～500トン（前回2019年12月27日、検出限界未満）と増加しました。
- ・ 新燃岳火口直下を震源とする火山性地震は、2019年11月以降増減を繰り返しており、4月21～23日には日回数が100回を超えるなどさらに増加しました。
- ・ 火山性微動は観測されていません（3月：2回）。
- ・ 高千穂河原観測点の傾斜計では、2018年6月以降、山体膨張を示す顕著な変化は観測されていません。

④の灰色の領域は、新燃岳南西観測点の障害のためデータが抜けている期間です。

⑤の回数について、火山性微動の振幅が大きい状態では、振幅の小さな火山性地震の回数は計数できなくなっています。

⑤の赤線は、地震の回数の積算を示しています。

⑥について、2018年6月下旬から7月下旬にかけての期間や2019年7月には、霧島山周辺でまとまった降水があったため、高千穂河原観測点の傾斜計では、その影響（緑破線）による変動が認められます。




図6 霧島山（新燃岳） 震源分布図（2015年1月～2020年4月）

< 4月の状況 >

震源が求まった火山性地震は22回（3月：42回）で、震源は主に新燃岳火口直下のごく浅いところから深さ1km付近に分布しました。

※新燃岳周辺の震源のみ図示しています。

※観測点の障害により、震源が求まらなかった期間があります（青領域）。




図 7-1 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測による基線長変化（2015 年 1 月～2020 年 4 月）

GNSS 連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸び（赤矢印）が 2019 年 2 月以降停滞しています。

これらの基線は図 8 の①～⑥に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。

橙色の破線内の変化は、新床観測点周囲の環境の変化に伴う影響と考えられます。

紫色の破線内の変化は、韓国岳観測点固有の局所的な変動による影響と考えられます。




図 7-2 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測による基線長変化（2015 年 1 月～2020 年 4 月）

GNSS 連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸び（赤矢印）が 2019 年 2 月以降停滞しています。

これらの基線は図 8 の⑦～⑪に対応しています。

緑色の破線内の変化は、地面の凍上の影響と考えられます。

橙色の破線内の変化は、観測点周囲の環境の変化に伴う影響と考えられます。

基線の空白部分は欠測を示しています。

（国）：国土地理院




図8 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測点と基線番号

白丸（○）は気象庁、黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
 （国）：国土地理院



## 御 鉢

火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。  
噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

### ○ 活動概況

#### ・ 噴煙など表面現象の状況（図1、図2-①）

火口縁を越える噴煙は認められませんでした。

#### ・ 地震や微動の発生状況（図2-②～⑤、図3）

火山性地震の月回数は1回（3月：1回）で、少ない状態でした。震源が求まった火山性地震はありませんでした。

火山性微動は2018年2月10日以降、観測されていません。

#### ・ 地殻変動の状況（図4、図5）

地殻変動観測では、火山活動によると考えられる特段の変化は認められませんでした。



図1 霧島山（御鉢） 御鉢の状況（4月6日、猪子石監視カメラによる）  
火口縁を越える噴煙は認められませんでした。





図2 霧島山（御鉢） 火山活動経過図（2003年1月～2020年4月）

< 4月の状況 >

- ・ 火口縁を越える噴煙は認められませんでした。
- ・ 火山性地震の月回数は1回（3月：1回）で、少ない状態でした。



●: 2010年1月～2020年2月の震源  
 図3 霧島山（御鉢） 震源分布図（2010年1月～2020年4月）

< 4月の状況 >

震源が求まった火山性地震はありませんでした（3月：なし）。

※御鉢周辺の震源のみ図示しています。




図4 霧島山（御鉢） GNSS連続観測による基線長変化（2010年1月～2020年4月）


火山活動によると考えられる変化は認められませんでした。

これらの基線は図5の①～⑦に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。

2010年10月及び2013年1月に、解析方法を変更しています。


橙色の破線内の変化は、皇子原観測点周囲の環境の変化に伴う影響と考えられます。



小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
 (国)：国土地理院

図5 霧島山（御鉢） GNSS 連続観測点と基線番号





霧島山 観測点配置図

小さな白丸 (○) は気象庁、小さな黒丸 (●) は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
 (国) : 国土地理院、(震) : 東京大学地震研究所、(九) : 九州大学、(鹿大) : 鹿児島大学、  
 (防) : 防災科学技術研究所、(宮) : 宮崎県、(鹿) : 鹿児島県