

## 阿蘇山の火山活動解説資料（令和4年7月）

福岡管区气象台

地域火山監視・警報センター

阿蘇山では、火山活動は低下した状態で推移しています。

火山性微動の振幅は、概ね小さい状態で経過しています。6月25日頃（期間外）から11日頃まで孤立型微動及び火山性地震が増加しました。

火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は少ない状態でした。

火口内では、土砂や火山灰を噴出する可能性があります。また、火口付近では火山ガスに注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

## ○ 活動概況

## ・ 噴煙など表面現象の状況（図1～4、図5-①⑥⑦）

中岳第一火口では、白色の噴煙が最高で火口縁上800m（6月：1,000m）まで上がりました。

13日及び27日に中岳第一火口付近で実施した現地調査では、火口内で白色の噴煙、及び灰色の湯だまりを確認しました。湯だまり量は火口底の約4割でした。また、湯だまり内に噴湯を確認しましたが、土砂噴出は確認されませんでした。前月の観測と比較して、火口内の地形に特段の変化は認められませんでした。

赤外熱映像装置による観測では、湯だまりの表面温度は最高で73℃（6月：74℃）、南側火口壁の温度は最高で、296℃（6月：384℃）で前月より低下しました。南側火口壁の温度は低下傾向にあります。地熱域の分布に特段の変化は認められませんでした。

## ・ 地震や微動の発生状況（図5-②～④、図6）

6月25日頃（期間外）から11日頃まで孤立型微動及び火山性地震が増加しましたが、その後、徐々に減少しました。孤立型微動の月回数は、3,918回（6月：3,646回）とやや多い状態となりました。火山性地震の月回数は6,054回（6月：4,708回）と多い状態となりました。火山性微動の振幅は、概ね小さい状態で経過しました。

震源が求まった火山性地震は、中岳第一火口付近の深さ0 km付近に分布しました。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページ（[https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/monthly\\_v-act\\_doc/monthly\\_vact.php](https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php)）でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（令和4年8月分）は令和4年9月8日に発表する予定です。

資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国土地理院、京都大学、九州大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び阿蘇火山博物館のデータも利用して作成しています。

資料の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図50mメッシュ（標高）』『数値地図25000（行政界・海岸線）』を使用しています。

・火山ガスの状況（図5-⑤）

現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の1日あたりの放出量は、7月は600トン（6月：900～1,000トン）と少ない状態でした。

・地殻変動の状況（図7、図8）

GNSS 連続観測では、2021年9月頃からみられていた草千里付近の深部にあるマグマだまりの膨張を示すと考えられる基線の伸びは、同年12月頃から停滞しています。



図1 阿蘇山 噴煙の状況（7月12日、草千里監視カメラ）

白色の噴煙が最高で火口縁上800m（6月：1,000m）まで上がりました。




図2 阿蘇山 中岳第一火口の現地調査観測位置図（観測位置及び撮影方向）




図3 阿蘇山 中岳第一火口内の状況（火口南西側観測定点から観測）

- ・火口内で白色の噴煙、及び灰色の湯だまりを確認しました。湯だまり量は火口底の約4割でした。また、湯だまり内に噴湯を確認しましたが、土砂噴出は確認されませんでした。前月の観測と比較して、火口内の地形に特段の変化は認められませんでした。
- ・赤外熱映像装置による観測では、湯だまりの表面温度は最高で73℃（6月：74℃）でした。




図4 阿蘇山 中岳第一火口内南側火口壁の状況（火口南西側観測定点から観測）

赤外熱映像装置による観測では、南側火口壁の温度は最高で、296℃（6月：384℃）で前月より低下しました。南側火口壁の温度は低下傾向にあります。地熱域の分布に特段の変化は認められませんでした。




図5 阿蘇山 火山活動経過図（2020年8月～2022年7月）

＜7月の状況＞

- ・中岳第一火口では、白色の噴煙が最高で火口縁上800m（6月：1,000m）まで上がりました。
- ・6月25日頃（期間外）から11日頃まで孤立型微動及び火山性地震が増加しましたが、その後、徐々に減少しました。孤立型微動の月回数は、3,918回（6月：3,646回）とやや多い状態となりました。火山性地震の月回数は6,054回（6月：4,708回）と多い状態となりました。
- ・火山性微動の振幅は、概ね小さい状態で経過しました。
- ・火山ガス（二酸化硫黄）の1日あたりの放出量は、7月は600トン（6月：900～1,000トン）と少ない状態でした。

②と③の赤線は回数の積算を示しています。⑤～⑦は現地調査の結果を示しています。

⑥の湯だまり量は火口縁で行う現地観測の状況です。

⑦の火口底温度等は赤外熱映像装置により計測しています。




図6 阿蘇山 火山性地震の震源分布（2010年1月～2022年7月）

<7月の状況>

震源が求まった火山性地震は、中岳第一火口付近の深さ0km付近に分布しました。




図7 阿蘇山 GNSS 連続観測による基線長変化（2010年10月～2022年7月）


GNSS 連続観測では、2021年9月頃からみられていた草千里付近の深部にあるマグマだまりの膨張を示すと考えられる基線の伸びは、同年12月頃から停滞しています（④～⑦、青矢印）。

これらの基線は図8の①～⑦に対応しています。基線の空白部分は欠測を示しています。

2016年4月16日以降の基線長は、平成28年（2016年）熊本地震の影響による変動が大きかったため、この地震に伴うステップを補正しています。

2016年1月以降のデータについては、解析方法を変更しています。

（国）：国土地理院



小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
 (国)：国土地理院

図8 阿蘇山 GNSS 連続観測点と基線番号




図9 阿蘇山 観測点配置図

小さな白丸(○)は気象庁、小さな黒丸(●)は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
(京)：京都大学、(防)：防災科学技術研究所、(博)：阿蘇火山博物館、(国)：国土地理院