

吾妻山の火山活動解説資料（令和5年4月）

仙台管区气象台
地域火山監視・警報センター

大穴火口付近では、低周波地震の発生頻度が高くなっており、大穴火口方向の隆起を示す緩やかな傾斜変動も継続しています。大穴火口周辺地下の温度上昇を示唆する変化等も引き続きみられるなど、浅部の熱水活動がやや活発になっていますので、今後の火山活動の推移に留意してください。

大穴火口周辺では熱活動が継続しており、噴出現象が突発的に発生する可能性があることに留意が必要です。また、入山する際には火山ガスに注意してください。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・地震や微動の発生状況（図1-④⑤、図2-②～⑥）

今期間は、大穴火口付近の火山性地震が多い状態で経過しており、火山性地震の回数は270回（3月は845回）でした。大穴火口浅部の中でも上部における地震活動の一時的な活発化が認められました。また、低周波地震の発生頻度が2月頃からやや上がっており、4月12日からさらに高くなっています。長周期地震^{*1}は、2022年11月以降発生頻度が増加しています。

火山性微動は観測されませんでした。

※1 長周期地震とは周期が10秒程度と長い地震です。浅い領域の熱水や火山ガスが関与していると考えられます。

・地殻変動の状況（図1-③⑥、図2-①、図3、図10）

浄土平観測点（大穴火口から東南東約1km）に設置している傾斜計では、大穴火口方向の隆起を示す変化が、3月8日から一時的にやや大きくなりましたが、3月14日頃からは緩やかな変化となって継続しています。GNSS連続観測の大穴火口周辺の一部の基線では、3月上旬頃から火山活動の可能性のある伸びの変化が認められています。

GNSS連続観測の吾妻山周辺の長い基線では、吾妻山深部の膨張を示すと考えられる変化は観測されていません。

・噴気など表面現象の状況（図1-①、図4、図5）

大穴火口の噴気の高さは一時的に200mを観測しましたが、その他の期間は100m以下で経過し、大穴火口付近及びその周辺の噴気の状況に変化は認められませんでした。浄土平3監視カメラの熱映像データの解析では、地熱域の状況に大きな変化はみられませんでした。

・火山ガスの状況（図6）

大穴火口の北西に設置している火山ガス観測装置による観測では、SO₂（二酸化硫黄）とH₂S（硫化水素）の濃度比^{*2}は、2018～2019年の活動期並みの高い値で推移しています。

※2 噴気中の各種火山ガスは地下のマグマに由来するものであり、その濃度や成分毎の比率（濃度比）の変化は、火山の活動状態の指標のひとつと考えられています。

・全磁力変化の状況（図1-②、図7、図8、図11）

全磁力連続観測では、大穴火口周辺地下の温度上昇を示唆する変化が継続しています。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページで閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

次回の火山活動解説資料（令和5年5月分）は令和5年6月8日に発表する予定です。

資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国土交通省東北地方整備局、国土地理院、東北大学及び国立研究開発法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成しています。

本資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の「数値地図50mメッシュ（標高）」を使用しています。

○ 活動評価

大穴火口浅部の膨張を示す緩やかな地殻変動が 2022 年 5 月頃から 8 月下旬にかけてみられ、その後は概ね停滞していましたが、2023 年 3 月上旬から浄土平傾斜計では再び大穴火口方向の隆起を示す変化が始まり、今期間もその変化が緩やかに継続しています。また、低周波地震の発生頻度が 2 月頃からやや上がり、4 月 12 日頃からさらに高くなっています。全磁力連続観測では、大穴火口周辺地下の温度上昇を示唆する変化が継続し、火山ガスの SO₂ と H₂S の濃度比は 2018～2019 年の活動期並みの高い値で推移しています。大穴火口周辺では、浅部の熱水活動がやや活発になっていますので、今後の火山活動の推移に留意してください。




図1 吾妻山 中期的な火山活動の経過（2003年1月～2023年4月）

- ・②繰り返し観測点3及び8はそれぞれ図11の全磁力繰り返し観測点③⑧に対応しています。
- ・⑥は図10のGNSS基線③に対応しています。
- ・⑥「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」に伴うステップを補正しています。
- ・⑥高湯温泉観測点は約300m東に位置する砥石山観測点に移設しました。
- ・⑥GNSS基線長は2010年10月及び2013年1月に解析方法を変更しています。
- ▲：解析開始を示します。

2003年以降、吾妻山深部及び大穴火口浅部の膨張を示す地殻変動や地震活動の活発化を繰り返しています。

2008年から2011年にかけて、噴気・地熱活動が活発な状況でした。




図2 吾妻山 火山活動経過図（2022年1月～2023年4月）

- ・①×：融雪期には北西上りの変動がみられます。
- ・④日別地震回数に③長周期地震の回数は含まれていません。

火山性地震は今期間多い状態で経過し、大穴火口浅部の中でも上部における地震活動の一時的な活発化が認められました。また、低周波地震の発生頻度が2月頃からやや上がっており、4月12日からさらに高くなっています。長周期地震は、2022年11月以降発生頻度が増加しています。

浄土平観測点（大穴火口から東南東約1km）に設置している傾斜計では、2022年5月上旬頃から大穴火口（西）方向の隆起を示す緩やかな変化がみられていました（緑矢印）。この大穴火口（西）方向の隆起を示す変化は、2022年8月23日頃から概ね停滞していましたが、2023年3月8日から一時的にやや大きな変化に変わり、3月14日頃からは緩やかな変化となって継続しています（赤矢印）。




図3 吾妻山 吾妻山浅部・深部の地殻変動（2014年1月～2023年4月）

- ・①～⑥は図10のGNSS基線①～⑥に対応しています。
- ・空白部分は欠測を示します。
- ・(国)は国土地理院、(東)は東北大学の観測点を示します。
- ▼：解析開始を示します。
- ・大穴火口周辺の短い基線や吾妻山周辺の長い基線では、過去大穴火口浅部や吾妻山深部での火山活動に伴う変化（緑矢印）が観測されていました。

GNSS 連続観測の大穴火口周辺の短い基線（①②）では、2022年5月頃から8月下旬頃、12月頃及び3月上旬頃以降、火山活動の可能性のある伸びの変化（赤矢印）が認められています。

吾妻山周辺の長い基線（③～⑥）の一部では、2022年5月頃から吾妻山深部の膨張の可能性を示す変化（赤矢印）が観測されましたが、8月中旬頃から停滞しています（青矢印）。




図4 吾妻山 監視カメラによる大穴火口周辺の地熱域の経過（2017年8月～2023年4月）

- ・①～②は各領域の最高温度と吾妻山の南約6kmのアメダス鷲倉の気温との差を示しています。
- ・③～④は領域毎に非地熱域（黒枠）の平均温度より5℃以上高い領域の画素数を示しています。数値が大きくなるほど、地熱域の面積が拡大していることを示します。・空白部分は天候不良等による欠測を表しています。
- ・2018年10月と2019年5月の火山活動活発化の際には、地熱域の面積拡大と温度上昇がみられました（緑矢印）。
- ・2021年1月から3月頃にかけて、大穴火口周辺の一部で地熱域のわずかな温度上昇や面積拡大がみられました（橙矢印）。

2022年9月頃から11月頃にかけて、大穴火口周辺の一部の地熱域で面積のわずかな拡大（赤矢印）が認められましたが、その後は大きな変化はなく経過しています。




図5 吾妻山 大穴火口周辺の噴気の状態（4月3日）

- ・左図：東北地方整備局が設置している浄土平監視カメラ（大穴火口の東南東約500m）の映像です。
- ・右図：上野寺監視カメラ（大穴火口から東北東約14km）の映像です。

監視カメラによる観測では、今期間、大穴火口の噴気の高さは一時的に200mを観測しましたが、その他の期間は100m以下で経過し、大穴火口及びその周辺の噴気の状態に変化は認められません。




図6 吾妻山 火山ガス観測装置による観測（2015年11月～2023年4月）

- ・火山ガス観測装置では、噴気孔から流れてくる火山ガスと周辺大気の混合気体を測定しているため、測定される濃度は、風向きや大気との混合の影響を受けて増減する場合があります。一方、複数の火山ガスの濃度比はこうした影響を受けにくいいため、火山活動評価の指標として有効です。
- ・水色破線は火山ガス観測装置のセンサー交換を示し、それ以降のデータは感度補正を行っていません。水色破線以前のデータは感度補正済みです。
- ・グラフの灰色部分は欠測を表しています。
- ・季節風が強まる冬期には観測点が大穴火口の北西側にある位置関係のため観測データを得にくい状況となります。
- ・2018年5月頃から9月にかけて SO_2 と H_2S の濃度比は上昇し、その後2019年6月頃まで高い値で推移していました。（緑矢印）

火山ガス観測装置による観測では、 SO_2 と H_2S の濃度比は2022年5月頃から上昇し（赤矢印）、8月頃にかけて2018～2019年の活動期並みの高い値を示していましたが、9月頃からはやや低い値で推移していました（青矢印）。冬期は観測データが得にくい状況でしたが、2月下旬以降、 SO_2 と H_2S の濃度比は再び2018～2019年の活動期並みの高い値となっています（赤破線矢印）。




図7 吾妻山 全磁力連続観測点の全磁力値変化（2015年11月～2023年4月）

- ・各観測点の場所は図11に示しています。
- ・全磁力連続観測のデータは参照点（大穴火口の北東約6kmにある高湯観測点あるいは大穴火口の南東約16kmにある上葉木坂西観測点）で観測された全磁力値を基準とした場合の各日の00時00分から02時59分の平均値を示しています。
- ・青破線で示す観測点大穴火口4における全磁力変動は、観測機器を再設置したことによる人為的な変動です。
- ・2018年から2019年にかけて、全磁力値の変化がみられました。（緑矢印）この変化は大穴火口北西地下の温度上昇を示すと考えられます。
- ・グラフの空白部分は欠測を表しています。

全磁力連続観測では、大穴火口2と3の全磁力値は2021年12月以降増加、大穴火口4は2022年3月頃から低下しており、大穴火口周辺地下の温度上昇を示唆する変化（赤矢印）は継続しています。大穴火口5と6は2022年5月頃からやや低下し、9月以降は概ね停滞していましたが、4月上旬頃から大穴火口5ではわずかな低下がみられます。





図8 熱消磁に伴う全磁力変化のモデル



【参考】全磁力観測について

火山活動が静穏なときの火山体は地球の磁場（地磁気）の方向と同じ向きに磁化されています。これは、火山を構成する岩石には磁化しやすい鉱物が含まれており、マグマや火山ガス等に熱せられていた山体が冷えていく過程で、地磁気の方に帯磁するためです。しかし、火山活動の活発化に伴い、マグマが地表へ近づくなどの原因で火山体内の温度が上昇するにつれて、周辺の岩石が磁力を失うようになります。これを「熱消磁」と言います。そして地下で熱消磁が発生すると、地表で観測される磁場の強さ（全磁力）が変化します。これらのことから、全磁力観測により火山体内部の温度の様子を知る手がかりを得ることができます。

例えば、山頂直下で熱消磁が起きたとすると、火口の南側では全磁力の減少、火口北側では逆に全磁力の増大が観測されます。この変化は、熱消磁された部分に地磁気と逆向きの磁化が生じたと考えることで説明できます。図8に示すように、山頂部で観測した全磁力の値は、南側Aでは地磁気と逆向きの磁力線に弱められて小さく、北側Bでは強められて大きくなるのがわかります。

ただし全磁力の変化は、熱消磁によるものだけでなく、地下の圧力変化などによっても生じることがあります。





図9 吾妻山 観測点配置図

白丸（○）は気象庁、黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。

（東地）：東北地方整備局 （国）：国土地理院 （東）：東北大学 （防）：防災科学技術研究所
左図の四角囲みは右図の表示範囲を示しています。




図10 吾妻山 GNSS 観測基線図

白丸（○）は気象庁、黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 左図の四角囲みは右図の表示範囲を示しています。 （国）：国土地理院 （東）：東北大学



図11 吾妻山 全磁力観測点配置図

■：全磁力観測点（1～6） ●：全磁力繰り返し観測点（①～⑫）