

# 浅間山の火山活動解説資料（平成 25 年 1 月）

気象庁地震火山部  
火山監視・情報センター

火山活動に特段の変化はなく、山頂火口から 500m を超える範囲に影響を及ぼす噴火の兆候は認められません。ただし、山頂火口から 500m 以内に影響する程度の噴出現象は突発的に発生する可能性がありますので、火山灰噴出や火山ガス等に警戒が必要です。

平成 22 年 4 月 15 日に噴火予報を発表し、噴火警戒レベルを 2（火口周辺規制）から 1（平常）に引き下げました。その後、予報警報事項に変更はありません。

## ○ 活動概況

### ・噴煙など表面現象の状況（図 2、図 3<sup>※</sup>-①②、表 1）

山頂火口からの噴煙量に大きな変化はなく、噴煙高度は火口縁上概ね 100～300m で経過しました。

### ・地震や微動の発生状況（図 3<sup>※</sup>-⑤⑥⑦⑧、図 4<sup>※</sup>、表 1）

火山性地震はやや少ない状態で経過しました。震源はこれまで同様、山頂火口直下のごく浅い所と推定されます。

火山性微動は観測されませんでした。

### ・火山ガスの状況（図 3<sup>※</sup>-③、表 1）

今期間は火山ガス（二酸化硫黄）放出量の観測は気象条件等により実施できませんでした。

### ・地殻変動の状況（図 3<sup>※</sup>-⑨⑩）

山体周辺の GPS 連続観測では、2008 年 7 月初め頃から 2009 年夏にかけて深部へのマグマの注入を示す伸びがみられ、その後 2009 年秋頃からわずかに縮みの傾向がみられています。

傾斜観測<sup>1)</sup> 及び光波測距観測<sup>2)</sup> では特段の変化は認められませんでした。


1) 火山活動による山体の傾きを精密に観測する機器。火山体直下へのマグマの注入等による変化を観測します。

2) レーザなどを用いて山体に設置した反射鏡までの距離を測定する機器。山体の膨張や収縮による距離の変化を観測します。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページ (<http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/volcano.html>) でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（平成 25 年 2 月分）は平成 25 年 3 月 8 日に発表する予定です。

※この記号の資料は気象庁のほか、国土交通省利根川水系砂防事務所、国土地理院、東京大学、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人産業技術総合研究所及び長野県のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図 50m メッシュ（標高）』『数値地図 25000（行政界・海岸線）』を使用しています（承認番号：平 23 情使、第 467 号）。



小さな白丸(○)は気象庁、小さな黒丸(●)は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。

(国) : 国土地理院、(防) : 防災科学技術研究所、(震) : 東京大学地震研究所、

(関地) : 関東地方整備局、(長) : 長野県

図 1 浅間山 観測点配置図

GPS 基線③は図 3<sup>\*</sup>の⑨に、光波測距測線④は図 3<sup>\*</sup>の⑩にそれぞれ対応しています。



図 2 浅間山 山頂部の噴煙の状況  
(1月 29 日、追分遠望カメラによる)




図 3\* 浅間山 最近の火山活動経過図 (2002 年 1 月 1 日～2013 年 1 月 31 日)

※各図の説明は次ページに記載しています。

## 図3※の説明

- ③ 独立行政法人産業技術総合研究所及び東京大学による観測結果が含まれています。
- ④ 5ページの脚注5)を参照。
- ⑥⑦⑧ 地震の種類別（図5参照）に計数を開始した2002年6月1日からのデータを掲載。
- ⑨ 2012年8月より、防災科学技術研究所の高峰・鬼押出観測点間の基線長データに変更しました。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、データに飛びがみられます。2010年10月以降のデータについては、電離層の影響を補正する等、解析方法を改良しています。（防）は防災科学技術研究所の観測機器を示します。
- ⑩ 2013年1月より、手動観測から自動測距による観測に変更しました。




図4※ 浅間山 震源分布図（2012年2月1日～2013年1月31日）

A型地震：P,S相が明瞭で卓越周波数は10Hz前後と高周波の地震



BL型地震：P,S相が不明瞭で卓越周波数が約3Hz以下の地震



BH型地震：S相が不明瞭で卓越周波数が約3Hz以上の地震



EX型地震(爆発型)：爆発的噴火に伴って発生する地震




図5 浅間山で見られる火山性地震の特徴と波形例

表1 浅間山 2013年1月の火山活動状況

1月	噴火回数	火山性地震の回数 <sup>3)</sup>						微動回数	噴煙の状況 <sup>4)</sup>		火映強度 <sup>5)</sup>	備考
		A型	BH型	BL型	Ex型	その他	地震合計		日最高(m)	噴煙量		
1日	0	0	2	6	0	0	8	0	100	1	—	
2日	0	0	0	6	0	0	6	0	×	×	×	
3日	0	0	0	10	0	0	10	0	100	1	—	
4日	0	0	0	8	0	0	8	0	200	1	—	
5日	0	0	1	5	0	0	6	0	—	—	—	
6日	0	0	0	5	0	0	5	0	100	1	—	
7日	0	0	7	6	0	0	13	0	—	—	—	
8日	0	1	0	8	0	0	9	0	100	1	—	
9日	0	0	2	7	0	0	9	0	200	1	—	
10日	0	0	0	14	0	0	14	0	100	1	—	
11日	0	1	0	19	0	0	20	0	50	1	—	
12日	0	0	2	24	0	0	26	0	50	1	—	
13日	0	0	2	12	0	0	14	0	—	—	—	
14日	0	0	0	15	0	0	15	0	×	×	×	
15日	0	0	0	9	0	0	9	0	100	1	—	
16日	0	0	0	19	0	0	19	0	100	1	—	
17日	0	0	0	19	0	0	19	0	200	1	—	
18日	0	0	0	10	0	0	10	0	100	1	—	
19日	0	0	0	5	0	0	5	0	300	2	—	
20日	0	0	0	6	0	0	6	0	200	1	—	
21日	0	0	0	10	0	0	10	0	30	1	—	
22日	0	0	1	7	0	0	8	0	×	×	×	
23日	0	0	2	9	0	0	11	0	10	1	—	
24日	0	0	1	12	0	0	13	0	50	1	—	
25日	0	0	0	15	0	0	15	0	×	×	×	
26日	0	0	1	18	0	0	19	0	×	×	×	
27日	0	0	2	11	0	0	13	0	300	1	—	
28日	0	0	1	3	0	0	4	0	200	1	—	
29日	0	0	0	14	0	0	14	0	50	1	—	
30日	0	0	0	17	0	0	17	0	×	—	—	
31日	0	0	5	24	0	0	29	0	50	1	—	
合計	0	2	29	353	0	0	384	0				

3) 火山性地震の計数基準は石尊観測点で最大振幅  $0.1 \mu\text{m}$  以上、S-P時間3秒以内です。

火山性地震の種類は図5のとおりです。

4) 噴煙高度と噴煙量は定時観測(09時・15時)の日最大値です。噴煙量は以下の7階級で観測しています。

1:極めて少量 2:少量 3:中量 4:やや多量 5:多量 6:極めて多量

7:噴煙量6以上の大噴火。噴煙が山体を覆うぐらい多く、噴煙の高さは成層圏まで達したとみられる

—:噴煙なし ×:不明

5) 火映の強度は以下の4段階で観測しています。

0:肉眼では確認できず、高感度カメラのみ確認できる程度 1:肉眼でようやく認められる程度

2:肉眼で明らかに認められる程度

3:肉眼で非常に明るい色で異常に感じる程度

—:火映なし ×:視程不良(夜間観測できなかった場合)