

浅間山の火山活動解説資料（令和2年10月）

気象庁地震火山部
火山監視・警報センター

浅間山の西側での膨張を示すと考えられる傾斜変動は、8月中旬頃からほぼ停滞しています。GNSS連続観測では、7月頃に一部の基線でわずかな伸びの変化が見られましたが、8月頃からほぼ停滞しています。しかし、山体浅部を震源とする火山性地震は、一時的に急増するなど、増減を繰り返しながら引き続きやや多い状態です。噴煙量も6月以前と比べ増加した状態が継続しています。

浅間山では火山活動が高まっており、今後、山頂火口から概ね2km以内に影響を及ぼす小噴火の可能性あります。

山頂火口から概ね2kmの範囲では、引き続き弾道を描いて飛散する大きな噴石や火砕流に警戒してください。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

噴火時には、風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

令和2年6月25日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1（活火山であることに留意）から2（火口周辺規制）へ引き上げました。その後、警戒事項に変更はありません。

○ 活動概況

・噴煙など表面現象の状況（図1、図2-①、図3-①③、図4-①③）

山頂火口からの噴煙は白色で、火口縁上600m以下で経過しました。噴煙量は6月以前と比べ増加した状態で経過しています。

火映は2018年7月19日以降観測されていません。

・火山ガスの状況（図2-②、図3-②、図4-②）

2日、16日及び26日に実施した火山ガス観測では、二酸化硫黄放出量は1日あたり300～900トン（9月：1日あたり1800～1900トン）とやや多い状態で、6月以前と比べ増加した状態で経過しています。

・地震や微動の発生状況（図2-③～⑧、図3-④～⑧、図4-④～⑧、図5、図9）

火山性地震は、2日に振幅の小さな低周波地震（B L型）が一時的に急増するなど、増減を繰り返しながら引き続きやや多い状態で推移しました。震源は、従来から見られている山頂直下の海拔1～2km付近と山頂のやや西側の海拔0km付近に分布しました。

また、振幅の小さな火山性微動が時々発生しています。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php）でも閲覧することができます。

次回の火山活動解説資料（令和2年11月分）は令和2年12月8日に発表する予定です。

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、関東地方整備局、国土地理院、東京大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び長野県のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図50mメッシュ（標高）』『数値地図25000（行政界・海岸線）』を使用しています（承認番号：平29情使、第798号）。

・地殻変動の状況（図2-⑨、図3-⑨⑩、図4-⑨⑩、図6、図7、図8）

山頂の南側に設置した傾斜計において、6月20日頃から浅間山西側での膨張を示すと考えられる傾斜変動が見られましたが、8月中旬頃からほぼ停滞しています。

GNSS連続観測では、7月頃に一部の基線でわずかな伸びの変化が見られましたが、8月頃からほぼ停滞しています。

光波測距観測では、山体浅部の膨張を示す変化は認められません。



図1 浅間山 山頂部の状況

（上：黒斑山監視カメラ（長野県）（10月31日）下：鬼押監視カメラ（10月16日））

- ・山頂火口からの噴煙は白色で、火口縁上600m以下で経過しました。




図2 浅間山 火山活動経過図（2019年1月1日～2020年10月31日）

③に示す微小地震とは、④⑥及び図3、4の⑤⑦で示す火山性地震よりも振幅が小さく、振幅が計数基準（石尊観測点で最大振幅 $0.1 \mu\text{m}$ 以上、S-P 時間3秒以内）未滿かつ前掛西観測点の上下動成分が $0.5 \mu\text{m/s}$ 以上の地震。

赤色線は積算回数を表し、右縦軸で示す。

- ・6月20日以降、山体浅部を震源とする火山性地震が増加しました。10月は2日に振幅の小さな低周波地震が一時的に急増するなど（2日のBL型地震の日別回数は221回）、増減を繰り返しながら引き続きやや多い状態で推移しました。
- ・2日、16日及び26日に実施した火山ガス観測では、二酸化硫黄放出量は1日あたり300～900トンとやや多い状態でした。火山活動が活発化した6月以降、増加した状態が続いています。
- ・山頂の南側に設置した傾斜計において、6月20日頃から浅間山西側での膨張を示すと考えられる傾斜変動が見られましたが、8月中旬頃からほぼ停滞しています。（⑨矢印）。
- ・火山性微動は、時々発生しています。21日は、継続時間が短い火山性微動がややまとまって発生したことにより、日継続時間が長くなっています。




図3 浅間山 火山活動経過図（2002年1月1日～2020年10月31日）

図3及び図4の説明

計数基準は石尊観測点で最大振幅 $0.1\mu\text{m}$ 以上、S-P時間3秒以内、火山性地震の種類は図9のとおりです。

図3② 国立研究開発法人産業技術総合研究所及び東京大学による観測結果が含まれています。

図3③、図4③ 赤印は火映を示します。強度については、以下のとおりです。

0：肉眼では確認できず、高感度の監視カメラでのみ確認できる程度 1：肉眼でようやく認められる程度

2：肉眼で明らかに認められる程度 3：肉眼で非常に明るい色で異常に感じる程度

図3⑨、図4⑨ 2012年7月31日まで 気象庁の高峰一鬼押出観測点間の基線長（基線長 7417m）。

2012年8月1日以降 高峰（防）一鬼押出（防）観測点間の基線長。

（防）：国立研究開発法人防災科学技術研究所

2010年10月及び2016年1月に、解析方法を変更しています。




図4 浅間山 最近の火山活動経過図（2014年1月1日～2020年10月31日）

図の説明は前ページに掲載しています。

- ・ 山頂火口からの噴煙は白色で、火口縁上600m以下で経過しました。
- ・ 火山ガス観測では、二酸化硫黄の放出量は、1日あたり300～900トンとやや多い状態でした。火山活動が活発化した6月以降、増加した状態が続いています。
- ・ 火映は、2018年7月19日以降観測されていません。
- ・ 振幅の小さな火山性微動が時々発生しており、21日には多く発生しました。
- ・ 火山性地震は、2日に振幅の小さな低周波地震（BL型）が一時的に急増するなど、増減を繰り返しながら引き続き発生しています。




図5 浅間山 震源分布図（2015 年 1 月 1 日～2020 年 10 月 31 日）
・火山性地震の震源は、従来から見られている山頂直下の海拔 1 ～ 2 km 付近と山頂のやや西側の海拔 0 km 付近に分布しています。




図6-1 浅間山 GNSS 連続観測及び光波測距観測の結果

(2002年1月1日~2020年10月31日)

2010年10月及び2016年1月に、解析方法を変更しています。

(防): 国立研究開発法人防災科学技術研究所

①~⑦は図7の①~⑦にそれぞれ対応しています。

①② 追分観測点は、2016年12月に移設しており、その後、基線長に年周変化が見られています。

③ 2012年7月31日まで 気象庁の高峰-鬼押出観測点間の水平距離。

2012年8月1日以降 防災科学技術研究所の高峰-鬼押出観測点間の水平距離。

⑤⑥ 2020年5月頃からの変動は大窪沢の固有の変動であり、火山活動によるものではないと考えられます。

① ~⑦の空白部分は欠測を示します。

- ・③⑥の基線の赤破線の期間に、山頂西側のやや深いところが膨張源と考えられるわずかな伸びの変化が見られました。これは深部からのマグマ上昇を示す地殻変動と考えられています。
- ・光波測距観測では、山体浅部の膨張を示す変化は認められません。




図6-2 浅間山 GNSS 連続観測結果(2016年1月1日~2020年10月31日)

⑧⑨⑩は図 7 の⑧⑨⑩にそれぞれ対応しています。空白部分は欠測を示します。

(国): 国土地理院

- ・GNSS 連続観測では、7 月頃に⑧の基線などでわずかな伸びの変化が見られましたが、8 月頃からほぼ停滞しています。




図7 浅間山 地殻変動連続観測点配置図

(防): 国立研究開発法人防災科学技術研究所、(国): 国土地理院

GNSS 基線③は図 3、図 4 の⑨に対応しています。また、GNSS 基線①～③及び⑤～⑩は図 6 の①～③及び⑤～⑩にそれぞれ対応しています。

光波測距測線④は図3、図4の⑩、図6の④に対応しています。




図8 浅間山 塩野山観測点における傾斜データ（2015年1月1日～2020年10月31日）

データは時間平均値を使用しており、長期にわたるトレンドを補正しています。

下段は上段に比べて縦軸を拡大しています。

- ・ 山頂の南側に設置した傾斜計において、6月20日頃から浅間山西側での膨張を示すと考えられる傾斜変動が見られましたが、8月中旬頃からほぼ停滞しています。一方で、6月下旬からの変動と同じ変動方向で、短期的に北西側が上がる変動が観測されています（例えば、図下段の灰色破線丸）。
- ・ 2015年6月上旬頃からと、2016年12月以降から2018年1月にかけて、山頂西側のやや深いところが膨張源と考えられる緩やかな変化が見られました。これは深部からのマグマ上昇を示す地殻変動と考えられています。

A型地震：P,S相が明瞭で卓越周波数は10Hz前後と高周波の地震




BL型地震：P,S相が不明瞭で卓越周波数が約3 Hz以下の地震



BH型地震：S相が不明瞭で卓越周波数が約3 Hz以上の地震




EX型地震(爆発型)：爆発的噴火に伴って発生する地震



BT型地震：一定周波数の振動がゆっくりと減衰していく地震



図9 浅間山 主な火山性地震の特徴と波形例



小さな白丸(○)は気象庁、小さな黒丸(●)は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 (国)：国土地理院、(防)：防災科学技術研究所、(震)：東京大学地震研究所、
 (関地)：関東地方整備局、(長)：長野県

図10 浅間山 観測点配置図