

## 九重山の火山活動解説資料(平成30年6月)

福岡管区气象台  
地域火山監視・警報センター

火山性地震は少ない状態で経過しましたが、2017年6月頃からB型地震<sup>1)</sup>が時折発生しています。また、2014年以降、星生山北東側山腹の噴気孔群地下の温度上昇を示唆する全磁力<sup>2)</sup>の変化がみられています。これらのことから、わずかに火山活動が高まっている可能性があります。今後の火山活動に留意してください。

噴火予報(噴火警戒レベル1、活火山であることに留意)の予報事項に変更はありません。

### 活動概況

#### ・噴煙など表面現象の状況(図1、図2、図3 - )

硫黄山付近では、白色の噴煙が最高で噴気孔上300mまで上がりました(5月:200m)。

星生山北尾根に設置している赤外熱映像装置<sup>3)</sup>による観測では、熱異常域において温度の高い状態が続いています。

#### ・地震や微動の発生状況(図3 - 、図4)

火山性地震の月回数は8回(5月:19回)と少ない状態で経過しました。いずれもA型地震<sup>4)</sup>で、B型地震は観測されませんでした(5月:A型地震19回、B型地震なし)。震源が求まった火山性地震はありませんでした。

火山性微動は2006年10月以降、観測されていません。

#### ・全磁力変化の状況(図5~7)

全磁力観測では、2014年以降、星生山北東側山腹の噴気孔群地下で温度上昇を示唆する変化がみられています。

#### ・地殻変動の状況(図8、図9)

GNSS<sup>5)</sup>連続観測では、坊ガツル - 牧ノ戸峠、星生山北山腹 - 坊ガツル、星生山北山腹 - 直入Aの基線で、2012年頃から伸びの傾向が認められていましたが、2015年頃から停滞しています。

この火山活動解説資料は福岡管区气象台ホームページ(<https://www.jma-net.go.jp/fukuoka/>)や気象庁ホームページ([https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly\\_v-act\\_doc/monthly\\_vact.php](https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php))でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料(平成30年7月分)は平成30年8月8日に発表する予定です。

この資料は気象庁のほか、国土地理院、国立研究開発法人防災科学技術研究所及び大分県のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図50mメッシュ(標高)』を使用しています(承認番号:平29情使、第798号)。

- 1) 火山性地震のうち、P波、S波の相が不明瞭で、比較的周期が長く、火口周辺の比較的浅い場所で発生する地震と考えられています。火道内の火山ガスの移動やマグマの発泡など火山性流体の動きで発生すると考えられています。B型地震の増加は、山体浅部の火山活動の活発化を意味していることから発生状況には注意が必要です。
- 2) 火山体の南側で全磁力を観測した場合、全磁力値が減少すると火山体内部で温度上昇が、全磁力値が増加すると火山体内部で温度低下が生じていると推定されます。
- 3) 赤外熱映像装置は物体が放射する赤外線を感じて温度分布を測定する測器です。熱源から離れた場所から測定することができる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で実際の熱源の温度よりも低く測定される場合があります。
- 4) 火山性地震のうち、P波、S波の相が明瞭で比較的周期の短い地震で一般的に起こる地震と同様、地殻の破壊によって発生していると考えられ、マグマの貫入に伴う火道周辺の岩石破壊によって発生していることが知られています。
- 5) GNSS (Global Navigation Satellite Systems) とは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。



図1 九重山 噴煙の状況(6月7日、上野監視カメラによる)




図2-1 九重山 地熱域の状況(6月5日、星生山北尾根赤外熱映像装置による)




図2-2 九重山 星生山北尾根赤外熱映像装置による日別最高温度の7日間移動平均値  
(2016年11月～2018年6月)

A領域、C領域ともに地熱のない領域と比べて温度の高い状態が続いています。

天候不良時は観測精度が低下します。特に観測精度が低いデータは、図から取り除いています。




図3 九重山 火山活動経過図（1995年10月～2018年6月）

< 6月の状況 >

- ・硫黄山付近では、噴煙が最高で噴気孔上 300mまで上がりました（5月：200m）。
- ・火山性地震の月回数は8回（5月：19回）と少ない状態で経過しました。
- ・発生した地震はいずれもA型地震で、B型地震は観測されませんでした（5月：A型地震19回、B型地震なし）。




図4-1 九重山 震源分布図(硫黄山付近の地震)(2010年1月~2018年6月)

< 6月の状況 >

硫黄山付近に震源が求まった火山性地震はありませんでした。




図 4-2 九重山 震源分布図（広域）（2010 年 1 月～2018 年 6 月）

< 6 月の状況 >

九重山の周辺に震源が求まった火山性地震はありませんでした。





図5 九重山 全磁力繰り返し観測及び連続観測による全磁力値の変化

(上：繰り返し観測(2002年～2016年)、下：連続観測(2017年3月～2018年6月5日))

- ・繰り返し観測では、2014年以降、噴気孔群北側の観測点(MN1)で全磁力値が増加傾向(赤矢印)、噴気孔群南側の観測点(MN2)で減少傾向(青矢印)に転じています。
- ・連続観測では、噴気孔群北側の観測点(硫黄山北)で2017年10月頃より全磁力値が増加傾向(赤矢印)、噴気孔群南側の観測点(硫黄山南及び星生山東)で2017年5月頃より減少傾向(青矢印)がみられます。
- ・これらのデータから、2014年以降、星生山北東側山腹の噴気孔群地下で温度上昇を示唆する変化(熱消磁)がみられています。

繰り返し観測：星生山南西約20kmの全磁力値を基準とした場合の各観測点における全磁力変動

連続観測：星生山南東約4kmの全磁力値を基準とした場合の各観測点における全磁力日平均値




図6 九重山 全磁力観測点配置図

●は繰り返し観測点、■は連続観測点、赤破線で囲まれる領域は星生山北東側山腹の噴気孔群の位置を示します。

【参考】全磁力観測について

火山活動が静穏なときの火山体は地球の磁場(地磁気)の方向と同じ向きに磁化されています。これは、火山を構成する岩石には磁化しやすい鉱物が含まれており、マグマや火山ガス等に熱せられていた山体が冷えていく過程で、地磁気の方に帯磁するためです。しかし、火山活動の活発化に伴い、マグマが地表へ近づくなどの原因で火山体内の温度が上昇するにつれて、周辺の岩石が磁力を失うようになります。これを「熱消磁」と言います。そして地下で熱消磁が発生すると、地表で観測される磁場の強さ(全磁力)が変化します。これらのことから、全磁力観測により火山体内部の温度の様子を知る手がかりを得ることができます。

例えば、山頂直下で熱消磁が起きたとすると、火口の南側では全磁力の減少、火口北側では逆に全磁力の増大が観測されます。この変化は、熱消磁された部分に地磁気と逆向きの磁化が生じたと考えerことで説明できます。山頂部で観測した全磁力の値は、南側Aでは地磁気と逆向きの磁力線に弱められて小さく、北側Bでは強められて大きくなるのがわかります。

ただし全磁力の変化は、熱消磁によるものだけでなく、地下の圧力変化などによっても生じることがあります。




図7 熱消磁に伴う全磁力変化のモデル

火山体周辺の全磁力変化と火山体内部の温度

北側の観測点で全磁力増加  
南側の観測点で全磁力減少

[消磁]



火山体内部の温度上昇を示唆する変化

北側の観測点で全磁力減少  
南側の観測点で全磁力増加

[帯磁]



火山体内部の温度低下を示唆する変化




図8 九重山 GNSS連続観測による基線長変化(2001年3月~2018年6月)

GNSS連続観測では、坊ガツル-牧ノ戸峠、星生山北山腹-坊ガツル、星生山北山腹-直入Aの基線で、2012年頃から伸びの傾向が認められていましたが、2015年頃から停滞しています。

これらの基線は図9の ~ に対応しています。

灰色部分は機器障害による欠測を示しています。

2010年10月以降のデータについては、電離層の影響を補正する等、解析方法を改良しています。

2016年1月以降のデータについては、解析方法を変更しています。

2016年4月16日以降の基線長は、平成28年(2016年)熊本地震の影響による変動が大きかったため、この地震に伴うステップを補正しています。

(国): 国土地理院




図9 九重山 GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸( )は気象庁、小さな黒丸( )は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
(国): 国土地理院




図10 九重山 観測点配置図

小さな白丸( )は気象庁、小さな黒丸( )は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
(分): 大分県