

桜島の火山活動解説資料（令和3年1月）

福岡管区気象台
地域火山監視・警報センター
鹿児島地方気象台

南岳山頂火口では、噴火活動が続いています。弾道を描いて飛散する大きな噴石は最大で4合目（南岳山頂火口より1,300mから1,700m）まで達しました。また、噴煙は最高で火口縁上2,300mまで上がりました。

噴火活動は緩やかに活発化の傾向を示しています。また、広域のGNSS連続観測では、始良カルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部で長期にわたり供給されたマグマが蓄積された状態が継続しており、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量が多い状態が続いていることから、南岳山頂火口を中心に、噴火活動がさらに活発化する可能性があります。

南岳山頂火口及び昭和火口から概ね2kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。

風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るため注意してください。爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。なお、今後の降灰状況次第では、降雨時に土石流が発生する可能性がありますので留意してください。

平成28年2月5日に火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）を発表しました。その後、警報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴煙など表面現象の状況（図1～4、図6、図7-①②、表1）

南岳山頂火口では、噴火が21回（2020年12月：25回）発生し、このうち爆発は18回（2020年12月：18回）で、いずれも前月と同程度でした。弾道を描いて飛散する大きな噴石が最大で4合目（南岳山頂火口から1,300mから1,700m）まで達しました。また、31日07時20分に発生した爆発では、噴煙が火口縁上2,300mまで上がりました。

また、同火口では、夜間に高感度の監視カメラで火映を観測しました。

昭和火口では噴火は観測されていません。

19日に海上自衛隊第1航空群の協力により上空からの観測を実施しました。南岳山頂火口では、白色の噴煙が火口縁上200mまで上がっていました。火口内は噴煙のため確認できませんでしたが火口周辺の状況に特段の変化は認められませんでした。昭和火口では、火口内及び火口周辺の状況に特段の変化は認められませんでした。

この火山活動解説資料は福岡管区気象台ホームページ（<https://www.jma-net.go.jp/fukuoka/>）や気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php）でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（令和3年2月分）は令和3年3月8日に発表する予定です。

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

（<https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html>）

この資料は気象庁のほか、国土地理院、九州地方整備局大隅河川国道事務所、京都大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所及び鹿児島県のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図50mメッシュ（標高）』『基盤地図情報』を使用しています。

27日に島内及びその周辺で実施した現地調査では、昭和火口近傍及び南岳南東側山腹でこれまでと同様に地熱域を確認しましたが、特段の変化は認められませんでした。

・地震や微動の発生状況（図5、図7-⑤～⑦、表2）

火山性地震の月回数は117回で、前月（2020年12月：55回）と比べて増加しました。震源が求まった火山性地震は5回で、南岳直下の深さ0～2km付近及び桜島の南西側の深さ9km付近に分布しました。火山性微動の継続時間は月合計6時間36分で、前月（2020年12月：35時間21分）より減少しました。

・火山ガスの状況（図7-④）

期間内に実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は1日あたり1,500～5,000トンと概ね多い状態でした（2020年12月：1,500～2,900トン）。火山ガス（二酸化硫黄）の1日あたりの放出量は、2020年9月下旬以降は概ね多い状態となっています。

・地殻変動の状況（図8～10）

桜島島内の傾斜計及び伸縮計では、今期間は特段の変化は認められませんでした。

GNSS連続観測では、桜島島内の基線で2019年9月頃から山体の隆起・膨張に伴うと考えられるわずかな伸びが認められていましたが、2020年4月頃から停滞しています。一方、始良カルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部の膨張を示す一部の基線では、2019年9月以降伸びが認められます。始良カルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部では、長期にわたり供給されたマグマが蓄積した状態と考えられます。

・降灰の状況（図7-③、図11、表3）

鹿児島地方気象台（東郡元）では、月合計3g/m²（降灰日数：7日）¹⁾の降灰を観測しました。

鹿児島県が実施している降灰の観測データから推定した火山灰の2020年12月の総噴出量は、約9万トン（2020年11月：約4万トン）でした。

1) 鹿児島地方気象台（東郡元：南岳の西南西約11km）における前日09時～当日09時に降った1m²あたりの降灰量です。



図 1-1 桜島 1月31日07時20分の南岳山頂火口の爆発の状況（牛根監視カメラ）
噴火に伴う噴煙が火口縁上2,300mまで上がりました。



図 1-2 桜島 1月18日23時09分の南岳山頂火口の爆発の状況（牛根監視カメラ）
弾道を描いて飛散する大きな噴石が最大で4合目（南岳山頂火口から1,300mから1,700m）まで達しました（赤矢印）。




図 2-1 桜島 昭和火口近傍及び南岳南東側山腹の状況（垂水市海潟から観測）

赤外熱映像装置による観測では、昭和火口近傍（橙破線内）及び南岳南東側山腹（白破線内）でこれまでと同様に地熱域を確認しました。




図 2-2 桜島 昭和火口近傍及び周辺の状況（鹿児島市黒神町から観測）

赤外熱映像装置による観測では、昭和火口内壁の一部（赤破線内）及び昭和火口近傍（橙破線内）にこれまでと同様に地熱域を確認しました。




図3 桜島 上空から観測した南岳山頂火口及び昭和火口周辺の状況（桜島南東側上空から撮影）

- ・南岳山頂火口では、噴煙のため火口内は確認できませんでしたが、火口周辺の状況に特段の変化は認められませんでした。
- ・昭和火口では、火口内及び火口周辺の状況に特段の変化は認められませんでした。



図4 桜島 図2、図3の観測位置及び撮影方向




図5 桜島 震源分布図（2015年1月～2021年1月）

< 1月の状況 >

震源が求まった火山性地震は5回で、南岳直下の深さ0～2km付近及び桜島の南西側の深さ9km付近に分布しました。




図 6-1 桜島 南岳山頂火口（上図）と昭和火口（下図）の月別爆発回数
（1955年1月～2021年1月）

< 1月の状況 >

- ・南岳山頂火口では、爆発が18回発生しました（2020年12月：18回）。
- ・昭和火口では、爆発は発生していません（2020年12月：なし）。




図 6-2 桜島 南岳山頂火口（上図）と昭和火口（下図）の月別噴火回数と月別爆発回数
（2006年6月～2021年1月）

< 1月の状況 >

- ・南岳山頂火口では、噴火が21回発生しました（2020年12月：25回）。
- ・昭和火口では、噴火は観測されていません（2020年12月：なし）。




図7 桜島 最近2年間の活動経過図（2019年2月～2021年1月）

< 1月の状況 >

- ・南岳山頂火口では、噴火が21回発生し、このうち爆発は18回でした。噴煙は最高で火口縁上2,300mまで上がりました。また、同火口では、夜間に火映を観測しています。
- ・昭和火口では、噴火は観測されていません。
- ・鹿児島地方気象台（東郡元）では、月合計3g/m²（降灰日数：7日）の降灰を観測しました。
- ・火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、1日あたり1,500～5,000トンと概ね多い状態でした（2020年12月：1,500～2,900トン）。
- ・火山性地震の月回数は117回で、前月（2020年12月：55回）と比べて増加しました。
- ・火山性微動の継続時間は月合計6時間36分で、前月（2020年12月：35時間21分）より減少しました。

*「あみだ川及び横山観測点」で計数（計数基準 あみだ川：水平動2.5μm/s以上 横山：水平動1.0μm/s以上）

- 1) 火山性地震のうち、A型地震はP波やS波の相が明瞭で比較的周期の短い地震で、一般的に起こる地震と同様、応力集中による地殻の破壊によって発生していると考えられますが、火山活動に直接関係する発生原因として、マグマの貫入に伴う火道周辺の岩石破壊などの例があります。
- 2) 火山性地震のうち、B型地震は相が不明瞭で、比較的周期が長い地震で、火道内のガスの移動やマグマの発泡などにより発生すると考えられています。




図8 桜島 傾斜計及び伸縮計による地殻変動の状況（2021年1月）

桜島島内の傾斜計及び伸縮計では、一部の噴火に伴い、噴火前のわずかな山体の隆起・膨張、噴火後のわずかな沈降・収縮が観測されました。

※あみだ川傾斜計火口方向の傾斜変動には、 -1.2×10^{-8} rad/dayのトレンドの補正を行っています。
 ※図の作成には、大隅河川国道事務所の有村観測坑道及び京都大学のハルタ山観測坑道の観測データを使用しています。




図 9-1 桜島 GNSS 連続観測による基線長変化（2010 年 10 月～2021 年 1 月）

始良カルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部の膨張を示す一部の基線では、2019 年 9 月以降伸びが認められます（赤矢印）。始良カルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部では、長期にわたり供給されたマグマが蓄積した状態と考えられます。

これらの基線は図 10 の①～⑥に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。

2012 年 1 月以降のデータについては、解析方法を変更しています。

基線①～⑤については、国土地理院の解析結果（F3 解及び R3 解）を使用しました。

基線②は霧島山の深い場所での膨張によるとみられる変動の影響を受けている可能性があります（黒破線矢印）。

基線⑥は山体を挟まないため、基線長の伸びは山体の収縮を示しています。

青色の破線内は 2015 年 8 月の急激な山体膨張による変動です。

（国）：国土地理院




図9-2 桜島 GNSS 連続観測による基線長変化 (2010年10月～2021年1月)

桜島島内の基線において、2019年9月頃から山体の隆起・膨張に伴うと考えられるわずかな伸びが認められていましたが（赤矢印）、2020年4月頃から停滞しています。

これらの基線は図10の⑦～⑪に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。

2012年1月以降のデータについては、解析方法を変更しています。

青色の破線内は2015年8月の急激な山体膨張による変動です。

(国)：国土地理院




図 9-3 桜島 GNSS 連続観測による基線長変化（2010 年 10 月～2021 年 1 月）

桜島島内の基線において、2019 年 9 月頃から山体の隆起・膨張に伴うと考えられるわずかな伸びが認められていましたが（赤矢印）、2020 年 4 月頃から停滞しています。

これらの基線は図 10 の⑫～⑯に対応しています。
 基線の空白部分は欠測を示しています。
 2012 年 1 月以降のデータについては、解析方法を変更しています。
 青色の破線内は 2015 年 8 月の急激な山体膨張による変動です。
 橙破線内の変動は、瀬戸 2 観測点固有の変動と考えられます。
 (国)：国土地理院




図10 桜島 GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸 (○) は気象庁、小さな黒丸 (●) は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 (国) : 国土地理院




図 11 桜島 鹿児島県が実施している降灰の観測データから推定した火山灰の総噴出量
 (上段：1980年1月～2020年12月の年別値、下段：2009年1月～2020年12月の月別値)

2020年12月の総噴出量は、約9万トン（2020年11月：約4万トン）でした。

※鹿児島県の降灰観測データをもとに鹿児島地方気象台で解析して作成しました。
 ※降灰の観測データには、風により巻き上げられた火山灰が含まれている可能性があります。

表 1 桜島 最近1年間の月別噴火回数と月別爆発回数（2020年2月～2021年1月）

2020年		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	合計
南岳山頂 火口	噴火回数	129	26	51	51	28	0	1	7	2	8	25	21	349
	爆発回数	67	10	14	24	16	0	1	0	0	6	18	18	174
昭和 火口	噴火回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	爆発回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桜島では、爆発地震を伴い、爆発音、体を感じる空気の振動、噴石の火口外への飛散、または、気象台や島内の観測点で一定基準以上の空気の振動のいずれかを観測した場合に爆発としています。

表 2 桜島 最近1年間の月別地震回数と月別微動時間（2020年2月～2021年1月）

2020年	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	合計
地震回数	524	419	279	188	166	37	110	50	25	54	55	117	2,024
微動継続時間の合計(時)	38	32	9	9	35	4	0	9	1	0	35	6	189

微動時間は分単位切捨て。「0」は1時間未満の微動を観測したことを、「-」は微動を全く観測しなかったことを表します。

表 3 桜島 最近1年間の鹿児島地方気象台での月別降灰量と降灰日数（2020年2月～2021年1月）

2020年	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	合計
降灰量 (g/m ²)	21	3	0	19	71	-	0	2	2	5	14	3	140
降灰日数	14	8	2	8	9	0	1	4	6	11	4	7	74

鹿児島地方気象台（東郡元：南岳の西南西約11km）における前日09時～当日09時に降った1m²あたりの降灰量です。

降灰量は0.5g/m²未満切捨て。「0」は0.5g/m²未満のわずかな降灰を観測したことを、「-」は降灰を全く観測しなかったことを表します。




図 12 桜島 観測点配置図

小さな白丸 (○) は気象庁、小さな黒丸 (●) は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 (国) : 国土地理院、(大) : 大隅河川国道事務所、(京) : 京都大学
 (鹿) : 鹿児島大学、(防) : 防災科学技術研究所