

霧島山の火山活動解説資料（令和 7 年 8 月）

福岡管区气象台

地域火山監視・警報センター

鹿児島地方气象台

えびの高原（硫黄山）周辺

硫黄山では、活発な噴気活動が続いています。硫黄山付近の浅いところを震源とする火山性地震は少ない状態で経過しました。

硫黄山では、現時点では噴火の兆候は認められませんが、活火山であることから、現在活発な噴気活動がみられている硫黄山火口内、及び硫黄山の西側 500m の噴気地帯から概ね 100m の範囲では、熱水・熱泥等が飛散する可能性がありますので注意してください。また、火山ガスにも注意が必要です。

地元自治体等が行う立ち入り規制に従うとともに、火口周辺や噴気孔の近くにはとどまらないでください。

噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴気など表面現象の状況（図 1～3、図 4-①②）

監視カメラによる観測では、硫黄山の南側の噴気地帯で噴気が最高で 400m 以上に上がるなど、活発な噴気活動が続いています。同噴気地帯では、噴気孔からの熱水の流出は確認されず、地熱域の分布にも特段の変化は認められませんでした。硫黄山の西側 500m 付近の噴気地帯では、噴気は観測されませんでした。

5 日に韓国岳 4 合目から現地調査を実施しました。硫黄山の火口南東側～南側斜面、及び南側の噴気地帯の噴気の状況や地熱域の分布は、前回の観測（6 月 28 日）と比較して特段の変化は認められませんでした。また、硫黄山の西側 500m 付近（2018 年 4 月 26 日の噴火場所）では噴気及び地熱域は確認されませんでした。

・ 地震や微動の発生状況（図 4-③④⑤、図 5）

硫黄山付近の浅いところを震源とする火山性地震は少ない状態で経過しました。火山性地震の月回数は 123 回で、前月（7 月：23 回）と比較して増加しました。火山性微動は 2023 年 7 月 8 日以降観測されていません。

えびの高原周辺（韓国岳～韓国岳北東側周辺及び大浪池周辺）では、火山性地震の月回数は 75 回で、前月（7 月：49 回）と比較して増加しました。

震源の求まった火山性地震は、主に韓国岳北東付近の深さ 1～4 km 付近に分布しました。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページでも閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

次回の火山活動解説資料（令和 7 年 9 月分）は令和 7 年 10 月 8 日に発表する予定です。

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国土地理院、東京大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、宮崎県及び鹿児島県のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図 50m メッシュ（標高）』及び『電子地形図（タイル）』を使用しています。

・地殻変動の状況（図4-⑥、図6、図7）

GNSS 連続観測では、硫黄山近傍の基線において、2023 年 5 月頃から硫黄山の山体浅部における膨張を示すと考えられるわずかな伸びがみられていましたが、同年 11 月頃から停滞しています。

・全磁力変化の状況（図8）

全磁力観測では、観測を開始した 2016 年 2 月以降、硫黄山北側の観測点で全磁力の増加、南側の観測点で全磁力の減少といった、硫黄山周辺の地下での熱の高まりを示す変化が観測されています。



図 1-1 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山付近の状況
（8 月 25 日、えびの高原監視カメラ）

硫黄山の南側の噴気地帯では、噴気が最高で 400m 以上に上がるなど、活発な噴気活動が続いています。




図 1-2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山南側の状況
（8 月 27 日、硫黄山南監視カメラ）

硫黄山の南側の噴気地帯では、噴気孔からの熱水の流出は確認されず、地熱域の分布にも特段の変化は認められませんでした。



図2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺）図3の観測位置及び撮影方向




図3 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山の火口及びその周辺の状況
（韓国岳4合目から観測）

- ・硫黄山の火口南東側～南側斜面の地熱域、及び南側の噴気地帯では、前回の観測（6月28日）と比較して噴気の状態や地熱域の分布に特段の変化は認められませんでした。
- ・硫黄山の西側500m付近（2018年4月26日の噴火場所）では噴気及び地熱域は確認されませんでした。




図4 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 火山活動経過図（2022年1月～2025年8月）

< 8月の状況 >

- ・監視カメラによる観測では、硫黄山の南側の噴気地帯で噴気が最高で400m以上に上がるなど、活発な噴気活動が続いています。硫黄山の西側500m付近の噴気地帯では、噴気は観測されませんでした。
- ・硫黄山付近の浅いところを震源とする火山性地震は少ない状態で経過しました。火山性地震の月回数は123回で、前月（7月：23回）と比較して増加しました。
- ・えびの高原周辺（韓国岳～韓国岳北東側周辺及び大浪池周辺）では、火山性地震の月回数は75回で、前月（7月：49回）と比較して増加しました。
- ・火山性微動は2023年7月8日以降観測されていません。
- ・GNSS連続観測では、硫黄山近傍の基線において、2023年5月頃から硫黄山の山体浅部における膨張を示すと考えられるわずかな伸びがみられていましたが（赤矢印）、同年11月頃から停滞しています（青矢印）。

⑥の基線は図7の②に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。

⑥の緑色破線内の変化は地面の凍上の影響、橙色破線内の変化は台風等の気象要因によるものと考えられます。




図5 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 震源分布図（2017年1月～2025年8月）

< 8月の状況 >

震源の求まった火山性地震は、主に韓国岳北東付近の深さ1～4 km 付近に分布しました。

※2018年10月は、観測点の障害により、硫黄山近傍で震源が求まらなかった期間があります。




図6 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） GNSS 連続観測による基線長変化（2018年3月～2025年8月）

GNSS 連続観測では、硫黄山近傍の基線において、2023年5月頃から硫黄山の山体浅部における膨張を示すと考えられるわずかな伸びがみられていましたが（赤矢印）、同年11月頃から停滞しています（青矢印）。

これらの基線は図7の①～⑤に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。

緑色の破線内の変化は地面の凍上の影響、橙色の破線内の変化は台風等の気象要因の影響と考えられます。

②③⑤の基線において2021年1月及び同年12月頃から2022年3月頃にかけて認められる変化（緑矢印）は、硫黄山南西観測点の局所的な変動によるものと考えられます。

図上部の黒三角及び橙破線は、2018年4月19日及び26日の噴火の発生を示しています。




図7 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 図4及び図6のGNSS連続観測点と基線番号

白丸（○）は気象庁の観測点位置を示しています。



図 8-1 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 全磁力観測点配置図

2016 年 2 月の観測開始以降の各観測点の全磁力の変化傾向（図 8-2 の変化傾向）を「■（増加傾向）」「■（減少傾向）」「■（傾向なし、またはデータ不足等により傾向不明）」でそれぞれ示しています。



図 8-2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 全磁力観測点で観測された全磁力変動
(2016 年 1 月～2025 年 8 月)

観測開始（2016 年 2 月）以降、硫黄山の北側の観測点で全磁力の増加（赤矢印）、南側の観測点では全磁力の減少（青矢印）といった、硫黄山周辺の地下での熱の高まりを示す変化が観測されています。

各観測点と地磁気観測所鹿屋観測施設（硫黄山の南約 60km）の全磁力差分値のうち、電離層の影響が小さくなる夜間の平均値（00:00～02:59（JST））を求め、日値としてプロットしています。

図上部の黒三角及び橙破線は、2018 年 4 月 19 日及び 26 日の噴火の発生を示しています。

空白部分は欠測を示しています。

硫黄山北東 2 観測点で 2025 年 1 月頃から 3 月頃にみられる変動（緑色の破線内）は、観測点近傍での掘削工事によるものと考えられます。

【参考】全磁力観測について

火山活動が静穏なときの火山体は地球の磁場（地磁気）の方向と同じ向きに磁化されています。これは、火山を構成する岩石には磁化しやすい鉱物が含まれており、マグマや火山ガス等に熱せられていた山体が冷えていく過程で、地磁気の方に帯磁するためです。しかし、火山活動の活発化に伴い、マグマが地表へ近づくなどの原因で火山体内の温度が上昇するにつれて、周辺の岩石が磁力を失うようになります。これを「熱消磁」と言います。そして地下で熱消磁が発生すると、地表で観測される磁場の強さ（全磁力）が変化します。これらのことから、全磁力観測により火山体内部の温度の様子を知る手がかりを得ることができます。

例えば、火口直下で熱消磁が起きたとすると、火口の南側では全磁力の減少、火口北側では逆に全磁力の増大が観測されます。この変化は、熱消磁された部分に地磁気と逆向きの磁化が生じたと考えることで説明できます。火口周辺で観測した全磁力の値は、南側Aでは地磁気と逆向きの磁力線に弱められて小さく、北側Bでは強められて大きくなるのがわかります（図8-3）。

ただし全磁力の変化は、熱消磁によるものだけでなく、地下の圧力変化などによっても生じることがあります。




図8-3 熱消磁に伴う全磁力変化のモデル

火山体周辺の全磁力変化と火山体内部の温度

観測点の全磁力変化	地下の岩石の磁化	火山体内の温度変化
北側で 増加 南側で 減少	消磁	上昇
北側で 減少 南側で 増加	帯磁	低下

大幡池

火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。

活火山であることから、規模の小さな噴出現象が突発的に発生する可能性がありますので、留意してください。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴煙など表面現象の状況（図1、図2-①）

監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。

・ 地震や微動の発生状況（図2-②、図3）

火山性地震の月回数は1回でした（7月：5回）。

火山性微動は観測されませんでした。

・ 地殻変動の状況（図4、図5）

GNSS 連続観測では、一部の基線で 2025 年 1 月頃から新燃岳付近の地下の膨張を示すと考えられるわずかな伸びが認められましたが、7月上旬頃から停滞しています。



図1 霧島山（大幡池） 大幡池及び大幡山の状況（8月27日、八久保監視カメラ）

監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。




図2 霧島山（大幡池） 火山活動経過図（2017年1月～2025年8月）

< 8月の状況 >

- ・監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。
- ・火山性地震の月回数は1回でした（7月：5回）。

大幡池付近の火山性地震の回数について、2020年12月31日までは「新燃岳南西観測点（計数基準 水平動： $2.0 \mu\text{m/s}$ ）」で計数していましたが、大幡池付近の地震活動をより正確に捉えるため、2021年1月から「大幡山登山口観測点（計数基準：南北成分： $6.0 \mu\text{m/s}$ ）」で計数しています。




図3 霧島山（大幡池） 震源分布図（2017年1月～2025年8月）

< 8月の状況 >

震源の求まった火山性地震はありませんでした。

霧島山（大幡池）の火山活動については、主に大幡池及び大幡山付近（青破線内）の地震活動に注目して監視しています。大幡池及び大幡山付近では、新燃岳の火山活動が活発であった2018年3月から7月にかけて火山性地震の増加がみられたことがあります。

大幡池の北西側の地震（黒破線内）は、えびの高原周辺の地震として計数しています。




図4 霧島山（大幡池） GNSS 連続観測による基線長変化（2017年1月～2025年8月）

GNSS 連続観測では、一部の基線で 2025 年 1 月頃から新燃岳付近の地下の膨張を示すと考えられるわずかな伸びが認められましたが（赤矢印）、7 月上旬頃から停滞しています。

これらの基線は図 5 の①～④に対応しています。


直近のデータは白丸で示しています。基線の空白部分は欠測を示しています。

青色の破線内の変化は、霧島山夷守台(防)観測点の局所的な変化に伴うものと考えられます。

紫色の破線内の変化は、韓国岳観測点の局所的な変化に伴うものと考えられます。

橙色の破線内の変化は、2024 年 8 月 8 日の日向灘の地震による変動です。

（防）：防災科学技術研究所



小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。

（防）：防災科学技術研究所

図5 霧島山（大幡池） GNSS 連続観測点と基線番号

新燃岳

新燃岳では、6 月下旬から噴火活動が継続しています。前月（7 月）と比較して、今期間は噴火の発生間隔が長い傾向が認められましたが、噴煙が高く上がる日がありました。噴煙の高さは最高で 28 日に火口縁上 5,500m まで上がりました。産業技術総合研究所の分析によると、7 月 2 日頃以降の火山灰には、今回新たに供給されたマグマの可能性がある粒子が少量含まれていました。

火山ガス（二酸化硫黄）の 1 日あたりの放出量は概ね多い状態で経過しました。

2024 年 10 月下旬頃から火口直下を震源とする火山性地震が増減を繰り返しており、概ね多い状態で経過しました。8 月上旬からは火山性微動の発生頻度が低下しました。

GNSS 連続観測では、霧島山を挟む一部の基線で、2025 年 3 月頃から霧島山深部の膨張を示すと考えられるわずかな伸びが認められていましたが、7 月上旬頃からは停滞しています。

弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね 3 km まで、火砕流が概ね 2 km まで達する可能性があります。そのため、新燃岳火口から概ね 3 km の範囲では警戒してください。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

2011 年と同様に爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

令和 7 年 6 月 23 日に火口周辺警報（噴火警戒レベル 3、入山規制）を発表しました。その後、警報事項変更はありません。

○ 活動概況

・噴煙など表面現象の状況（図 1～図 4、図 6-①②）

新燃岳では、6 月下旬から噴火活動が継続しています。前月（7 月）と比べると、今期間は噴火の発生間隔が長い傾向が認められましたが、噴煙が高く上がる日がありました。10 日 05 時 23 分の噴火では、噴煙が火口縁上 3,000m 以上に上がりました。28 日 04 時 53 分の噴火では、噴煙は火口縁上 5,500m まで上がりました。新燃岳で噴煙が 5,000m 以上に上がったのは、7 月 3 日以来です。なお、期間を通して、監視カメラにより大きな噴石の飛散は確認されませんでした。

新燃岳西側斜面の割れ目付近における噴煙の高さは、期間を通して 100m 以下で経過しました。

5 日に韓国岳から実施した現地調査では、火口内の北東側及び南東側から白色の噴煙が火口縁上 100m まで上がり北東に流れていることを確認しました。前回（6 月 28 日）の観測と比較して、火口内北東側からの噴煙の量が減少していることを確認しました。新燃岳西側斜面の割れ目付近では、前回の観測と比較して、地熱域がわずかに縮小していることを確認しました。

28 日 04 時 53 分の噴火を受けて同日実施した現地調査では、新燃岳の南側で降灰を確認し、鹿児島県霧島市及び宮崎県都城市のそれぞれ一部では、道路の白線が見えにくくなるほどのやや多量の降灰を確認しました。また、同日実施した聞き取りによる降灰調査では、鹿児島県霧島市、曾於市、鹿屋市、宮崎県都城市のそれぞれ一部で降灰を確認しました。

・地震や微動の発生状況（図 5、図 6-④⑤⑥、図 7）

新燃岳では、2024 年 10 月下旬頃から火口直下を震源とする火山性地震が増減を繰り返しており、今期間は概ね多い状態で経過しました。火山性地震の 8 月の合計回数は 1,453 回（7 月：1,491 回）でした。震源が求まった火山性地震は、主に新燃岳火口直下の深さ 0～1 km 付近に分布しま

した。

また、7月上旬頃からは噴火活動の活発化とともに噴火に伴う火山性微動が断続的に発生しましたが、8月上旬からはその発生頻度が低下しました。

・火山ガスの状況（図 6-③）

6 日、10 日及び 12 日に山麓で実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の 1 日あたりの放出量は 500 トン～2,800 トン（7 月：600 トン～1,600 トン）と概ね多い状態で経過しました。

・地殻変動の状況（図 6-⑦、図 8～図 10）

GNSS 連続観測では、霧島山を挟む一部の基線で、2024 年 11 月頃から新燃岳付近の地下、2025 年 3 月頃から霧島山深部の膨張を示すと考えられるわずかな伸びが認められていましたが、7 月上旬頃からはいずれも停滞しています。

新燃岳近傍の傾斜計では、新燃岳の噴火に伴い、山体の収縮を示すと考えられる傾斜変動が時々みられました。10 日や 28 日においても噴火に伴い同様の変動がみられました。

・噴火に伴う火山灰について

産業技術総合研究所（※）によると、6 月 22 日以降の噴火活動に伴う火山灰は、いずれも新燃岳山頂火口内の既存の溶岩（2011 年や 2018 年の溶岩等）が吹き飛ばされたものが主であるものの、7 月 2 日頃以降の火山灰には、今回新たに供給されたマグマの可能性がある粒子が少量含まれていました。8 月 28 日の噴火に伴う火山灰では、そのような粒子の割合が全体の 1 割程度とやや増加していました。

※産業技術総合研究所・地質調査総合センター「霧島山新燃岳 2025 年噴火に関する調査結果」

<https://www.gsj.jp/hazards/volcano/kirishima/index.html>



図 1-1 霧島山（新燃岳） 新燃岳火口の噴煙の状況（8 月 10 日、高原西麓監視カメラ）

10 日 05 時 23 分の噴火では、噴煙が火口縁上 3,000m 以上に上がりました。



図 1-2 霧島山（新燃岳） 噴火に伴う噴煙の状況

（左図：高原西麓監視カメラ、右図：八久保監視カメラ）

28 日 04 時 53 分の噴火では、噴煙は火口縁上 5,500m まで上がりました。




図 2 霧島山（新燃岳） 図 3、図 4 の観測位置及び撮影方向




図 3-1 霧島山（新燃岳） 新燃岳火口周辺の状況（韓国岳山頂付近からの観測）

- ・ 5 日に韓国岳から実施した現地調査では、火口内の北東側及び南東側から白色の噴煙が火口縁上 100m まで上がり、北東に流れていることを確認しました。前回（6 月 28 日）の観測と比較して、火口内北東側からの噴煙の量が減少していることを確認しました。
- ・ 新燃岳西側斜面の割れ目付近では、前回の観測と比較して、地熱域（黄丸）がわずかに縮小していることを確認しました。




図 3-2 霧島山（新燃岳） 新燃岳北側斜面の状況（韓国岳山頂付近からの観測）
 前回（6 月 28 日）の観測で確認された北側斜面の熱域は、今回は確認されませんでした。



図 4-1 霧島山（新燃岳） 鹿児島県霧島市の降灰状況

28 日に実施した現地調査では、鹿児島県霧島市及び宮崎県都城市のそれぞれ一部で降灰を確認し、道路の白線が見えにくくなるほどのやや多量の降灰を確認しました。小さな噴石は確認されませんでした。




図 4-2 霧島山（新燃岳） 降灰分布図（2025 年 8 月 28 日）

28 日に実施した現地調査及び聞き取りによる降灰調査では、鹿児島県霧島市、曾於市、鹿屋市、宮崎県都城市のそれぞれ一部で降灰を確認しました。




図 5 霧島山（新燃岳） 火山性地震の日別回数（上段）及び火山性微動の日積算時間（下段）
（2025 年 6 月 1 日～8 月 31 日）

新燃岳では、6 月 22 日から火口直下を震源とする火山性地震が急増しました。その後、7 月上旬頃からは噴火活動の活発化とともに噴火に伴う火山性微動が断続的に発生しましたが、8 月上旬からはその発生頻度が低下しました。




図 6-1 霧島山（新燃岳） 火山活動経過図（2017 年 1 月～2025 年 8 月）

⑦の基線は図 10 の基線⑦に対応しています。

⑦の基線の直近の 8 月中旬以降のデータ（赤破線内）は速報的な解析結果であり、再解析により修正されることがあります。

⑦の橙色破線内の変化は、日向灘の地震（2024 年 8 月 8 日、2025 年 1 月 13 日）による変動です。

※新燃岳南西観測点の機器障害により、新燃西（震）観測点、霧島南（震）観測点及び高千穂河原観測点で計数している期間があります。




図 6-2（前ページ） 霧島山（新燃岳） 火山活動経過図（2023 年 9 月～2025 年 8 月）

< 8 月の状況 >

- ・新燃岳火口では、噴煙が最高で火口縁上 5,500mまで上がりました。新燃岳西側斜面の割れ目付近では白色の噴気の高さは期間を通して 100m以下で経過しました。
- ・火山ガス（二酸化硫黄）の 1 日あたりの放出量は 500 トン～2,800 トン（7 月：600 トン～1,600 トン）と概ね多い状態で経過しました。
- ・新燃岳では、2024 年 10 月下旬頃から火口直下を震源とする火山性地震が増減を繰り返しており、多い状態で経過しました。6 月 22 日から火口直下を震源とする火山性地震が急増し、7 月上旬頃から噴火活動の活発化とともに継続時間の長い火山性微動が断続的に観測されていました。8 月上旬からは火山性微動の発生頻度が低下しました。火山性地震の 8 月の合計回数は 1,453 回（7 月：1,491 回）でした。
- ・GNSS 連続観測では、霧島山を挟む一部の基線で、2025 年 3 月頃から霧島山深部の膨張を示すと考えられるわずかな伸びが認められていましたが（赤矢印）、7 月上旬頃からは停滞しています。

⑦の基線は図 10 の基線⑦に対応しています。

⑦の基線の直近の 8 月中旬以降のデータ（赤破線内）は速報的な解析結果であり、再解析により修正されることがあります。

⑦の橙色破線内の変化は、日向灘の地震（2024 年 8 月 8 日、2025 年 1 月 13 日）による変動です。

※新燃岳南西観測点の機器障害により、新燃西（震）観測点、霧島南（震）観測点及び高千穂河原観測点で計数している期間があります。




図 7 霧島山（新燃岳） 震源分布図（2017 年 1 月～2025 年 8 月）

< 8 月の状況 >

震源が求まった火山性地震は、主に新燃岳火口直下の深さ 0～1 km 付近に分布しました。

※観測点の障害により、震源が求まらなかった期間があります。




図8 霧島山（新燃岳） 傾斜計による地殻変動の状況（分値）（8月1日～8月31日）

新燃岳近傍の傾斜計では、新燃岳の噴火に伴い、山体の収縮を示すと考えられる傾斜変動が時々みられました。10日や28日においても噴火に伴い同様の変動がみられました（水色矢印）。赤矢印①は、噴煙が火口縁上3,000m以上に上がった10日05時23分の噴火を、赤矢印②は、噴煙が火口縁上5,500mまで上がった28日04時53分の噴火を示します。なお、まとまった降水の際には、傾斜変動にその影響が含まれていると考えられます。

各観測点の成分名に付記された「補」の文字は、そのデータが潮汐補正済みであることを示しています。




図 9 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測による基線長変化（2017 年 1 月～2025 年 8 月）

GNSS 連続観測では、2024 年 11 月頃から、霧島山を挟む一部の基線で新燃岳付近の地下の膨張を示すと考えられるわずかな伸びが認められましたが（赤矢印）、7 月上旬頃から停滞しています。

これらの基線は図 10 の①～⑥に対応しています。

直近の 8 月中旬以降のデータ（赤破線内）は速報的な解析結果であり、再解析により修正されることがあります。

基線の空白部分は欠測を示しています。

緑色破線内の変化は、新床観測点周囲の環境の変化に伴う影響と考えられます。

水色破線内の変化は、新床観測点のセンサー台交換による局所的な変動による影響と考えられます。

橙色破線内の変化は、2024 年 8 月 8 日の日向灘の地震による変動です。




図 10 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
（国）：国土地理院、（防）防災科学技術研究所

御 鉢

火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。

活火山であることから、火口内でごく少量の火山灰等を噴出する規模の小さな現象が突発的に発生する可能性がありますので注意してください。

地元自治体等が行う立入規制等に留意してください。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴煙など表面現象の状況（図1、図3-①）

監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。

・ 地震や微動の発生状況（図2、図3-②～⑤）

火山性地震は観測されませんでした（7月：なし）。

火山性微動は2018年2月10日以降、観測されていません。

・ 地殻変動の状況（図4、図5）

GNSS 連続観測では、御鉢を挟む基線には、特段の変化は認められません。



図1 霧島山（御鉢） 御鉢の状況（8月26日、猪子石監視カメラ）

監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。




図2 霧島山（御鉢） 震源分布図（2017年1月～2025年8月）

< 8月の状況 >

火山性地震は観測されませんでした。




図3 霧島山（御鉢） 火山活動経過図（2003年1月～2025年8月）

< 8月の状況 >

- ・監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。
- ・火山性地震は観測されませんでした（7月：なし）。
- ・火山性微動は2018年2月10日以降、観測されていません。

＊「高千穂峰2観測点、高千穂西（震）観測点及び高千穂河原観測点」で計数
 （計数基準 高千穂峰2：上下動2.0 $\mu\text{m/s}$ 以上、高千穂西（震）：水平動東西成分または上下動1.3 $\mu\text{m/s}$ 以上、高千穂河原：水平動南北成分または上下動1.0 $\mu\text{m/s}$ 以上）

2022年8月21日から11月17日まで、及び2023年8月24日以降高千穂峰2観測点は障害のため、高千穂河原観測点で計数しています。




図4 霧島山（御鉢） GNSS 連続観測による基線長変化（2017年1月～2025年8月）

GNSS 連続観測では、御鉢を挟む基線には、特段の変化は認められません。

これらの基線は図5の①～③に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。





図5 霧島山（御鉢） GNSS 連続観測点と基線番号



霧島山 観測点配置図

小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 （国）：国土地理院、（震）：東京大学地震研究所、（九）：九州大学、（鹿大）：鹿児島大学、
 （防）：防災科学技術研究所、（宮）：宮崎県、（鹿）：鹿児島県