

伊豆大島の火山活動解説資料（令和2年4月）

気象庁地震火山部
火山監視・警報センター

地殻変動観測によると、短期的な膨張と収縮を繰り返しながら、長期的には地下深部へのマグマ供給によると考えられる島全体の膨張傾向があります。ただちに噴火が発生する兆候は認められませんが、長期的には山体の膨張があることから、今後の火山活動の推移に注意してください。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

活動概況

・噴気など表面現象の状況（図1 - 、図2 - 、図5～8）

北西外輪監視カメラによる観測では、剣ヶ峰付近や三原山中央火孔などで弱い噴気が時々認められています。これらの噴気活動に特段の変化はありません。15日に実施した現地調査では、三原山山頂周辺の噴気温度や三原山山頂火口内及びその周辺の噴気や地熱域の状況に特段の変化は認められませんでした。

・地震や微動の発生状況（図1 - 、図2 - 、図4）

火山性地震は期間を通して少ない状態で経過しています。今期間、震源は、カルデラ内の深さ1～2km付近及び西方沖に分布しました。

低周波地震や火山性微動は観測されていません。

・地殻変動の状況（図1 - 、図2 - ～ 、図3、図9）

GNSS連続観測などによると、地下深部へのマグマの供給によると考えられる長期的な島全体の膨張傾向がありますが、2018年頃からは鈍化しています。約1年周期で膨張と収縮を繰り返す地殻変動は、最近では、2019年10月頃から縮みの傾向が見られます。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php）でも閲覧することができます。

次回の火山活動解説資料（令和2年5月分）は令和2年6月8日に発表する予定です。

資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokujii.html>

この資料は気象庁のほか、国土地理院、東京大学及び国立研究開発法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図50mメッシュ（標高）』『数値地図25000（行政界・海岸線）』『電子地形図（タイル）』を使用しています（承認番号：平29情使、第798号）。




図1 伊豆大島 長期間の火山活動経過図（1961年1月～2020年4月30日）

1991年12月18日までは火口縁上130m以上、2002年2月28日までは火口縁上300m以上の噴煙の高さを観測していました。

火口原東、火口原南西：サーミスタ温度計により直接測定した噴気温度。

火孔底(火孔底西側)1：赤外放射温度計により離れた場所から測定した火孔底温度。

火孔底(火孔底西側)2：赤外熱映像装置により離れた場所から測定した火孔底温度。

地震回数には伊豆大島周辺海域で発生した地震も一部含まれています。

グラフの空白部分は欠測、△は機器更新。




図2 伊豆大島 最近の火山活動経過図(2001年1月~2020年4月30日)

火口原東、火口原南西：サーミスタ温度計により直接測定した噴気温度。

火孔底(火孔底西側) 2：赤外熱映像装置により離れた場所から測定した火孔底温度。

図9のGNSS基線に対応。グラフの空白部分は欠測。

2010年10月及び2016年1月以降のデータについては、解析方法を変更しています。

は差木地奥山観測点の支柱工事を実施。

グラフの空白部分は欠測、は機器更新。

- 伊豆大島では、地下深部へのマグマの供給によると考えられる長期的な島全体の膨張傾向がありますが、2018年頃からは鈍化しています（中の赤矢印を参考）。
- 長期的な島全体の膨張傾向に加え、約1年周期で膨張と収縮を繰り返す短期的な地殻変動もみられ（中の青矢印のような動き）。膨張がみられる時期に、これと関連すると考えられる地震活動の活発化がみられることがあります（中の灰色部分）。




図3-1 伊豆大島 GNSS連続観測による基線長変化(2001年1月～2020年4月30日)

(国): 国土地理院、～は図9のGNSS基線～に対応、グラフの空白部分は欠測。

2010年10月及び2016年1月以降のデータについては、解析方法を変更しています。

は差木地奥山観測点の支柱工事を実施。

- ・長期的な島全体の膨張傾向がありますが、2018年頃からは鈍化しています。約1年周期で膨張と収縮を繰り返す短期的な地殻変動は、最近では、2019年10月頃から縮みの傾向が見られます。




図3-2 伊豆大島 GNSS連続観測による基線長変化(2018年2月～2020年4月30日)

(国): 国土地理院、～は図9のGNSS基線～に対応、グラフの空白部分は欠測。

2010年10月及び2016年1月以降のデータについては、解析方法を変更しています。

- ・約1年周期で膨張と収縮を繰り返す短期的な地殻変動がみられ、2019年10月頃から縮みの傾向が見られます(赤矢印)。




図4 伊豆大島 地震源分布図（2016年1月1日～2020年4月30日）

- ・長期的には、地震活動は活発な時期と静穏な時期を繰り返しています。
- ・今期間、震源はカルデラ内の深さ1～2km付近及び西方沖に分布しました。



図5 伊豆大島 三原山山頂部及び山頂火口の状況（撮影方向は図8参照）






図6 伊豆大島 中央火孔内の状況（撮影方向は図8参照）

- ・中央火孔内の噴気の状況や地熱域の広がり等いずれも特段の変化は認められません。






図7 伊豆大島 夜間の中央火孔内の地熱域の状況（撮影方向は図8参照）

日射の影響がない夜間の中央火孔内の地熱域の状況を比較すると、前月（3月）との比較では、地熱域の拡がり等に特段の変化は認められません。前年（2019年4月）との比較では、一部の領域（白破線内）で地熱域の縮小が見られていますが、これは2019年7月に中央火孔内で発生した崩落により堆積物が地熱域を覆ったためであると考えられます。





図8 伊豆大島 現地調査での撮影位置・撮影方向、及び監視カメラの位置・撮影方向
(赤丸:撮影位置、:撮影方向)



小さな白丸(○)は気象庁、小さな黒丸(●)は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
(国): 国土地理院、(防): 防災科学技術研究所、(震): 東京大学地震研究所

図9 伊豆大島 観測点配置図

図中の は図2のGNSS基線 に、~ は図3のGNSS基線 ～ に、 は図1の光波測距基線 及び図2の光波測距基線 に対応。