

霧島山の火山活動解説資料（平成 29 年 11 月）

福岡管区气象台
地域火山監視・警報センター
鹿児島地方气象台

えびの高原（硫黄山）周辺

硫黄山付近の火山性地震は少ない状態で経過し、硫黄山の火山活動に特段の変化は認められていません。

GNSS¹⁾連続観測では、7月頃からみられていた霧島山を挟む基線での伸びは一時停滞していましたが、10月末以降再び伸びがみられます。このことから、霧島山の深い場所でマグマが蓄積されていると考えられますので、火山活動に注意が必要です。

硫黄山火口内の活発な噴気域及び熱異常域とその周辺の概ね 100m の範囲では、噴気孔からの高温の土砂や噴気、熱水等の規模の小さな噴出現象に十分注意してください。また、火山ガスにも注意が必要です。地元自治体等が行う立入規制に従うとともに、火口周辺や噴気孔の近くには留まらないでください。

活火山であることから、最新の火山情報の確認に努めてください。

噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

活動概況

- ・噴煙など表面現象の状況（図 1、図 2、図 3 - 、図 4 - 、図 6）

監視カメラによる観測では、白色の噴気の高さは概ね稜線上 100m 以下で経過しました。

- ・地震や微動の発生状況（図 3 - 、図 4 - 、図 5）

えびの高原（硫黄山）周辺の火山性地震の月回数は 92 回（10 月：35 回）でした。このうち、硫黄山付近の地震は 12 回（10 月：28 回）と少ない状態で経過し、硫黄山の火山活動に特段の変化は認められていません。一方、10 日には大浪池付近で 30 回、23 日には白鳥山付近で 28 回発生するなど、地震が一時的に増加しました。

硫黄山の南西約 3 km のえびの岳付近では、地震が 3 日に 10 回、5 日に 25 回と一時的に増加するなど、引き続き発生しました（月回数 11 月：43 回、10 月：332 回）。この付近の深さ 6 ~ 10km では、2011 年の新燃岳の噴火に伴い収縮が認められたことから、マグマを供給した領域と推定されています。

火山性微動は 2016 年 12 月 13 日以降、観測されていません。

この火山活動解説資料は福岡管区气象台ホームページ（<http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/>）や気象庁ホームページ（http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php）でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（平成 29 年 12 月分）は平成 30 年 1 月 12 日に発表する予定です。

この資料は気象庁のほか、国土地理院、東京大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、宮崎県及び鹿児島県のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図 50mメッシュ（標高）』『基盤地図情報』『基盤地図情報（数値標高モデル）』を使用しています（承認番号：平 29 情使、第 798 号）。

・地殻変動の状況（図 3 - 、図 7、図 8）

傾斜計²⁾では、火山活動によると考えられる特段の変化は認められません。

GNSS 連続観測では、7 月頃からみられていた霧島山を挟む基線での伸びは一時停滞していましたが、10 月末以降再び伸びがみられます。このことから、霧島山の深い場所でマグマが蓄積されていると考えられます。

- 1) GNSS (Global Navigation Satellite Systems) とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。
- 2) 火山活動による山体の傾きを精密に観測する機器です。火山体直下へのマグマの貫入等により変化が観測されることがあります。1 μ radian (マイクロラジアン) は 1 km 先が 1 mm 上下するような変化です。




図 1 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山付近の状況
（11 月 20 日 えびの高原監視カメラによる）




図 2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山付近の状況
（11 月 20 日 硫黄山南監視カメラによる）




図3 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山南西傾斜計の傾斜変動と火山活動経過図（2016年12月～2017年11月）

- ・ 4月25日から硫黄山南西観測点の傾斜計で、硫黄山方向が隆起する傾斜変動がみられていましたが、8月中旬頃から概ね停滞しています。
- ・ 白色の噴気の高さは概ね稜線上100m以下で経過しました。
- ・ 硫黄山付近の地震は少ない状態で経過しています。
- ・ 硫黄山の南西約3kmのえびののり付近では、地震が3日に10回、5日に25回と一時的に増加するなど、引き続き発生しました。

* 硫黄山南西観測点の傾斜変動は、南北方向 $2.1 \times 10^{-7} \text{rad/day}$ 、東西方向 $2.6 \times 10^{-7} \text{rad/day}$ のトレンド補正を行っています。

* 降水による変動も含まれています。




図4 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 火山活動経過図（2013年12月～2017年11月）

- ・ 10日には大浪池付近で30回、23日には白鳥山付近で28回発生するなど、えびの高原（硫黄山）周辺の地震が一時的に増加しました。なお、この火山性地震の回数には、硫黄山付近のほか、大浪池付近、白鳥山付近等の地震を含んでいます。
- ・ 火山性微動は2016年12月13日以降、観測されていません。

2016年2月10日14時43分頃に発生した火山性微動は、韓国岳北東観測点が欠測中だったためこのグラフには掲載していません。




図 5 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 震源分布図（2015 年 1 月～2017 年 11 月）

< 11 月の状況 >

震源は、主に硫黄山近傍の深さ 0 km 付近、大浪池近傍の深さ 2 ~ 3 km 付近、白鳥山近傍の深さ 1 km 付近及びえびの岳近傍の深さ 2 km 付近に分布しました（東西断面図）。

震央分布図以外には、震央分布図の領域 A の震源のみを表示しています。




図6 霧島山（えびの高原(硫黄山)周辺） 主な噴気位置

噴気及び熱異常域（A）～（D）は、えびの高原監視カメラの画像（図1）のA～Dに対応しています。噴気孔（H）は、硫黄山南監視カメラ（図2）の噴気孔Hに対応しています。




図 7-1 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） GNSS 連続観測による基線長変化
（2011 年 4 月～2017 年 11 月）

GNSS 連続観測では、7 月頃からみられていた霧島山を挟む基線での伸びは一時停滞していましたが、10 月末以降再び伸びがみられます（赤矢印）。

これらの基線は図 8 の ~ に対応しています。
灰色の部分は機器障害による欠測を示しています。
2016 年 1 月以降のデータについては、解析方法を変更しています。




図 7-2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） GNSS 連続観測による基線長変化
（2011 年 4 月～2017 年 11 月）

GNSS 連続観測では、7 月頃からみられていた霧島山を挟む基線での伸びは一時停滞していましたが、10 月末以降再び伸びがみられます（赤矢印）。

これらの基線は図 8 の ~ に対応しています。
 灰色の部分は機器障害による欠測を示しています。
 2016 年 1 月以降のデータについては、解析方法を変更しています。
 （国）：国土地理院




図 8 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸（ ）は気象庁、小さな黒丸（ ）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 (国)：国土地理院

新燃岳

新燃岳では、10月17日を最後に噴火は発生していません。

火山性地震は少ない状態で経過していましたが、25日から29日にかけて継続時間の短い火山性微動が数回観測され、その後火山性地震がやや増加するなど、火山活動がやや高まった状態が続いています。また、浅い場所を震源とする低周波地震³⁾は引き続き時々発生しています。

火山ガス（二酸化硫黄）の放出量⁴⁾は1日あたり200トン以下で経過しています。

傾斜計では、10月16日以降、特段の変化は認められません。

GNSS連続観測では、7月頃からみられていた霧島山を挟む基線での伸びは一時停滞していましたが、10月末以降再び伸びがみられます。このことから、霧島山の深い場所でマグマが蓄積されていると考えられますので、火山活動に注意が必要です。

弾道を描いて飛散する大きな噴石⁵⁾が火口から概ね2kmまで、火砕流⁶⁾が概ね1kmまで達する可能性があります。そのため、火口から概ね2kmの範囲では警戒してください。

風下側では火山灰だけでなく小さな噴石⁵⁾（火山れき⁷⁾）が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

また、爆発的噴火に伴う大きな空振による窓ガラスの破損や降雨時の土石流にも注意してください。

地元自治体等が発表する火山ガスの情報にも留意してください。

平成29年10月31日に火口周辺警報（噴火警戒レベル3、入山規制）を発表しました。その後、警報事項に変更はありません。

活動概況

- 地震や微動の発生状況（図4、図5、図6 - 、図7 - 、図8 - ）

25日から29日にかけて、継続時間の短い振幅の小さな火山性微動が時々発生しました。

火山性地震は、概ね1日あたり10回以下の少ない状態で経過しましたが、最高で29日に29回発生するなど、月末にやや増加しました（月回数11月：139回、10月：1558回）。また、浅い場所を震源とする低周波地震も、引き続き時々発生しました。

火山性地震は12月1日（期間外）以降さらに増加し、12月2日には201回発生しました。その後、4日までは地震回数はやや多い状態で経過しました。振幅のやや大きな地震も時々発生しています（12月6日現在）。

えびの岳付近（新燃岳の北西6km付近）では、地震が3日に10回、5日に25回と一時的に増加するなど、引き続き発生しました（月回数11月：43回、10月：332回）。この付近の深さ6～10kmでは、2011年の新燃岳の噴火に伴い収縮が認められたことから、マグマを供給した領域と推定されています。

- 噴煙など表面現象の状況（図1～3、図6 - 、図7 - ）

10月17日00時30分頃を最後に噴火は発生していません。

監視カメラによる観測では、白色の噴煙が火口縁上概ね200m以下で経過し、最高で6日に500mまで上がりました。

10日に実施した現地調査では、引き続き新燃岳の西側斜面の割れ目付近及び割れ目の下方の噴

気の状態や熱異常域の分布に特段の変化は認められませんでした。

・火山ガスの状況（図 6 - 、図 7 - ）

7 日、14 日及び 27 日に実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、1 日あたり 200 トン以下（7 日：100 トン、14 日：200 トン、27 日：100 トン）で、10 月 23 日以降と同程度の状態が継続しました（10 月 23 日以降は 60～200 トン）。

・地殻変動の状況（図 7 - 、図 8 - 、図 9～11）

新燃岳周辺の傾斜計では、新燃岳の山体の膨張を示す明瞭な変化は認められません。このため、引き続き、新燃岳直下へ多量のマグマなどの火山性流体の供給はないと考えられます。

GNSS 連続観測による 2017 年 7 月頃からの霧島山を挟む基線での伸びの傾向は、10 月の噴火活動の前後には一時的に停滞しましたが、10 月末以降、再び伸びの傾向がみられています。このため、霧島山の深い場所で膨張が継続している可能性があります。

- 3) 低周波地震は、相が不明瞭なため震源が求まるものは少数ですが、火口周辺の比較的浅い場所で発生するものと、火山体等の深い部分で発生するものがあります。火口周辺の比較的浅い場所で発生するものは、火道内のガスの移動やマグマの発泡などにより発生すると考えられているものもあります。火山によっては、過去の事例から、火山活動が活発化すると多発する傾向がある事が知られています。一方、火山体の深い場所で発生するものは、発生原因はよくわかっていませんが、何らかの地下深部のマグマ活動と関連していると考えられています。
- 4) 火口から放出される火山ガスには、マグマに溶けていた水蒸気や二酸化硫黄、硫化水素など様々な成分が含まれており、これらのうち、二酸化硫黄はマグマが浅部へ上昇するとその放出量が増加します。気象庁では、二酸化硫黄の放出量を観測し、火山活動の評価に活用しています。
- 5) 噴石については、その大きさによる風の影響の程度の違いによって到達範囲が大きく異なります。本文中「大きな噴石」とは「風の影響を受けず弾道を描いて飛散する大きな噴石」のことであり、「小さな噴石」とはそれより小さく「風に流されて降る小さな噴石」のことです。
- 6) 火砕流とは、火山灰や岩塊、火山ガスや空気が一体となって急速に山体を流下する現象です。火砕流の速度は時速数十 km から時速百 km 以上、温度は数百 °C にも達することがあります。
- 7) 霧島山では「火山れき」の用語が地元で定着していると考えられることから、付加表現しています。



図 1 霧島山（新燃岳） 噴煙の状況（11 月 21 日、猪子石監視カメラによる）
監視カメラによる観測では、白色の噴煙が火口縁上概ね 200m 以下で経過しました。





図2 霧島山（新燃岳） 新燃岳南西側の状況（新湯温泉付近から観測）

新湯温泉付近からの現地調査では、これまでと同様、西側斜面の割れ目付近（白破線内）と割れ目の下方（赤破線内）で噴気と弱い熱異常域を確認しましたが、特段の変化は認められませんでした。



図 3 霧島山（新燃岳） 図 2 の観測位置

白丸は観測位置、矢印は撮影方向、黒破線は西側斜面の割れ目を示します。



●:2017 年 11 月の震源
 ●:2012 年 1 月～2017 年 10 月の震源

図 4 霧島山（新燃岳） 震源分布図（2012 年 1 月～2017 年 11 月）

< 11 月の状況 >

震源は、新燃岳のごく浅いところから深さ 1 km 付近に分布しました（東西断面図）。




図 5 霧島山 新燃岳から硫黄山周辺の火山性地震の震源分布図
 (2012 年 1 月 ~ 2017 年 11 月)

< 11 月の状況 >

震源は、新燃岳のごく浅いところから深さ 1 km 付近、新燃岳周辺の深さ 1 ~ 3 km 付近及びえびの岳近傍の深さ 2 km 付近に分布しました（東西断面図）。




図6 霧島山（新燃岳） 火山活動経過図（2003年1月～2017年11月）

の赤線は、地震の回数の積算を示しています。

の×印は、二酸化硫黄が検出されなかったことを示しています。




図 7 霧島山（新燃岳） 火山活動経過図（2017 年 9 月～12 月 6 日）

< 11 月の状況 >

- ・ 10月17日00時30分頃を最後に噴火は観測されていません。
 - ・ 火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、1日あたり200トン以下（7日：100トン、14日：200トン、27日：100トン）でした。
 - ・ 25日から29日にかけて、継続時間の短い振幅の小さな火山性微動が時々発生しました。
 - ・ 火山性地震は、概ね1日あたり10回以下の少ない状態で経過しましたが、最高で29日に29回発生するなど、月末にやや増加しました。マグマなどの火山性流体の活動を示すと考えられる低周波地震（のBL型地震）は引き続き観測されています。
 - ・ 新燃岳の山体の顕著な膨張を示す傾斜変動は認められていません。
- の×印は、二酸化硫黄が検出されなかったことを示しています。
- 火山性微動の振幅が大きい状態では、振幅の小さな火山性地震の回数は計数できなくなっています。
- の赤線は、地震の回数の積算を示しています。
- の緑破線内の変化は、降水などの気象要因によるものです。




図 8 霧島山（新燃岳） 傾斜変動と火山性地震の日別回数（2017年9月～11月）

< 11月の状況 >

新燃岳周辺の傾斜計では、新燃岳の山体の膨張を示す明瞭な変化は認められません。

の緑破線内の変化は、降水などの気象要因によるものです。

の赤線は、地震の回数の積算を示しています。

* 高千穂河原観測点の傾斜計では、10月9日15時12分頃に発生した火山性微動に伴う新燃岳方向が隆起する傾斜変動（赤矢印）は、10月13日以降、認められていません。

* 周辺の傾斜計では10月16日以降には、えびの岳付近の収縮を示す明瞭な変化（黒矢印）は認められていません。




図 9-1 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測による基線長変化（2010 年 1 月～2017 年 11 月）

< 11 月の状況 >

GNSS 連続観測では、7 月頃からみられていた霧島山を挟む基線での伸びは一時停滞していましたが、10 月末以降再び伸びがみられます（赤矢印）。

これらの基線は図 10 の ~ に対応しています。

灰色の部分は機器障害による欠測を示しています。

2010 年 10 月及び 2016 年 1 月に、解析方法を変更しています。




図 9-2 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測による基線長変化（2010 年 1 月～2017 年 11 月）

< 11 月の状況 >

GNSS 連続観測では、7 月頃からみられていた霧島山を挟む基線での伸びは一時停滞していましたが、10 月末以降再び伸びがみられます（赤矢印）。

これらの基線は図 10 の ~ に対応しています。

灰色の部分は機器障害による欠測を示しています。

2016 年 1 月以降のデータについては、解析方法を変更しています。

（国）：国土地理院






図 10 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸()は気象庁、小さな黒丸()は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 (国)：国土地理院



期間：2013/11/01～2017/11/27 JST



●---[F3:最終解] ○---[R3:速報解]

図11 霧島山 国土地理院による地殻変動観測結果（2013年11月1日～2017年11月27日）

・ 7月頃からみられていた霧島山を挟む基線での伸びは一時停滞していましたが、10月末以降再び伸びがみられます（赤矢印）。このことから、霧島山の深い場所でマグマが蓄積されていると考えられます。（この図は国土地理院による地殻変動観測結果に加筆しています。）

* 最終解（グラフ中黒丸）は国際的なGNSS観測機関（IGS）が計算したGNSS衛星の最終の軌道情報（精密暦）で解析した結果で、最も精度の高いものです。速報解（グラフ中白丸）は速報的な軌道情報による解析結果で、最終解に比べ精度は若干下がりますが、早期に解を得ることができます。

御 鉢

火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。
噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

活動概況

- ・噴煙など表面現象の状況（図 1、図 2 - ）
火口縁を越える噴煙は認められませんでした。
- ・地震や微動の発生状況（図 2 - ~ ）
火山性地震の月回数は 4 回で、少ない状態でした（10 月：1 回）。
火山性微動は 2016 年 12 月 6 日以降、観測されていません。
- ・地殻変動の状況（図 3、図 4 ）
地殻観測では、火山活動によると考えられる変化は認められませんでした。



図 1 霧島山（御鉢） 御鉢の状況（11 月 27 日、猪子石監視カメラによる）




図2 霧島山（御鉢） 火山活動経過図（2003年1月～2017年11月）

< 11月の状況 >

- ・火口縁を越える噴煙は認められませんでした。
- ・火山性地震の月回数は4回（10月：1回）と少ない状態で経過しています。
- ・火山性微動は、2016年12月6日以降、観測されていません。




図3 霧島山（御鉢） GNSS 連続観測による基線長変化（2010年1月～2017年11月）

< 11月の状況 >

火山活動によると考えられる変化は認められませんでした。

これらの基線は図4の ~ に対応しています。

2010年10月及び2016年1月に、解析方法を変更しています。

灰色の部分は機器障害のため欠測を示しています。





図4 霧島山(御鉢) GNSS連続観測点と基線番号



霧島山 観測点配置図

小さな白丸 () は気象庁、小さな黒丸 () は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 (国)：国土地理院、(防)：防災科学技術研究所、(震)：東京大学地震研究所
 (九)：九州大学、(鹿大)：鹿児島大学、(宮)：宮崎県、(鹿)：鹿児島県