

霧島山の火山活動解説資料（令和2年10月）

福岡管区気象台

地域火山監視・警報センター

鹿児島地方気象台

えびの高原（硫黄山）周辺

硫黄山では、活発な噴気活動が続いています。火山性地震は概ね少ない状態で経過していますが、2020年5月頃から、地震回数がわずかに増加した状態が続いています。また、GNSS連続観測では、同時期から山体浅部の膨張を示すわずかな伸びが認められています。以上のことから、今後火山活動が活発化する可能性があります。

現在活発な噴気活動がみられている硫黄山の西側500mの噴気地帯から概ね100mの範囲、及び硫黄山火口内では、熱水・熱泥等が飛散する可能性がありますので注意してください。また、火山ガスにも注意が必要です。地元自治体等が行う立ち入り規制に従うとともに、火口周辺や噴気孔の近くには留まらないでください。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴煙など表面現象の状況（図1～5、図7-①②、図8-①）

硫黄山の南側の噴気地帯では、白色の噴気が最高で200mまで上がるなど活発な噴気活動が続いています。また、硫黄山の西側500m付近の噴気活動はやや活発な状態が継続しており、噴気の高さは100m以下で経過しました。

13日に海上自衛隊第1航空群の協力により実施した上空からの調査では、硫黄山の南側で噴気が高さ30m程度まで、硫黄山の西側500m付近では高さ10m程度まで上がっているのを確認しました。噴気地帯の更なる拡大は認められませんでした。

28日にえびの高原において実施した現地調査では、硫黄山南側の噴気孔で活発な噴気を、硫黄山西側500m付近の噴気孔でやや活発な噴気及び噴湯現象を引き続き確認しました。硫黄山付近の地熱域の状況に特段の変化は認められませんでした。

・ 地震や微動の発生状況（図6、図7-③～⑤、図8-③～⑤）

硫黄山付近では、20日には火山性地震^{*}が11回と一時的にやや増加しましたが、その他は少ない状態で経過しました。月回数は110回と、前月（9月：55回）に比べ増加しました。地震回数は2020年5月以降、わずかに増加した状態が続いています。えびの高原周辺（韓国岳周辺、

この火山活動解説資料は福岡管区気象台ホームページ（<https://www.jma-net.go.jp/fukuoka/>）や気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php）でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（令和2年11月分）は令和2年12月8日に発表する予定です。

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

（<https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html>）

この資料は気象庁のほか、国土地理院、東京大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、宮崎県及び鹿児島県のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図 50mメッシュ（標高）』『基盤地図情報』『基盤地図情報（数値標高モデル）』を使用しています（承認番号：平29情使、第798号）。

韓国岳北東側周辺及び大浪池周辺）では、火山性地震の月回数は11回（9月：7回）でした。また、えびの岳付近（硫黄山から南西約3km）においても、2020年6月下旬から7月上旬にかけて地震が時々増加しましたが、その後も時々発生しています。

火山性微動は2018年6月20日以降、観測されていません。

震源は、主に硫黄山近傍の海拔0km付近、大浪池周辺の深さ3km付近、えびの岳西側の深さ2～3km付近に分布しました。

・地殻変動の状況（図7-⑥、図8-⑥、図9、図10～12）

GNSS連続観測では、硫黄山近傍の基線で、2018年4月の噴火後に山体の収縮がみられた後、山体の膨張を示す伸びの傾向がみられていました。この変動は2019年2月頃から概ね停滞していましたが、2020年5月頃から再び山体浅部の膨張を示すわずかな伸びの傾向がみられています。霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸びは、2019年2月以降停滞しています。

・全磁力変化の状況（図13～15）

全磁力観測では、観測を開始した2016年2月以降、硫黄山の北側の観測点では全磁力の増加、南側の観測点では全磁力の減少といった、硫黄山周辺の地下での熱の高まりを示す変化が観測されています。その変化は、硫黄山の南側の観測点で2020年5月頃からやや大きくなっています。

※2020年6月26日以降、計数基準の変更により、これまでの「ごく微小な地震」は火山性地震の回数に含まれています。



図1-1 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山付近の状況
（10月16日、えびの高原監視カメラによる）

硫黄山の南側の噴気地帯では活発な噴気活動が、西側500m付近ではやや活発な噴気活動が続いています。




図1-2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山南側の状況
（10月27日、硫黄山南監視カメラによる）

硫黄山の南側の噴気地帯で活発な噴気活動が続いています。





図2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山の状況

- ・硫黄山の南側の噴気地帯では、引き続き活発な噴気を確認しました。また、硫黄山の西側500m付近でも引き続き噴気を確認しました。
- ・硫黄山付近では引き続き地熱域を確認しましたが、これまでの観測と比べ特段の変化は認められませんでした。



図3 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山西側500mの噴気の状態

- ・10月28日に実施した現地調査の結果、硫黄山西側500mの噴気孔では、引き続きやや活発な噴気活動を確認しました。また、前回（9月30日）の観測時に引き続き噴湯現象を確認しましたが、その勢いはやや強くなっており、湯だまりの濁りも増していました。
- ・噴湯箇所付近では前回に引き続き硫黄昇華物を確認しました（赤破線丸）。




図4 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺）上空からの状況

- ・硫黄山の南側（黄破線内）で噴気が高さ30m程度まで、硫黄山の西側500m付近（赤破線内）では高さ10m程度まで上がっているのを確認しました。噴気地帯の更なる拡大は認められませんでした。




図5 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 図2～4の観測位置及び観測方向、噴火位置、主な噴気地帯及び地熱域

- ・ ☆は噴火位置を示します。白丸（○）は気象庁、黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
- ・ 2018年4月の噴火以前から確認されている噴気地帯及び地熱域を●で示します。
- ・ 2018年4月9日に確認した噴気地帯及び地熱域を●で示します（一時期、活発な熱泥の噴出がみられました）。
- ・ 2018年4月の噴火以降に拡大した噴気地帯を●及び●で示します。
- ・ 2020年5月に九州大学が確認した地熱域を●で示します。




図6 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 震源分布図（2015年1月～2020年10月）

<10月の状況>

- ・震源は主に硫黄山近傍の海拔0km付近、大浪池周辺の深さ3km付近及びえびの岳西側の深さ2～3km付近に分布しました。

※2018年10月は、観測点の障害により、硫黄山近傍で震源が求まらなかった期間があります。

※新燃岳付近の震源は掲載していません。




図7 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 火山活動経過図（2018年1月～2020年10月）

<10月の状況>

- ・硫黄山の南側の噴気地帯では、噴気が最高で200mまで上がりました。硫黄山の西側500m付近では、噴気の高さは100m以下で経過しました。
- ・火山性微動は2018年6月20日以降、観測されていません。
- ・火山性地震は、20日に11回と一時的にやや増加しましたが、それ以外は少ない状態で経過しました。

※⑥の基線は図11の③に対応しています。




図8 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 火山活動経過図（2013年10月～2020年10月）

<10月の状況>

- ・硫黄山付近の火山性地震の月回数は110回で、前月（9月：55回）と比べて増加しました。
- ・えびの高原周辺（韓国岳周辺、韓国岳北東側周辺及び大浪池周辺）では、火山性地震の月回数は20回（9月：7回）でした。
- ・火山性微動は2018年6月20日以降、観測されていません。

※⑥の基線は図12の①に対応しています。

※2016年2月10日14時43分頃に発生した火山性微動は、韓国岳北東観測点が欠測中であったため④のグラフには掲載していません。




図9 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） GNSS 連続観測による基線長変化
（2017年10月～2020年10月）

GNSS 連続観測では、硫黄山近傍の基線で、2018年3月頃から山体の膨張を示す変動（青矢印）がみられていましたが、同年4月19日の噴火（▲）後に山体の収縮を示す変動（黒矢印）がみられました。その後、同年6月上旬から再び伸びの傾向（赤矢印）がみられていました。この変動は2019年2月頃から概ね停滞していましたが、2020年5月頃から再びわずかな伸びの傾向（紫矢印）が認められます。

これらの基線は図11の①～⑤に対応しています。

緑色の破線内の変化は、地面の凍上の影響と考えられます。

紫色の破線内の変化は、硫黄山南西観測点固有の局所的な変動による影響と考えられます。




図10 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） GNSS連続観測による基線長変化
(2015年1月～2020年10月)

GNSS連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸び(赤矢印)が2019年2月以降降滞しています。えびの高原周辺の基線(④)での硫黄山周辺の膨張を示すと考えられる基線の伸び(橙矢印)は、概ね停滞しています。

これらの基線は図12の①～⑥に対応しています。

緑色の破線内の変化は、地面の凍上の影響と考えられます。

紫色の破線内の変化は、観測点周囲の環境の変化に伴う影響と考えられます。

基線の空白部分は欠測を示しています。

(国)：国土地理院





図 11 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 図 9 の GNSS 連続観測点と基線番号



小さな白丸 (○) は気象庁、小さな黒丸 (●) は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 (国)：国土地理院

図 12 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 図 10 の GNSS 連続観測点と基線番号

白丸 (○) は気象庁、黒丸 (●) は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 (国)：国土地理院




図13 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 全磁力観測点配置図

2016年2月の観測開始以降の各観測点の全磁力の変化傾向（図14の変化傾向）を「■（増加傾向）」「■（減少傾向）」でそれぞれ示しています。




図14 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 全磁力観測点で観測された全磁力変動（2016年2月～2020年10月）

- ・硫黄山の南約60kmにある地磁気観測所祓川観測点で観測された全磁力値を基準とした場合の00:00から02:59（JST）での日平均値を示しています。
- ・図上部の三角は2018年4月19日および4月26日の噴火の発生を示しています。
- ・2016年2月以降、硫黄山の北側の観測点では全磁力の増加（赤矢印）、南側の観測点では全磁力の減少（青矢印）といった、硫黄山周辺の地下で熱消磁現象の進行を示す全磁力変動が観測されています。その変動は2019年4月頃から鈍化していますが、南側の観測点では2020年5月頃から減少傾向がやや大きくなっています。

【参考】全磁力観測について

火山活動が静穏なときの火山体は地球の磁場（地磁気）の方向と同じ向きに磁化されています。これは、火山を構成する岩石には磁化しやすい鉱物が含まれており、マグマや火山ガス等に熱せられていた山体が冷えていく過程で、地磁気の方に帯磁するためです。しかし、火山活動の活発化に伴い、マグマが地表へ近づくなどの原因で火山体内の温度が上昇するにつれて、周辺の岩石が磁力を失うようになります。これを「熱消磁」と言います。そして地下で熱消磁が発生すると、地表で観測される磁場の強さ（全磁力）が変化します。これらのことから、全磁力観測により火山体内部の温度の様子を知る手がかりを得ることができます。

例えば、山頂直下で熱消磁が起きたとすると、火口の南側では全磁力の減少、火口北側では逆に全磁力の増大が観測されます。この変化は、熱消磁された部分に地磁気と逆向きの磁化が生じたと考えることで説明できます。山頂部で観測した全磁力の値は、南側Aでは地磁気と逆向きの磁力線に弱められて小さく、北側Bでは強められて大きくなるのがわかります（図15）。

ただし全磁力の変化は、熱消磁によるものだけでなく、地下の圧力変化などによっても生じることがあります。




図15 熱消磁に伴う全磁力変化のモデル

火山体周辺の全磁力変化と火山体内部の温度		
北側の観測点で全磁力増加	[消磁] →	火山体内部の温度上昇を示唆する変化
南側の観測点で全磁力減少		
北側の観測点で全磁力減少	[帯磁] →	火山体内部の温度低下を示唆する変化
南側の観測点で全磁力増加		

新燃岳

新燃岳では、火山性地震の回数が増減を繰り返しています。また、火口西側斜面の割れ目付近において引き続き噴気や地熱域が認められ、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量が2020年4月に増加し、その後も同程度の放出量が維持されています。これらのことから、火山活動がわずかに高まっていると考えられます。一方で、地殻変動のデータに特段の変化がみられていないことから、現在のところ規模の大きな噴火に至る可能性は低いと考えられます。

弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね2kmまで、火砕流が概ね1kmまで達する可能性があります。そのため、新燃岳火口から概ね2kmの範囲では警戒してください。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石（火山れき）が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。

地元自治体等が行う立入規制等にも留意してください。

令和2年1月2日に火口周辺警報（噴火警戒レベル2、火口周辺規制）を発表しました。その後、警報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴煙など表面現象の状況（図1～3、図4-①、図5-①②）

新燃岳では、2018年6月28日以降、噴火は観測されていません。

新燃岳火口では、噴煙が4日に一時的に火口縁上500mまで上がりましたが、その他は噴煙の高さが概ね火口縁上100m以下で経過しました。火口西側斜面の割れ目では、2020年2月13日以降噴煙が観測されており、噴煙の高さは100m以下で経過しました。

13日に海上自衛隊第1航空群の協力により実施した上空からの観測では、引き続き新燃岳火口で白色の噴煙が上がっているのを確認しました。また、火口西側斜面の割れ目において白色の噴煙を確認しました。前回の観測（3月16日）と比べて、火口内やその周辺の状況に特段の変化は認められませんでした。

新湯温泉付近から繰り返し実施した現地調査では、流下した溶岩の上部及び火口西側斜面の割れ目で、引き続き噴煙を確認しました。また、火口内を覆う溶岩の縁辺部及び割れ目付近では引き続き地熱域を確認しました。

・ 地震や微動の発生状況（図4-③④、図5-④⑤、図7-③、図8）

新燃岳火口直下を震源とする火山性地震は、10月は782回（9月：668回）と増加し、2日には日回数が242回に達しました。火山性地震の発生回数は2019年11月以降増減を繰り返しています。また、15日に振幅の小さな継続時間の短い火山性微動が1回観測されました。

震源が求まった火山性地震は66回（9月：24回）で、概ね新燃岳火口直下のごく浅いところから深さ1km付近に分布しました。

・ 火山ガスの状況（図4-②、図5-③）

7日及び27日に山麓で実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の1日あたりの放出量は、いずれも200トン（9月19日：100トン）でした。火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、4月に増加し、その後も同程度の放出量が維持されています。

・地殻変動の状況（図4-⑤、図5-⑥、図6、図7-①、図9、図10）

新燃岳近傍の傾斜計では、山体膨張を示す特段の変化は観測されていません。

GNSS 連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸びは2019年2月以降停滞しています。



図1 霧島山（新燃岳） 噴煙の状況

（10月24日10時55分、韓国岳監視カメラによる）

- ・新燃岳火口では、噴煙が概ね火口縁上100m以下で経過しました。
- ・火口西側斜面の割れ目では、2020年2月13日以降噴気が観測されており、噴気の高さは100m以下で経過しました。




図2 霧島山（新燃岳） 図3の観測位置及び撮影方向





図3-1 霧島山（新燃岳） 新燃岳火口内の状況（海上自衛隊第1航空群協力による上空からの観測）

- ・火口縁に沿った溶岩縁辺部から白色噴煙が上がっているのを確認しました。
- ・火口西側斜面の割れ目において噴気（黄破線内）を確認しました。
- ・前回の観測（3月16日）と比べて、火口内やその周辺の状況に特段の変化は認められませんでした。




図 3-2 霧島山（新燃岳） 新燃岳南西側斜面の状況（新湯温泉付近から観測）

- ・ 流下した溶岩の上部及び火口西側斜面の割れ目で、引き続き噴気を確認しました。10月2日には、西側斜面の割れ目上部で、前回の観測と比較し、地熱域のわずかな広がりが認められました。2日以降は特段の変化はありません。
- ・ 火口内を覆う溶岩の縁辺部及び割れ目付近では引き続き地熱域を確認しました。




図4 霧島山（新燃岳） 火山活動経過図（2003年1月～2020年10月）

③の回数について、2011年1月～2月及び2018年3月は、振幅が大きい火山性微動が発生していたため、一部の振幅の小さな火山性地震の回数は計数できなくなっています。

⑤の基線は図6の基線1（赤色）に対応しています。




図5 霧島山（新燃岳） 火山活動経過図（2018年1月～2020年10月）

<10月の状況>

- ・新燃岳火口では、噴煙が4日に一時的に火口縁上500mまで上がりましたが、その他は噴煙の高さが概ね火口縁上100m以下で経過しました。火口西側斜面の割れ目では2月13日以降噴気が観測されており、噴気の高さは100m以下で経過しました。
- ・7日及び27日に山麓で実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の1日あたりの放出量はいずれも200トン（9月19日：100トン）でした。火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は4月に増加し、その後も同程度の放出量が維持されています。
- ・新燃岳火口直下を震源とする火山性地震は、10月は782回（9月：668回）と増加し、2日には日回数が242回に達しました。火山性地震の発生回数は2019年11月以降増減を繰り返しています。
- ・15日に振幅の小さな継続時間の短い火山性微動が1回観測されました。
- ・GNSS観測では、霧島山を挟む基線に特段の変化は認められません。

④の灰色の領域は、新燃岳南西観測点の障害のためデータが抜けている期間です。

⑤の回数について、火山性微動の振幅が大きい状態では、振幅の小さな火山性地震の回数は計数できなくなっています。

⑤の赤線は、地震の回数の積算を示しています。




図6 霧島山（新燃岳） 国土地理院 GNSS 連続観測点
えびの（国）－牧園（国）の基線（図4⑤及び図5⑥で使用）を赤色で示しています。




図7 霧島山（新燃岳） 高千穂河原観測点の傾斜変動の状況（2020年4月～2020年10月）

<10月の状況>

高千穂河原観測点の傾斜計では、山体膨張を示す特段の変化は観測されていません。

①について、2020年5月中旬以降に霧島山周辺でまとまった降水があったため、高千穂河原観測点の傾斜計では、その影響による変動が認められます（緑破線）。




図8 霧島山（新燃岳）震源分布図（2015年1月～2020年10月）

<10月の状況>

震源が求まった火山性地震は66回（9月：24回）で、震源は概ね新燃岳火口直下のごく浅いところから深さ1km付近に分布しました。

※新燃岳周辺の震源のみ図示しています。

※観測点の障害により、震源が求まらなかった期間があります（青領域）。




図 9-1 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測による基線長変化（2015 年 1 月～2020 年 10 月）

GNSS 連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸び（赤矢印）が 2019 年 2 月以降停滞しています。

これらの基線は図 10 の①～⑥に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。

橙色の破線内の変化は、新床観測点周囲の環境の変化に伴う影響と考えられます。

紫色の破線内の変化は、韓国岳北東観測点固有の局所的な変動による影響と考えられます。

青色の破線内の変化は、霧島山周辺のまとまった降水による影響と考えられます。




図 9-2 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測による基線長変化（2015 年 1 月～2020 年 10 月）

GNSS 連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸び（赤矢印）が 2019 年 2 月以降停滞しています。

これらの基線は図 10 の⑦～⑪に対応しています。

緑色の破線内の変化は、地面の凍上の影響と考えられます。

青色の破線内の変化は、霧島山周辺のまとまった降水による影響と考えられます。

基線の空白部分は欠測を示しています。

（国）：国土地理院




図10 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測点と基線番号

白丸（○）は気象庁、黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 （国）：国土地理院

御 鉢

火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。
噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴煙など表面現象の状況（図1～5、図6-①）

火口縁を越える噴煙は認められませんでした。

13日に海上自衛隊第1航空群の協力により実施した上空からの調査では、火口内及び火口周辺の状況に特段の変化は認められませんでした。

16日に実施した現地調査では、これまでと同様に火口底付近、火口壁南側及び火口壁西側で地熱域が認められました。なお、火口内で噴気は認められませんでした。

・ 地震や微動の発生状況（図6-②～⑤、図7）

火山性地震の月回数は2回（9月：2回）で、少ない状態でした。震源が求まった火山性地震はありませんでした。

火山性微動は2018年2月10日以降、観測されていません。

・ 地殻変動の状況（図8、図9）

地殻変動観測では、火山活動によると考えられる特段の変化は認められませんでした。



図1 霧島山（御鉢） 御鉢の状況（10月31日、猪子石監視カメラによる）
火口縁を越える噴煙は認められませんでした。




図 2-1 霧島山 (御鉢) 火口内の状況 (定点 1 (火口縁北西側) から観測)

御鉢火口底付近と火口壁南側 (T8、T9) で、これまでと同様に地熱域 (赤破線) が認められました。火口内において噴気は認められませんでした。




図 2-2 霧島山 (御鉢) 火口内の状況 (定点 1 (火口縁北西側) から観測)

御鉢火口壁西側 (赤破線) で、これまでと同様に地熱域が認められました。




図3 霧島山（御鉢） 観測位置、撮影方向及び噴気孔位置





図4 霧島山（御鉢） 御鉢の状況（10月13日、猪子石監視カメラによる）
・火口内及び火口周辺の状況に特段の変化は認められませんでした。



図5 霧島山（御鉢） 上空からの観測位置及び撮影方向




図6 霧島山（御鉢） 火山活動経過図（2003年1月～2020年10月）

<10月の状況>

- ・火口縁を越える噴煙は認められませんでした。
- ・火山性地震の月回数は2回（9月：2回）で、少ない状態でした。




図7 霧島山（御鉢） 震源分布図（2010年1月～2020年10月）

<10月の状況>

震源が求まった火山性地震はありませんでした（9月：なし）。

※御鉢周辺の震源のみ図示しています。




図8 霧島山（御鉢） GNSS 連続観測による基線長変化（2010年1月～2020年10月）


火山活動によると考えられる特段の変化は認められませんでした。

これらの基線は図9の①～⑦に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。


2010年10月及び2013年1月に、解析方法を変更しています。

橙色の破線内の変化は、皇子原観測点周囲の環境の変化に伴う影響と考えられます。



小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 (国)：国土地理院

図9 霧島山（御鉢） GNSS連続観測点と基線番号



霧島山 観測点配置図

小さな白丸 (○) は気象庁、小さな黒丸 (●) は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 (国) : 国土地理院、(震) : 東京大学地震研究所、(九) : 九州大学、(鹿大) : 鹿児島大学、
 (防) : 防災科学技術研究所、(宮) : 宮崎県、(鹿) : 鹿児島県